

Catálogo de las plantas vasculares de Chile

Catalogue of the vascular plants of Chile

ROBERTO RODRIGUEZ¹, CLODOMIRO MARTICORENA[†], DIEGO ALARCÓN^{3,4}, CARLOS BAEZA¹, LOHENGRIN CAVIERES^{3,4}, VÍCTOR L. FINOT², NICOL FUENTES¹, ANDREA KIESSLING¹, MARITZA MIHOC^{3,4}, ANÍBAL PAUCHARD⁵, EDUARDO RUIZ¹, PAULINA SANCHEZ⁵ & ALICIA MARTICORENA^{1*}

¹Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.

²Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, Casilla 537, Chillán, Chile.

³Ecobiosis, Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile.

⁴Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Casilla 653, Santiago, Chile.

⁵Laboratorio de Invasiones Biológicas, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Victoria 631, Concepción, Chile.

*amartic@udec.cl

RESUMEN

Se presenta un catálogo de las plantas vasculares que crecen en Chile. Está organizado por divisiones, Pteridophyta (Lycopodiopsida y Polypodiopsida), Pinophyta (Gnetopsida y Pinopsida) y Magnoliophyta (Liliopsida y Magnoliopsida), y dentro de cada grupo, las jerarquías taxonómicas (Familia, Género, Especies y taxones infraespecíficos) están ordenados alfabéticamente. Se incluye además un índice alfabético de géneros con indicación de la familia y grupo a que pertenecen. De acuerdo a este catálogo la flora de las plantas vasculares que crecen en Chile, comprende 186 familias, 1121 géneros y 5471 especies, de éstas, 4655 corresponden a especies nativas, de las cuales 2145 son endémicas de Chile y 816 las especies introducidas.

PALABRAS CLAVE: Altitud, distribución geográfica, flora chilena, listado, origen.

ABSTRACT

A catalog of vascular plants growing in Chile is presented. It is organized by divisions, Pteridophyta (Lycopodiopsida and Polypodiopsida), Pinophyta (Gnetopsida and Pinopsida) and Magnoliophyta (Liliopsida and Magnoliopsida), and within each group, the taxonomic hierarchies (Family, Genus, Species and infraspecific taxa) are arranged alphabetically. In accordance with this catalogue, the flora of vascular plants of Chile comprise 186 families, 1121 genera and 5471 species, 4655 species are native, 2145 of these are endemic to Chile and 816 species are introduced.

KEYWORDS: Checklist, Chilean flora, geographic distribution, elevation, origin.

INTRODUCCIÓN

La taxonomía, en lo que se refiere a la nomenclatura, está en constante revisión, provocando cambios en los nombres de los componentes de una flora. En muchos géneros de plantas vasculares chilenas, las especies son conocidas desde hace más de dos siglos, sin embargo, existe una gran cantidad de géneros que han sido recientemente revisados lo que ha repercutido en cambios nomenclaturales y variaciones en

el número de los integrantes que comprenden las distintas jerarquías. Dado lo dinámico de esta disciplina, es preciso tomar conciencia de la necesidad de actualizar continuamente estos conocimientos debido a que constituyen la base para muchas otras disciplinas, siendo una herramienta fundamental al momento de evaluar el impacto ambiental de las actividades productivas sobre la flora del país.

El primer catálogo de la flora chilena lo publicó Federico Philippi (1881), debido a su antigüedad y por las citas de

numerosos nombres de plantas que no existen en el país, actualmente está totalmente obsoleto. En dicho trabajo se incluyó información referente al nombre científico, autor de la especie, familia, citas bibliográficas y sinónimos para cada especie. Alrededor de un siglo después, Clodomiro Marticorena y Max Quezada (1985) publicaron el Catálogo de la flora vascular de Chile, actualizando de buena manera los nombres dados por Philippi y lo que se conocía taxonómicamente de la flora del país hasta esa fecha. Ese trabajo constituyó el primer intento de unificar y reunir todo el conocimiento disperso de la flora de Chile en una sola publicación, sirviendo como referente durante más de 20 años, y sintetizando la información sobre las clases, familias, géneros, especies, categorías infraespecíficas, autores y origen (nativo o introducido) para cada una de las especies de plantas vasculares presentes en el país.

Posterior a la publicación de estos trabajos han aparecido listas y catálogos regionales que fueron modificando algunos nombres de la flora chilena. Arroyo *et al.* (1990) contribuyen al conocimiento de la flora anual nativa de Chile continental, Henríquez *et al.* (1995) publican el Catálogo de la flora de la Región de Magallanes, luego Marticorena *et al.* (1998a, 1998b) el Catálogo de la flora vascular de Juan Fernández y el Catálogo de la flora vascular de la Región de Antofagasta, después Marticorena *et al.* (2001) publican el Catálogo de la Flora Vascular de la IV Región de Coquimbo, y por último Squeo *et al.* (2008) el Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama.

Con la aparición del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.* 2008) se actualizó gran parte del conocimiento taxonómico y la información de la distribución geográfica de las especies nativas e introducidas de Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este catálogo ha sido de gran impacto en la aplicación correcta de los nombres para las plantas vasculares del Cono Sur de Sudamérica, considerando además del texto impreso, la continua corrección y actualización periódica de la base de datos del Instituto de Botánica Darwinion.

Desde el año 2008 a la fecha han aparecido nuevas publicaciones relacionadas a la flora, como tratamientos de familias de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 2011), los estudios de distribución geográfica que amplían la presencia de algunas especies en otras regiones del país o en países vecinos, y tratamientos taxonómicos de familias y géneros que modifican el listado de especies nativas, endémicas e introducidas de Chile. Cabe destacar, la reciente publicación del libro *Plants of Oceanic Islands. Evolution, Biogeography, and Conservation of the Flora of Juan Fernández (Robinson Crusoe) Archipelago* (Stuessy *et al.* 2018), que permitió acceder a una detallada y actualizada revisión de los taxones presentes en el archipiélago, información que también ha sido incluida en este trabajo.

Un esfuerzo adicional permitió corregir, actualizar y depurar el registro de las especies introducidas en el país.

Nuevos registros, cambio en el estatus (origen) de algunas especies, corrección y validación del rango de distribución y la evaluación de la nomenclatura de estas especies permiten entregar el detalle a escala regional de este componente de la flora del país.

Dentro de las dificultades que se presentaron durante la realización del presente catálogo se encontraron varias especies cuya presencia en el país es dudosa, géneros que no han sido estudiados en su totalidad y que se desconoce su estado actual y nombres que no han podido ser corroborados por no poseer material de herbario disponible. Por ejemplo, las especies o combinaciones publicadas en revistas sin comité editorial y de difícil acceso, en su gran mayoría no han podido ser aceptadas. La imposibilidad, en algunos casos, de acceder a la publicación original, o bien la ausencia del material *typus* en los herbarios mencionados en los protólogos impidieron incluirlas.

El presente Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, constituye una nueva actualización, corrección y síntesis de la información taxonómica y geográfica de la flora de Chile incluyendo su territorio insular y la actual regionalización. Este nuevo catálogo viene a cubrir una necesidad nacional por saber qué especies crecen en el territorio, y se espera que sea también un incentivo para actualizar el conocimiento de grupos difíciles que no han sido tratados con nuevas técnicas y herramientas sistemáticas.

Como se señaló al comienzo, la taxonomía es dinámica, por lo que luego habrá que actualizar este catálogo, para esto, versiones actualizadas podrán ser consultadas en la página de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción en un intento de aportar al conocimiento y valorización de nuestro patrimonio a partir de esta disciplina.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Catálogo de las plantas vasculares de Chile reúne la información de los taxones que se encuentran en Chile continental e insular (Archipiélago de Juan Fernández, Isla de Pascua e Islas Desventuradas).

La actualización de los niveles taxonómicos de división, clase, orden y familia siguen lo propuesto por Stevens (2001 en adelante). La actualización de los nombres científicos a nivel de especie se realizó utilizando toda la información bibliográfica disponible, tomando como base el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Marticorena & Quezada 1985), Bibliografía botánica taxonómica de Chile (Marticorena 1992), Bibliografía botánica taxonómica de Chile, Suplemento 1 (Marticorena 1996), Catálogo del Cono Sur (Zuloaga *et al.* 2008), monografías y revisiones taxonómicas publicadas después de 2008 y que están relacionadas con cambios nomenclaturales en la flora chilena principalmente aquellos realizados en el marco del

Proyecto Nueva Flora de Chile. Las abreviaturas de los nombres de los autores presentan el formato propuesto por Brummitt & Powel (1992) seguido por The International Plant Names Index (IPNI).

De forma complementaria se revisaron especímenes de herbario, especialmente del Herbario de la Universidad de Concepción (CONC) y del Museo Nacional de Historia Natural (SGO). A raíz de estos estudios en este catálogo se incluye nueva información y en algunos casos se añaden notas para aclarar la nomenclatura y otra información relevante.

En cuanto a distribución geográfica, se actualizó con la nueva división administrativa del país agregando las nuevas regiones de Arica y Parinacota, Ñuble y Los Ríos, además se aclararon varias dudas con respecto a la presencia en Chile Continental e Insular de numerosas especies. Para cada una de las áreas se ha señalado con un acrónimo (Tabla 1). En cuanto al origen se consideraron tres categorías: nativas, endémicas de Chile e introducidas.

TABLA 1. Acrónimos utilizados para señalar cada una de las Regiones de Chile continental e insular. / Acronyms used to indicate each one of the Regions of continental and insular Chile.

REGIÓN	ACRÓNIMO
Arica y Parinacota	AYP
Tarapacá	TAR
Antofagasta	ANT
Atacama	ATA
Coquimbo	COQ
Valparaíso	VAL
Metropolitana de Santiago	RME
Libertador Bernardo O'Higgins	LBO
Maule	MAU
Ñuble	NUB
Biobío	BIO
Araucanía	ARA
Los Ríos	LRI
Los Lagos	LLA
Aisén	AIS
Magallanes	MAG
Juan Fernández	JFE
Isla de Pascua	IPA
Islas Desventuradas	IDE

Finalmente, este catálogo incluye información sobre División, Clase, Familia, Género, Especie, y categorías infraespecíficas. Los nombres aceptados incluyen Autor(es), Sinónimos (considerando solo los nombres citados para

Chile), datos de Hábito (Árbol, Árbol pequeño, Arbusto, Subarbusto, Hierba), Ciclo de vida (anual, bienal, perenne), Estatus (endémico, nativo, introducido), Distribución en las regiones de Chile (según acrónimos), Rango altitudinal, presencia en Países vecinos (Argentina, Bolivia, Perú), Nombres vulgares en los casos que corresponda y Notas.

Para las plantas introducidas, el punto de partida fue la información que se obtuvo del Catálogo de la Flora Vasculosa de Chile (Marticorena & Quezada 1985) y la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción (LIB). A partir de esta información y de la incorporación de trabajos y publicaciones recientes en la materia, se corrige y depura el registro de especies introducidas en el país. En el presente catálogo, se compilan nuevos registros, se cambia el estatus (origen) de algunos taxones, y se corrige y valida el rango de distribución de estas especies en Chile continental e insular según la regionalización vigente. A su vez, y al igual que con las especies nativas, se evalúa y actualiza la nomenclatura, permitiéndonos entregar el detalle a escala regional de este componente de la flora del país. En este trabajo se detalla la misma información que para las especies nativas, a excepción de la información en relación a los sinónimos y su presencia en países vecinos.

El Anexo 1 contiene la lista alfabética de los géneros, con su correspondiente familia y clase.

Ejemplo del formato:

ANACARDIACEAE

Schinus

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera

Sinónimos: *Amyris polygama* Cav., *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *chilensis* F.A. Barkley, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera fma. *ovatus* (Lindl.) Cabrera, *Schinus dependens* Ortega var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus huyngan* Kuntze, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *parviflorus* (Marchand) F.A. Barkley, *Duvaua crenata* Phil., *Litrea crenata* Phil., *Schinus dependens* Ortega var. *parviflorus* Marchand

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Huigán.

Nota: Especie muy polimorfa, con variaciones especialmente en las hojas, lo que ha motivado la creación de variedades, subespecies y formas, las que han sido reunidas en una sola especie.

RESULTADOS

De acuerdo a los registros, un total de 6 clases y 56 órdenes representan los niveles superiores de organización y se informa la presencia en el país de 5471 taxones distribuidos

en 1121 géneros y 186 familias. Del total, 4655 corresponden a taxones nativos (85,1%), 2145 de ellos son endémicos de Chile (39,2%), mientras que las introducidas suman 816 (14,9%) (Tabla 2).

TABLA 2. Estadística de las plantas vasculares en la flora de Chile de acuerdo a su clase taxonómica. / Statistics of vascular plants of Chile, according to taxonomic class.

CLASE	ENDÉMICA	NATIVA	INTRODUCIDA	TOTAL
Lycopodiopsida	1	10	1	12
Polypodiopsida	55	94	4	153
Gnetopsida	2	4	0	6
Pinopsida	1	8	3	12
Liliopsida	401	617	216	1234
Magnoliopsida	1685	1777	592	4054
Total	2145	2510	816	5471

Desde la publicación de Marticorena & Quezada (1985), se han incorporado numerosos registros, tanto de especies nativas como de introducidas. Algunos ejemplos de los cambios que se presentan en este catálogo corresponden a: nivel de familia, la prevalencia de los nombres Apiaceae, Asteraceae y Brassicaceae, reemplazando el uso de los nombres de las familias Umbelliferae, Compositae y Cruciferae respectivamente. Fusión de algunas familias como Caesalpiniaceae y Mimosaceae cuyos representantes en Chile quedan reunidos bajo la familia Fabaceae; Ledocarpaceae y Vivianiaceae fusionadas bajo la familia Francoaceae; Flacourtiaceae quedando incluida bajo Salicaceae, la inclusión de Eucryphiaceae dentro de Cunoniaceae y Empetraceae y Epacridaceae dentro de Ericaceae. La segregación de géneros que quedan en familias independientes como Calceolariaceae que incluye a *Calceolaria* y *Jovellana*, Quillajaceae familia monotípica con *Quillaja* como único representante y Heliotropiaceae incluyendo a *Heliotropium*.

A nivel de género, el cambio de nombres como *Pseudognaphalium*, *Austrolycopodium* y *Diphasium* que reemplazan a los representantes chilenos de los géneros *Gnaphalium* y *Lycopodium* respectivamente. Nombres de géneros que han pasado a la sinonimia y por lo tanto deberían dejar de usarse en Chile como son: *Mimulus* (que pasa a ser *Erythranthe*), *Mulinum* y *Laretia* (que pasan a la sinonimia de *Azorella*), *Satureja* (cuyas especies quedaron entre los géneros *Micromeria* y *Gardoquia*) y *Wendtia* (que queda incluida bajo *Balbisia*). La segregación de especies en géneros independientes como *Blumenbachia*, *Grausa*, *Nasa* y *Pinnasa* antes incluidas en *Loasa* y, *Amphiscirpus*, *Ficinia*, *Phylloscirpus*, *Rhodoscirpus* y *Zameioscirpus* antes incluidos en *Scirpus*. La fusión de géneros como

Echinocactus, *Eriosyce*, *Islaya*, *Neoporteria* y *Pyrrhocactus* quedando incluidos en *Eriosyce*.

A nivel de especie, se presenta la sinonimia de numerosos taxones, nuevas combinaciones, revalidaciones y corrección en la denominación de otros. Se destaca la inclusión de especies nativas descritas en la última década como *Alstroemeria marticorenae*, *Bipinnula gabriel*, *Chorizanthe novoana*, *Viola farkasiana* y *Weberbauerella chilensis* y la incorporación de nuevos registros para la flora introducida como por ejemplo *Dittrichia viscosa* y *Cotoneaster francheti* entre varios otros.

Finalmente, para la entrega de la información de los rangos de distribución de especies nativas e introducidas ha sido fundamental el apoyo con material herborizado depositado en el Herbario de la Universidad de Concepción y el Herbario del Museo de Historia Natural, validando una vez más la importancia de estas entidades en la generación del conocimiento base de estas disciplinas.

La información de este catálogo se mantendrá actualizada periódicamente, en la medida en que surjan nuevos cambios taxonómicos o nuevos registros de plantas vasculares para Chile. En tal sentido, invitamos a colaborar con información que complemente este proceso de actualización, contactando al correo electrónico de correspondencia.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) por su iniciativa del VIII concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo que financió el Proyecto N° 004/2016 “Actualización de la lista de las plantas nativas y endémicas de Chile”, al Dr. Fernando Zuloaga del Instituto de Botánica

Darwinion (Argentina) que entregó desinteresadamente la base de datos del catálogo del Cono Sur, pilar fundamental para lograr el objetivo del proyecto. A la Dra. Mary Kalin Arroyo de la Universidad de Chile por su constante apoyo y estímulo para el estudio de la flora de Chile. Nuestra gratitud a los colaboradores Nicolás García (Amaryllidaceae), Patricio Novoa (Orchidaceae) y Silvia Arroyo-Leuenberger (*Leucocoryne*) que revisaron los respectivos grupos. Nuestro agradecimiento a Gloria Rojas del Museo Nacional de Historia Natural (SGO) por las facilidades otorgadas en el estudio de las colecciones científicas, a Rosa Montero, Claudia Flores y Sonia Maldonado del Herbario de la Universidad de Concepción (CONC) por su constante labor con la organización del herbario.

REFERENCIAS

- ARROYO, M.T.K., MARTICORENA, C., MUÑOZ, M. 1990. A checklist of the native annual flora of Continental Chile. *Gayana Botánica* 47: 119-135.
- BRUMMITT, R.K., POWELL, C.E. (eds.). 1992. Author of plant names. Royal Botanic Gardens, Kew. 732 pp.
- HENRÍQUEZ, J.M., PISANO, E., MARTICORENA, C. 1995. Catálogo de la flora vascular de Magallanes (XIIª Región), Chile. *Anales del Instituto de la Patagonia* 23: 5-30.
- MARTICORENA, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 41: 1-587.
- MARTICORENA, C. 1996. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Suplemento 1. *Gayana Botánica* 53(1): 1-263.
- MARTICORENA, C., MATTHEI, O., RODRÍGUEZ, R., ARROYO, M.T.K., MUÑOZ, M., SQUEO, F., ARANCIO, G. 1998b. Catálogo de la flora vascular de la Segunda Región (Región de Antofagasta), Chile. *Gayana Botánica* 55: 23-83.
- MARTICORENA, C., QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 42: 1-157.
- MARTICORENA, C., RODRÍGUEZ, R. (eds.). 2011. Flora de Chile 3(1). Misodendraceae a Zygophyllaceae. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.
- MARTICORENA, C., SQUEO, F.A., ARANCIO, G., MUÑOZ, M. 2001. Catálogo de la flora vascular de la IV Región de Coquimbo. En: Squeo, F.A., Arancio, G., Gutiérrez, J.R. (eds.), Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. Capítulo 7: 105-142.
- MARTICORENA, C., STUESSY, T.F., BAEZA, C. 1998a. Catalogue of the vascular flora of the Robinson Crusoe or Juan Fernández Islands, Chile. *Gayana Botánica* 55: 187-211.
- PHILIPPI, F. 1881. *Catalogus plantarum vascularium chilensium adhuc descriptarum*. Santiago de Chile. viii, 378 pp.
- SQUEO, F.A., ARROYO, M.T.K., MARTICORENA, A., ARANCIO, G., MUÑOZ, M., NEGRITTO, M., ROJAS, G., ROSAS, M., RODRÍGUEZ, R., HUMAÑA, A.M., BARRERA, E., MARTICORENA, C. 2008. Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. En: Squeo, F.A., Arancio, G., Gutiérrez, J.R. (eds.), Libro Rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama. Capítulo 6: 97-120.
- STEVENS, P.F. 2001 onwards. Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017. URL: <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/> Accedido: Mayo 18, 2018.
- STUESSY, T.F., CRAWFORD, D.J., LÓPEZ-SEPÚLVEDA, P., BAEZA, C.M., RUIZ, E. (eds.). 2017. *Plants of Oceanic Islands. Evolution, Biogeography, and Conservation of the Flora of the Juan Fernández (Robinson Crusoe) Archipelago*. Cambridge University Press. 465 pp.
- ZULOAGA, F.O., MORRONE, O., BELGRANO, M.J. (eds.), MARTICORENA, C. (Chile), MARCHESI, E. (Uruguay) (eds. asoc.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 107 (3 vols.): i-xcvi, 1-3348.

CATÁLOGO TAXONÓMICO

PTERIDOPHYTA

LYCOPODIOPSIDA

ISOETACEAE

Isoetes

Isoetes araucaniana Macluf & Hickey

Hierba acuática. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

Isoetes chubutiana Hickey, Macluf & W.C. Taylor

Sinónimos: *Isoetes valdiviensis* H.P. Fuchs, nom. nud.,

Isoetes meyeri H.P. Fuchs, nom. nud.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 700-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Isoetes hieronymi U. Weber

Sinónimos: *Isoetes argentina* A.A. Eaton ex Palmer, nom.

nud., *Isoetes lechleri* auct. non Mett.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Isoetes savatieri Franchet

Sinónimos: *Calamaria savatieri* (Franchet) Kuntze, *Isoetes*

lechleri Mett. var. *savatieri* (Franchet) L.D. Gómez

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS,

MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

LYCOPODIACEAE

Austrolycopodium

Austrolycopodium alboffii (Rolleri) Holub

Sinónimos: *Lycopodium alboffii* Rolleri, *Lycopodium*

magellanicum (P. Beauv.) Sw. var. *nanum* (Albov) Looser

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Austrolycopodium confertum (Willd.) Holub

Sinónimos: *Lycopodium confertum* Willd., *Lycopodium*

chonoticum Phil., *Lycopodium confertum* Willd. var.

barrosii Looser, *Lycopodium barrosii* (Looser) Herter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Austrolycopodium erectum (Phil.) Holub

Sinónimos: *Lycopodium erectum* Phil., *Lycopodium*

magellanicum (P. Beauv.) Sw. var. *erectum* (Phil.) Looser,

Lycopodium looseri Herter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1200-2800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Austrolycopodium magellanicum (P. Beauv.) Holub

Sinónimos: *Lepidotis magellanica* P. Beauv., *Lycopodium*

magellanicum (P. Beauv.) Sw.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 300-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pinpinela.

Austrolycopodium paniculatum (Desv. ex Poir.) Holub

Sinónimos: *Lycopodium paniculatum* Desv. ex Poir.,

Lycopodium dendromorphum Kunze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 700-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palmita, pimpinela, licopodio, musgo,

llanka-lawen.

Diphasium

Diphasium gayanum (J. Rémy) Holub

Sinónimos: *Lycopodium gayanum* J. Rémy, *Lycopodium*

skottsbergii (Herter ex Nessel) Herter, *Lycopodium*

scariosum G. Forst. var. *gayanum* (J. Rémy) Nessel,

Lycopodium scariosum auct. non G. Forst., *Lycopodium*

jussiaei (jussieui) auct. non Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 300-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palmita, pinpinela.

Huperzia

Huperzia fuegiana (Roiv.) Holub

Sinónimos: *Urostachys fuegianus* (Roiv.) Herter, *Lycopodium fuegianum* Roiv., *Urostachys selago* (L.) Herter var. *hessei* Herter ex Nessel, *Huperzia selago* auct. non (L.) Schrank & Mart., *Lycopodium selago* auct. non L.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

SELAGINELLACEAE

Selaginella

Selaginella apoda (L.) Spring

Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: BIO, LRI.

POLYPODIOPSIDA

ASPLENIACEAE

Asplenium

Asplenium dareoides Desv.

Sinónimos: *Asplenium magellanicum* Kaulf., *Asplenium concisum* Desv., *Asplenium philippi* Gand., *Asplenium dareoides* Desv. var. *dentatum* G. Kunkel
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 5-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Filu-lahuén.

Asplenium gilliesii Hook.

Sinónimos: *Asplenium gilliesianum* Hook. & Grev.
Hierba saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Asplenium macrosorum Bertero ex Colla

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 30-500 m.

Asplenium obtusatum G. Forst. var. *obtusatum*

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA, IDE.

Rango altitudinal: 2-190 m.

Asplenium obtusatum G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) C. Chr. ex Skottsbo.

Sinónimos: *Asplenium sphenoides* Kunze, *Asplenium chondrophyllum* Bertero ex Colla, *Asplenium consimile* J. Remy, *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Mett., *Asplenium obliquum* G. Forst. var. *chondrophyllum* (Bertero ex Colla) Mett.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 2-500 m.

Asplenium patagonicum R.A. Rodr. & R. Guzmán

Sinónimos: *Asplenium longifolium* Phil. ex Gotschl., nom. nud., *Asplenium monanthes* auct. non L.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 10-320 m.

Asplenium peruvianum Desv.

Sinónimos: *Asplenium fragile* C. Presl var. *lomense* Weath., *Asplenium fragile* C. Presl
Hierba saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Asplenium polyodon G. Foster var. *squamulosum* (C. Chr.) R.A. Rodr.

Sinónimos: *Asplenium adiantoides* (L.) C. Chr. var. *squamulosum* C. Chr.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 2-120 m.
Nombre vulgar: Nehe nehe.

Asplenium stellatum Colla

Sinónimos: *Asplenium fernandezianum* Kunze, *Asplenium lunulatum* Sw. var. *stellatum* (Colla) C. Chr.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 90-1800 m.

Asplenium trilobum Cav.

Sinónimos: *Asplenium trapezoides* Sw., *Asplenium parvulum* Hook., *Asplenium trilobum* Cav. var. *trapezoides* (Sw.) G. Kunkel
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 5-600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Asplenium triphyllum C. Presl

Sinónimos: *Asplenium imbricatum* Hook. & Grev.

Hierba saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 4300-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Pleurosorus

Pleurosorus papaverifolius (Kunze) Fée

Sinónimos: *Gymnogramme papaverifolia* Kunze,

Pleurosorus immersus Fée, *Gymnogramma chilensis*

Brack., *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var. *nana*

Villagrán, *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée var.

hirsuta Villagrán, *Asplenium ciliatum* C. Presl ex Bertero,

Asplenium subglandulosum (Hook. & Grev.) Salvo, Prada

& Díaz subsp. *papaverifolium* (Kunze) Salvo, Prada & Díaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

ATHYRIACEAE

Diplazium

Diplazium fuenzalidae Espinosa

Sinónimos: *Athyrium fuenzalidae* (Espinosa) Gunckel,
comb. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 200-400 m.

Nombre vulgar: Nehe nehe.

BLECHNACEAE

Blechnum

Blechnum arcuatum J. Remy

Sinónimos: *Blechnum bibraeae* Mett.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.

Rango altitudinal: 5-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Blechnum asperum (Klotzsch) J.W. Sturm

Sinónimos: *Lomaria aspera* Klotzsch

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 15-415 m.

Blechnum blechnoides Keyserl.

Sinónimos: *Lomaria leyboldtiana* Phil., *Blechnum*
valdiviense C. Chr., *Blechnum leyboldtianum* (Phil.) C. Chr.,
Lomaria blechnoides auct. non Bory, *Spicanta leyboldtiana*
(Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.

Rango altitudinal: 1-1100 m.

Nombre vulgar: Iquide.

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett.

Sinónimos: *Lomaria chilensis* Kaulf., *Lomaria gilliesii*
Hook. & Grev., *Lomaria reedii* Phil., *Blechnum gilliesii*
(Hook. & Grev.) Mett., *Blechnum reedii* (Phil.) Espinosa,
Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. var. *reedii* (Phil.) Looser,
Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. fma. *imbricatum* Kunkel,
Blechnum cordatum auct. non (Desv.) Hieron.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 5-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Costilla de vaca, palmilla, quilquil, iquide.

Blechnum corralense Espinosa

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 15-1200 m.

Blechnum cycadifolium (Colla) J.W. Sturm

Sinónimos: *Lomaria cycadifolia* Colla, *Lomaria lanuginosa*
Kunze, *Blechnum lanuginosum* (Kunze) J.W. Sturm,
Blechnum magellanicum (Desv.) Mett. var. *cycadifolium*
(Colla) C. Chr., *Struthiopteris cycadifolia* (Colla) Ching.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 180-1200 m.

Blechnum hastatum Kaulf.

Sinónimos: *Blechnum trilobum* C. Presl, *Blechnum ciliatum*
C. Presl, *Lomaria hastata* (Kaulf.) Kunze, *Blechnum*
remotum C. Presl, *Lomaria pubescens* (Hook.) Kunze,
Lomaria triloba (C. Presl) Fée, *Blechnum hastatum* Kaulf.
var. *minor* Hook., *Blechnum parvulum* Phil., *Blechnum*
australe L. var. *triloba* (C. Presl) Hieron., *Blechnum*
australe L. var. *hastata* (Kaulf.) Hieron., *Blechnum australe*
L. fma. *trilobum* (C. Presl) Rosenst., *Blechnum auriculatum*
Cav. fma. *remotum* (C. Presl) C. Chr. & Skotts., *Blechnum*
auriculatum Cav. fma. *parvula* (Phil.) C. Chr. & Skotts.,
Blechnum auriculatum Cav. var. *trilobum* (C. Presl) Osten
& Herter, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *hastatum*
(Kaulf.) Looser, *Blechnum auriculatum* Cav. var. *parvulum*
(Phil.) Looser, *Blechnum hastatum* Kaulf. fma. *alternatum*

G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. fma. *punctatum* (Looser) G. Kunkel, *Blechnum hastatum* Kaulf. var. *trilobum* (C. Presl) G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) Kunkel fma. *imbricatum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *valdiviense* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel subsp. *parvulum* (Phil.) G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *nervosum* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *semidecurrens* G. Kunkel, *Blechnum brevifolium* G. Kunkel var. *brevifolium* fma. *acuminatum* G. Kunkel, *Taenitis sagittaefera* Bory, *Mesothema remotum* (C. Presl) C. Presl, *Mesothema trilobum* (C. Presl) C. Presl, *Parablechnum ciliatum* (C. Presl) C. Presl, *Blechnopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Struthiopteris hastata* (Kaulf.) Trevis., *Struthiopteris remota* (C. Presl) Trevis., *Struthiopteris triloba* (C. Presl) Trevis., *Spicanta hastata* (Kaulf.) Kuntze, *Blechnum auriculatum* auct. non Cav., *Mesothema hastatum* (Kaulf.) C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 5-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palmilla, quilquil, arriquilquil.

Blechnum longicauda C. Chr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 5-500 m.

Blechnum magellanicum (Desv.) Mett.

Sinónimos: *Lomaria magellanica* Desv., *Lomaria setigera* Gaudich., *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *setigerum* (Gaudich.) C. Chr., *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum* G. Kunkel

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Katalapi.

Blechnum microphyllum (Goldm.) C.V. Morton

Sinónimos: *Lomaria microphylla* Goldm., *Lomaria australis* Kunze, *Lomaria gayana* J. Remy, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm, *Blechnum gayanum* (J. Remy) J.W. Sturm fma. *germainii* (Hook.) Looser, *Lomaria germainii* Hook., *Lomaria andicola* Phil., *Lomaria araucana* Phil., *Blechnum germanii* (Hook.) H. Christ, *Blechnum andicola* (Phil.) C. Chr., *Blechnum araucanum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum poeppigianum* J.W. Sturm

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. *fernandezianum* (Looser) de la Sota

Sinónimos: *Blechnum blechnoides* (Bory) Keyserl. var. *fernandezianum* Looser

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-1100 m.

Blechnum mochaenum G. Kunkel var. *mochaenum*

Sinónimos: *Lomaria lechleri* T. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 5-1350 m.

Países limítrofes: Argentina.

Blechnum paschale (C. Chr.) Christenh

Sinónimos: *Doodia paschalis* C. Chr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 100-100 m.

Nombre vulgar: Nehe nehe.

Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn

Sinónimos: *Polypodium penna-marina* Poir., *Blechnum alpinum* Mett., *Blechnum alpinum* Mett. var. *elongatum* Mett., *Blechnum uliginosum* (Phil.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *uliginosa* (Phil.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn fma. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) C. Chr., *Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn var. *polypodioides* (Desv. ex Gaudich.) Looser, *Lomaria polypodioides* Desv. ex Gaudich., *Lomaria uliginosa* Phil., *Lomaria uliginosa* Phil. var. *magellanica* Phil., *Polypodium penna-marina* Poir., *Lomaria penna-marina* (Poir.) Mett.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pinque.

Blechnum schottii (Colla) C. Chr.

Sinónimos: *Lomaria schottii* Colla, *Lomaria bella* Phil., *Lomaria fernandeziana* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 50-820 m.

Blechnum x rodriguezii Aguiar, Quintanilla & Amigo
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 150-585 m.

CYSTOPTERIDACEAE

Cystopteris

Cystopteris apiiformis Gand.
Sinónimos: *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *apiiformis* (Gand.) C. Chr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

DAVALLIACEAE

Davallia

Davallia solida (G. Forster) Sw.
Hierba. Perenne. Nativa.
Nota: La expedición Franco-Belga de 1934 (Tardieu-Blot 1936), reporta la presencia de esta especie para la Isla de Pascua. Sin embargo, esta especie nunca más ha sido encontrada.

DENNSTAEDTIACEAE

Dennstaedtia

Dennstaedtia glauca (Cav.) C. Chr. ex Looser
Sinónimos: *Dicksonia lambertiana* J. Remy, *Davallia glauca* Cav., *Dennstaedtia lambertyana* (J. Remy) H. Christ
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 300-2360 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Histiopteris

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm.
Sinónimos: *Pteris incisa* Thunb., *Litobrochia incisa* (Thunb.) C. Presl, *Pteris flavescens* Colla, *Pteris patens* Kunze, *Pteris vespertilionis* Labill. var. *flavescens* (Colla) J. Agardh, *Litobrochia appendiculata* (Kaulf.) J. Remy, *Litobrochia patens* (Kunze) J. Remy, *Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Sm. var. *flavescens* (Colla) C. Chr., *Pteris vespertilionis* auct. non Labill.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 5-580 m.
Países limítrofes: Perú.

Hypolepis

Hypolepis poeppigii (Kunze) R.A. Rodr.
Sinónimos: *Polypodium poeppigii* Kunze, *Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée ex J. Remy, *Phegopteris sturmii* Phil., *Hypolepis rugosula* (Labill.) J. Sm. var. *poeppigii* (Kunze) C. Chr. & Skottsb., *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. var. *pubescens* Phil., *Hypolepis poeppigiana* Mett., *Hypolepis chilensis* Fée, *Phegopteris poeppigii* (Kunze) Fée var. *hirsuta* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 25-650 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Wilel-lawen, pesebre.

Microlepia

Microlepia strigosa (Thunb. ex Murray) C. Presl
Sinónimos: *Trichomanes strigosus* Thunb. ex Murray
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 100-300 m.

DICKSONIACEAE

Dicksonia

Dicksonia berteriana (Colla) Hook.
Sinónimos: *Davallia berteriana* Colla, *Balantium berterianum* Kunze
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-700 m.

Dicksonia externa C. Chr. & Skottsb.
Sinónimos: *Dicksonia berteriana* (Colla) Hook. var. *virgata* C. Chr. & Skottsb.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-700 m.

Lophosoria

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.
Sinónimos: *Polypodium quadripinnatum* J.F. Gmel., *Polypodium pruinatum* Sw., *Polypodium cinereum* Cav.,

Cyathea discolor Bory, *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf. ex Kunze, *Lophosoria pruinata* (Sw.) C. Presl, *Lophosoria quadripinnata* (J.F. Gmel.) C. Chr. fma. *viridifolia* G. Kunkel

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 5-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Palmita, palmilla, helecho o palmita de Valdivia, ampe.

Thyrsopteris

Thyrsopteris elegans Kunze

Sinónimos: *Dicksonia elegans* (Kunze) Mett., *Panicularia berterii* Colla

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

Dryopteris karwinskyana (Mett.) Kuntze

Sinónimos: *Aspidium karwinskyanum* Mett., *Dryopteris espinosai* Hicken, *Thelypteris espinosae* (Hicken) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 420 m.

Nota: Considerado extinto en la Isla de Pascua por Jean-Yves Meyer (2013) porque no ha sido observado o recolectado desde hace más de 75 años.

Elaphoglossum

Elaphoglossum fonkii (Phil.) T. Moore

Sinónimos: *Elaphoglossum mathewsii* auct. non (Fée) T. Moore, *Acrostichum fonkii* Phil.

Hierba saxícola. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore

Sinónimos: *Acrostichum gayanum* Fée

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Elaphoglossum lindenii (Bory ex Fée) T. Moore

Sinónimos: *Elaphoglossum squamatum* auct. non. (Sw.) T. Moore, *Acrostichum squamosum* Cav., *Acrostichum lindenii* Bory ex Fée

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Elaphoglossum porteri Hicken

Sinónimos: *Elaphoglossum rudolphii* Espinosa

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 600-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Elaphoglossum skottsbergii Krajina

Sinónimos: *Elaphoglossum gayanum* auct. non (Fée) T. Moore, *Elaphoglossum tahitense* auct. non Brack.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Rango altitudinal: 400-500 m.

Megalastrum

Megalastrum glabrius (C. Chr. & Skotts.) Sundue, Rouhan & R.C. Moran

Sinónimos: *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr. var. *glabrior* C. Chr. & Skotts., *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching var. *glabrior* (C. Chr. & Skotts.) G. Kunkel, *Megalastrum inaequalifolium* (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *glabrius* (C. Chr. & Skotts.) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-600 m.

Megalastrum inaequalifolium (Colla) A.R. Sm. & R.C. Moran

Sinónimos: *Polypodium inaequalifolium* Colla, *Dryopteris villosa* (L.) Kuntze var. *berteroana* (Hook.) C. Chr., *Dryopteris skottsbergii* C. Chr., *Dryopteris inaequalifolia* (Colla) C. Chr., *Ctenitis inaequalifolia* (Colla) Ching

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-600 m.

Megalastrum masafuerae Sundue, Rouhan & R.C. Moran

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100 m.

Megalastrum spectabile (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Sinónimos: *Megalastrum spectabile* (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran var. *philippianum* (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran, *Polypodium spectabile* Kaulf., *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr., *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel, *Dryopteris spectabilis* (Kaulf.) C. Chr. var. *philippiana* C. Chr., *Ctenitis spectabilis* (Kaulf.) G. Kunkel var. *philippiana* (C. Chr.) R.A. Rodr., *Polypodium contractum* Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pesebre.

Polystichum

Polystichum andinum Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polystichum chilense (Christ) Diels var. *chilense*

Sinónimos: *Polystichum bridgesii* Schott, *Aspidium aculeatum* (L.) Sw. var. *chilensis* C. Chr., *Aspidium bridgesii* (Schott) J.W. Sturm, *Aspidium pauciuspis* J.W. Sturm, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *chilense* (H. Christ) C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pelomén-lahuén.

Polystichum chilense (Christ) Diels var. *dusenii* (C. Chr.)

Looser ex R.A. Rodr.

Sinónimos: *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *dusenii* C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polystichum fuentesii Espinosa

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: IPA.

Nota: Considerado extinto en la Isla de Pascua por Jean-Yves Meyer (2013) porque no ha sido observado o recolectado desde hace más de 75 años.

Polystichum multifidum (Mett.) T. Moore

Sinónimos: *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *autranii* Hicken, *Aspidium multifidum* Mett., *Dryopteris metteniana* Kuntze, *Dicksonia andina* Phil., *Polystichum pearcei* Phil., *Polystichum nahuelhuapiense* Diem, *Aspidium pearcei* (Phil.) F. Phil., *Polystichum multifidum* (Mett.) T. Moore var. *pearcei* (Phil.) R.A. Rodr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polystichum plicatum (Poepp. ex Kunze) Hicken

Sinónimos: *Polystichum elegans* J. Remy, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl fma. *genuina* Hicken, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl fma. *latifolia* Hicken, *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *elegans* (J. Remy) C. Chr., *Polystichum mohrioides* (Bory) C. Presl var. *plicatum* (Poepp.) C. Chr., *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *laxum* Kunze, *Aspidium plicatum* Poepp. ex Kunze var. *rigidum* Kunze, *Aspidium elegans* (J. Remy) J.W. Sturm

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polystichum subintegerrimum (Hook. & Arn.) R.A. Rodr.

Sinónimos: *Polystichum brongniartianum* J. Remy, *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *brongniartianum* (J. Remy) C. Chr., *Polystichum aculeatum* (L.) Schott var. *subintegerrimum* (Hook. & Arn.) C. Chr., *Aspidium subintegerrimum* Hook. & Arn., *Aspidium brongniartianum* (J. Remy) J.W. Sturm

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Polystichum tetragonum Fée

Sinónimos: *Polystichum vestitum* auct. non (G. Forst.) C. Presl

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200 m.

Rumohra

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching

Sinónimos: *Polypodium adiantiforme* G. Forst., *Aspidium coriaceum* Sw., *Polystichum coriaceum* Schott, *Nephrodium duriusculum* C. Presl, *Polystichum adiantiforme* (G. Forst.) J. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pereq, calahuala, yerba del lagarto.

Rumohra berteriana (Colla) R.A. Rodr.
Sinónimos: *Aspidium berterianum* Colla, *Aspidium flexum* Kunze, *Polystichum berterianum* (Colla) C. Chr., *Aspidium capense* auct. non Willd.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-1200 m.

EQUISETACEAE

Equisetum

Equisetum bogotense Kunth
Sinónimos: *Equisetum flagelliforme* Kunze, *Equisetum flagelliferum* Kunze ex Milde, *Equisetum chilense* C. Presl ex Milde, *Equisetum rinihuense* G. Kunkel
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 10-3200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Limpia plata, yerba, yerba de la plata.

Equisetum giganteum L.
Sinónimos: *Equisetum poeppigianum* Mett., *Equisetum lechleri* Milde, *Equisetum tarapacatum* Phil., *Hippochaete gigantea* (L.) Holub, *Equisetum xylochaetum* Mett.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ARA.
Rango altitudinal: 20-2800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Cola de caballo, sojosojo.

Equisetum pyramidale Goldm.
Sinónimos: *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *scaberium* Milde, *Equisetum philippi* Gand., *Equisetum scandens* J. Remy, *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde, *Equisetum ramosissimum* Desf. var. *affine* Milde, *Equisetum araucanum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 10-2600 m.
Nombre vulgar: Cola de caballo.

GLEICHENIACEAE

Sticherus

Sticherus cryptocarpus (Hook.) Ching
Sinónimos: *Dicranopteris cryptocarpa* (Hook.) Looser, *Gleichenia cryptocarpa* Hook., *Mertensia cryptocarpa* (Hook.) J. Remy, *Sticherus cryptocarpus* (Hook.) Ching var. *looserianus* G. Kunkel
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 20-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba loza, cola de gallo, ampe.

Sticherus lepidotus (R.A. Rodr.) R.A. Rodr. & Ponce
Sinónimos: *Gleichenia lepidota* R.A. Rodr.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 500-1100 m.

Sticherus litoralis (Phil.) Nakai
Sinónimos: *Mertensia litoralis* Phil., *Gleichenia litoralis* (Phil.) C. Chr., *Dicranopteris pedalis* (Kaulf.) Looser var. *litoralis* (Phil.) Looser, *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Sprengel var. *litoralis* (Phil.) Looser, *Dicranopteris litoralis* (Phil.) Looser
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 3-1040 m.

Sticherus quadripartitus (Poir.) Ching
Sinónimos: *Polypodium quadripartitum* Poir., *Gleichenia acutifolia* Hook., *Mertensia acutifolia* (Hook.) J. Remy, *Gleichenia bibraeae* Mett. ex Kuhn, *Dicranopteris quadripartita* (Poir.) Looser, *Gleichenia quadripartita* (Poir.) T. Moore, *Mertensia magellanica* Desv., *Mertensia quadripartita* (Poir.) Poir., *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching fma. *bipartitus* G. Kunkel, *Sticherus quadripartitus* (Poir.) Ching fma. *simplex* G. Kunkel
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Yerba loza, palmita, pata de cucho.

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var. ***gunckelianus*** (Looser) R.A. Rodr. & Ponce
Sinónimos: *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore var. *gunckeliana* (Looser) Duek, *Dicranopteris squamulosa* (Desv.) Looser var. *gunckeliana* Looser
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Sticherus squamulosus (Desv.) Nakai var. ***squamulosus***
Sinónimos: *Gleichenia pedalis* (Kaulf.) Spreng.,
Dicranopteris pedalis (Kaulf.) Looser, *Sticherus pedalis*
(Kaulf.) Ching, *Gleichenia squamulosa* (Desv.) T. Moore,
Mertensia squamulosa Desv., *Mertensia pedalis* Kaulf.,
Mertensia oligocarpa Phil., *Gleichenia oligocarpa* (Phil.)
C. Chr., *Dicranopteris oligocarpa* (Phil.) Looser, *Sticherus*
oligocarpus (Phil.) Nakai, *Sticherus squamulosus* (Desv.)
Nakai var. *glaber* (T. Moore) Nakai, *Dicranopteris*
squamulosa (Desv.) Looser
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 3-1500 m.
Nombre vulgar: Yerba loza, palmita, huedahue.

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenoglossum

Hymenoglossum cruentum (Cav.) C. Presl
Sinónimos: *Hymenophyllum cruentum* Cav.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Helecho película, sanguinaria, seda de la
luma.

Hymenophyllum

Hymenophyllum caudiculatum Mart. var. ***productum*** (C.
Presl) C. Chr.
Sinónimos: *Hymenophyllum caudatum* Bosch,
Hymenophyllum patagonicum Gand., *Sphaerocionium*
productum C. Presl, *Mecodium caudiculatum* (Mart.)
Copel. fma. *productum* (C. Presl) G. Kunkel, *Mecodium*
caudiculatum (Mart.) Copel. fma. *nanum* G. Kunkel
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pallante chilote.

Hymenophyllum cuneatum Kunze var. ***cuneatum***
Sinónimos: *Hymenophyllum cumingii* C. Presl, *Mecodium*
cuneatum (Kunze) Copel., *Hymenophyllum polyanthos*
auct. non (Sw.) Sw.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 400-1000 m.

Hymenophyllum cuneatum Kunze var. ***rarifforme*** C. Chr.
& Skottsbo.
Sinónimos: *Hymenophyllum terminale* Phil.,
Hymenophyllum cuneatum Kunze fma. *imbricata* C. Chr.
& Skottsbo., *Mecodium cuneatum* (Kunze) Copel. var.
rarifforme (C. Chr. & Skottsbo.) G. Kunkel
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 300-500 m.

Hymenophyllum darwinii Hook.f. ex Bosch
Sinónimos: *Hymenophyllum abruptum* Hook. var.
brevifrons (Kunze) Franch., *Hymenophyllum skottsbergii* C.
Chr., *Hymenophyllum rarum* R. Br. var. *darwinii* (Bosch)
Neger
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hymenophyllum dentatum Cav.
Sinónimos: *Hymenophyllum bridgesii* Hook.,
Hymenophyllum trichocaulum Phil., *Sphaerocionium*
bridgesii (Hook.) Klotzsch, *Leptocionium dentatum* (Cav.)
Bosch, *Meringium dentatum* (Cav.) Copel.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Shushu-lahuén.

Hymenophyllum dicranotrichum (C. Presl) Hook. ex
Sadeb.
Sinónimos: *Hymenophyllum chiloense* Hook., *Leptocionium*
dicranotrichum C. Presl, *Trichomanes spinulosum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Hymenophyllum falklandicum Baker
Sinónimos: *Hymenophyllum falklandicum* Baker var.
elongatum Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum glebarium*
H. Christ ex C. Chr., *Hymenophyllum caespitosum* auct.
non Gaudich., *Hymenophyllum falklandicum* Baker var.
falklandicum fma. *andinum* Diem & J.S. Licht.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hymenophyllum ferrugineum Colla
Sinónimos: *Hymenophyllum frankliniae* Colenso,
Hymenophyllum berteroi Hook., *Sphaerocionium*

ferrugineum (Colla) Copel., *Hymenophyllum ferrugineum*
Colla var. *donatii* Looser, *Hymenophyllum subtilissimum*
Kunze

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum fuciforme* Sw.**

Sinónimos: *Hymenophyllum semiteres* Colla, *Leptocionium fuciforme* (Sw.) C. Presl, *Mecodium fuciforme* (Sw.) Copel.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum krauseanum* Phil.**

Sinónimos: *Hymenophyllum magellanicum* Willd. ex Kunze var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum dichotomum* Cav. var. *krauseanum* (Phil.) C. Chr., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *krauseanum* (Phil.) Looser, *Meringium krauseanum* (Phil.) G. Kunkel
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum nahuelhuapiense* Diem & J.S. Licht.**

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum pectinatum* Cav.**

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv.**

Sinónimos: *Trichomanes peltatum* Poir., *Hymenophyllum menziesii* C. Presl, *Hymenophyllum meyeri* C. Presl, *Hymenophyllum megachilum* C. Presl, *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *elongatum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum mettenii* Bosch, *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *minor* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Desv. var. *patagonicum* Diem & J.S. Licht., *Hymenophyllum unilaterale* Bory, *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. var. *wilsoni* (Hook.) Sadeb., *Hymenophyllum wilsonii* Hook.
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Hymenophyllum plicatum* Kaulf.**

Sinónimos: *Ptychophyllum plicatum* (Kaulf.) C. Presl, *Hymenophyllum quadrifidum* Phil., *Hymenophyllum plicatum* Kaulf. var. *quadrifidum* (Phil.) Looser, *Meringium plicatum* (Kaulf.) Copel., *Hymenophyllum dichotomum* auct. non Cav., *Hymenophyllum nigricans* Colla
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsbo.**

Sinónimos: *Hymenophyllum rugosum* C. Chr. & Skottsbo. fna. *lanceolatum* C. Chr. & Skottsbo., *Hymenophyllum tunbrigense* auct. non (L.) Sm.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 400-700 m.

***Hymenophyllum secundum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Hymenophyllum serra* C. Presl, *Meringium secundum* (Hook. & Grev.) Copel.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum seselifolium* C. Presl**

Sinónimos: *Didymoglossum magellanicum* Desv., *Hymenophyllum attenuatum* Hook., *Ptychophyllum magellanicum* Klotzsch, *Hymenophyllum bibraianum* J.W. Sturm, *Leptocionium attenuatum* (Hook.) Bosch, *Leptocionium magellanicum* (Desv.) Bosch, *Leptocionium seselifolium* (C. Presl) Bosch, *Meringium magellanicum* (Desv.) Copel., *Hymenophyllum magellanicum* (Desv.) Willd. ex Kunze
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Myrmecostylum tortuosum* (Hook. & Grev.) C. Presl, *Leptocionium tortuosum* (Hook. & Grev.) Bosch, *Trichomanes beckeri* E.H.L. Krause ex Phil., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *beckeri* (E.H.L. Krause ex Phil.) Espinosa, *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev. var. *bustillosii* Espinosa, *Meringium tortuosum* (Hook. & Grev.) Copel., *Hymenophyllum tortuosum* Hook. & Grev.

var. *glomeratum* Diem & J.S. Licht.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.
Sinónimos: *Trichomanes tunbrigense* L., *Hymenophyllum antarcticum* C. Presl, *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm.
var. *asperulum* (Kunze) Diem & J.S. Licht.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hymenophyllum umbratile Diem & J.S. Licht.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Serpyllopsis

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var. *caespitosa*
Sinónimos: *Serpyllopsis caespitosa* (Gaudich.) C. Chr.
var. *dusenii* (H. Christ) C. Chr., *Serpyllopsis caespitosa*
(Gaudich.) C. Chr. var. *densifolia* (Phil.) C. Chr., *Serpyllopsis caespitosa*
(Gaudich.) C. Chr. var. *elongata* (Hook.) C. Chr., *Hymenophyllum caespitosum*
Gaudich., *Trichomanes caespitosum* (Gaudich.) Hook.f., *Leptocionium caespitosum*
C. Presl, *Hymenophyllum dusenii* H. Christ
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Serpyllopsis caespitosa (Gaudich.) C. Chr. var.
fernandeziana C. Chr. & Skottsbo.
Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 400-1400 m.

Trichomanes

Trichomanes exsectum Kunze
Sinónimos: *Vandenboschia exsecta* (Kunze) Copel.,
Polyphlebium exsectum (Kunze) Ebihara & Dubuisson
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Trichomanes ingae C. Chr. & Skottsbo.
Sinónimos: *Vandenboschia ingae* (C. Chr. & Skottsbo.)
Copel., *Polyphlebium ingae* (C. Chr. & Skottsbo.) Ebihara

& Dubuisson
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-400 m.

Trichomanes philippianum J.W. Sturm
Sinónimos: *Vandenboschia philippiana* (J.W. Sturm)
Copel., *Polyphlebium philippianum* (J.W. Sturm) Ebihara &
Dubuisson, *Trichomanes dichotomum* Phil.
Hierba epífita o saxícola. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 500-700 m.

MARSILEACEAE

Marsilea

Marsilea mollis B.L. Rob. & Fernald
Sinónimos: *Marsilea punae* de la Sota
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Pilularia

Pilularia americana A. Braun
Sinónimos: *Pilularia valdiviana* Phil. ex Baker, nom. nud.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

OLEANDRACEAE

Arthropteris

Arthropteris altescandens (Colla) J. Sm.
Sinónimos: *Polypodium altescandens* Colla, *Polypodium procurrans*
Kunze, *Nephrolepis altescandens* (Colla) Baker
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-700 m.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium

Botrychium dusenii (H. Christ) Alston
Sinónimos: *Botrychium ramosum* Asch. var. *patagonicum*

H. Christ, *Botrychium lunaria* (L.) Sw. var. *dusenii* H. Christ, *Botrychium matricariaefolium* A. Braun subsp. *patagonicum* (C. Chr.) R.T. Clausen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ophioglossum

Ophioglossum crotalophoroides Walter
Sinónimos: *Ophioglossum tuberosum* Hook. & Arn., *Ophioglossum stipatum* Miers ex Colla, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *crotalophoroides* (Walter) D.C. Eaton
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Ophioglossum fernandezianum C. Chr.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Ophioglossum melipillense J. Remy
Sinónimos: *Ophioglossum lusitanicum* L. subsp. *coriaceum* (A.Cunn.) R.T. Clausen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ophioglossum reticulatum L.
Sinónimos: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl, *Ophioglossum vulgatum* L. var. *reticulatum* (L.) Luerss.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 10-45 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tiapito.

Ophioglossum vulgatum L.
Sinónimos: *Ophioglossum nudicaule* L. var. *robustum* J.S. Licht., *Ophioglossum valdivianum* Phil., *Ophioglossum vulgatum* L. var. *valdivianum* (Phil.) J.S. Licht.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Huentru-lahuén.

POLYPODIACEAE

Grammitis

Grammitis magellanica Desv.
Sinónimos: *Polypodium magellanicum* (Desv.) J.W. Sturm, *Polypodium magellanicum* (Desv.) Copel., comb. illeg., *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota, *Polypodium gramineum* auct. non Sw., *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 30-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Grammitis patagonica (C. Chr.) Parris
Sinónimos: *Grammitis repanda* Kunze ex Mett., *Polypodium patagonicum* C. Chr., *Grammitis ciliata* auct. non Colenso, *Polypodium jungermannioides* auct. non Klotzsch
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Grammitis poeppigiana (Mett.) Pic. Serm.
Sinónimos: *Polypodium poeppigianum* Mett., *Grammitis australis* R. Br. var. *nana* (Brack.) Franch., *Polypodium australe* Mett. var. *nanum* Brack. ex Macloskie, *Polypodium billardieri* (Willd.) C. Chr. var. *magellanicum* (Desv.) C. Chr. fma. *nanum* (Brack.) Franch. ex Skottsbo., *Grammitis billardieri* Willd. var. *magellanica* (Desv.) de la Sota fma. *nana* (Brack.) de la Sota, *Grammitis magellanica* Desv. fma. *nana* (Brack.) de la Sota ex T.R. Dudley, *Grammitis nana* auct. non Fée
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Microsorium

Microsorium scolopendria (Burm.f.) Copel.
Sinónimos: *Polypodium scolopendria* Burm.f., *Polypodium phymatodes* L., *Polypodium fuentesii* Hicken, *Phymatodes scolopendria* (Burm.f.) Ching, *Phymatosorus scolopendria* (Burm.f.) Pic.-Ser.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.

Pleopeltis

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.
Sinónimos: *Polypodium macrocarpum* Bory ex Willd., *Polypodium lanceolatum* L., *Grammitis robusta* Phil.,

Polypodium lanceolatum L. var. *araucanum* (Phil.) Looser, *Phlebodium lanceolatum* (L.) J. Sm., *Drynaria lanceolata* (L.) Fée, *Drynaria macrocarpa* (Bory ex Willd.) Fée, *Lepicystis lanceolata* (L.) Diels, *Grammitis araucana* Phil., *Drynaria elongata* auct. non Feé

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Pleopeltis x cerro-altoensis Danton & Boudrie

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Polypodium

Polypodium masafuerae Phil.

Sinónimos: *Pleopeltis masafuerae* (Phil.) de la Sota, *Polypodium macrocarpum* auct. non Presl

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Polypodium pycnocarpum C. Chr.

Sinónimos: *Polypodium squamatum* Phil., *Polypodium atacamense* Baker ex Ball, *Polypodium mollendense* Maxon

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Synammia

Synammia espinosae (Weath.) G. Kunkel

Sinónimos: *Polypodium espinosae* Weath.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Synammia feuillei (Bertero) Copel.

Sinónimos: *Grammitis triloba* (Cav.) Desv., *Polypodium glaucescens* Bory, *Synammia triloba* (Cav.) C. Presl, *Synammia skottsbergii* G. Kunkel, *Polypodium synammia* (Fée ex J. Remy) C. Chr., *Polypodium feuillei* Bertero, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *trilobum* (Cav.) Looser, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *simplex* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero fma. *basiscopicum* Looser, *Polypodium feuillei* Bertero var. *feuillei* fma. *unilaterale* G. Kunkel, *Polypodium feuillei* Bertero var. *feuillei*, *Polypodium feuillei* Bertero var. *minor* G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei*, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *simplex* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei*

(Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *basiscopicum* (Looser) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *unilaterale* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *feuillei* fma. *hastifolia* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *minor* (G. Kunkel) G. Kunkel, *Mecosorus trilobus* (Cav.) Klotzsch, *Goniophlebium synammia* Fée ex J. Remy, *Goniophlebium trilobum* (Cav.) T. Moore, *Polypodium trilobum* auct. non Houtt., *Goniophlebium californicum* auct. non Fée, *Polypodium feuillei* Bertero var. *ibañezii* Looser, *Synammia feuillei* (Bertero) Copel. var. *ibañezii* (Looser) G. Kunkel, nom. illeg.

Hierba epífita o saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calahuala, hierba del lagarto, pillavilcún.

Synammia intermedia (Colla) G. Kunkel subsp. *intermedia*

Sinónimos: *Polypodium translucens* Kunze, *Polypodium intermedium* Colla, *Polypodium intermedium* Colla var. *basicompositum* C. Chr. & Skotts., *Polypodium intermedium* Colla var. *fernandezianum* Espinosa, *Synammia intermedia* (Colla) G. Kunkel subsp. *masatierrae* (C. Chr. & Skotts.) G. Kunkel, *Goniophlebium translucens* (Kunze) Fée

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Synammia intermedia (Colla) G. Kunkel subsp. *masafuerana* (C. Chr. & Skotts.) G. Kunkel

Sinónimos: *Polypodium intermedium* Colla subsp. *masafueranum* C. Chr. & Skotts.

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200 m.

PSILOACEAE

Psilotum

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Nota: La expedición Franco-Belga de 1934 (Tardieu-Blot 1936), reporta la presencia de esta especie para la Isla de Pascua. Sin embargo, esta especie nunca más ha sido encontrada.

PTERIDACEAE

Adiantum

***Adiantum capillus-veneris* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Adiantum chilense* Kaulf. var. *chilense

Sinónimos: *Adiantum aethiopicum* L. var. *glabrum* Kuntze,

Adiantum mochaenum G. Kunkel

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Doradilla, helecho de palo negro, palito negro, culantrillo.

***Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev.**

Sinónimos: *Adiantum pubescens* C. Presl, *Adiantum*

glanduliferum Link, *Adiantum pilosum* Fée, *Adiantum*

aethiopicum L. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) Kuntze,

Adiantum poiretii Wikstr. fma. *hirsutum* (Hook. & Grev.)

Hicken, *Adiantum weatherbyanum* Espinosa, *Adiantum*

poiretii Wikstr. var. *hirsutum* (Hook. & Grev.) R.M. Tryon,

Adiantum thalictroides Willd. ex Schldl. var. *hirsutum*

(Hook. & Grev.) De la Sota

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1700-3400 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

***Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum* (Kaulf.) Hicken**

Sinónimos: *Adiantum scabrum* Kaulf. var. *scabrum*,

Adiantum aethiopicum L. var. *scabrum* (Kaulf.) Kuntze,

Adiantum philippianum Espinosa, *Adiantum scabrum*

Kaulf. var. *philippianum* (Espinosa) Looser, *Adiantum*

glanduliferum auct. non Link

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adiantum excisum* Kunze**

Sinónimos: *Adiantum tenerum* auct. non Sw.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

***Adiantum gertrudis* Espinosa**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

***Adiantum pearcei* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-900 m.

***Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *majus* Hook.**

Sinónimos: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *cuneifolium*

Meigen, *Adiantum sulfureum* auct. non Kaulf.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *sulphureum

Sinónimos: *Adiantum sulphureum* Kaulf. var. *minus* Hook.,

Adiantum subsulphureum J. Remy, *Adiantum aethiopicum*

L. var. *sulphureum* (Kaulf.) Kuntze, *Adiantum sulphureum*

Kaulf. var. *subsulphureum* (J. Remy) Looser, *Adiantum*

poiretii Wikstr. var. *sulphureum* (Kaulf.) R.M. Tryon,

Adiantum chilense Kaulf. var. *sulphureum* (Hook.) Giúdice

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Argyrochosma

***Argyrochosma chilensis* (J. Remy) Windham**

Sinónimos: *Pellaea chilensis* (J. Remy) C. Chr., *Notholaena*

chilensis (J. Remy) J.W. Sturm, *Cincinalis chilensis* J.

Remy, *Pellaea chilensis* Fée, nom. nud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

***Argyrochosma nivea* (Poir.) Windham**

Sinónimos: *Notholaena nivea* (Poir.) Desv., *Pellaea nivea*

(Poir.) Prantl, *Pteris nivea* Poir., *Acrostichum albidulum*

Sw., *Cincinalis nivea* (Poir.) Desv., *Gymnogramma nivea*

(Poir.) Mett., *Cincinalis tarapacana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chujchu, qusupe.

Astrolepis

Astrolepis sinuata (Lag. ex Sw.) D.M. Benham & Windham
Sinónimos: *Cheilanthes sinuata* (Lag. ex Sw.) Domin, *Notholaena sinuata* (Lag. ex Sw.) Kaulf., *Acrostichum sinuatum* Lag. ex Sw., *Gymnogramma sinuata* (Lag. ex Sw.) C. Presl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cheilanthes

Cheilanthes arequipensis (Maxon) R.M. Tryon & A. F. Tryon
Sinónimos: *Notholaena arequipensis* Maxon
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Cheilanthes glauca (Cav.) Mett.
Sinónimos: *Cheilanthes chilensis* Fée, *Allosorus hirsutus* C. Presl, *Acrostichum glaucum* Cav., *Pteris glauca* (Cav.) Cav., *Pteris microphylla* Colla, *Pellaea hirsuta* (C. Presl) Hook., *Pellaea glauca* (Cav.) J. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett.
Sinónimos: *Notholaena tomentosa* (Desv.) Desv., *Cincinnati tomentosa* Desv., *Notholaena hypoleuca* Kunze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Doradilla.

Cheilanthes mollis (Kunze) C. Presl
Sinónimos: *Cheilanthes doradilla* (Colla) Domin, *Notholaena mollis* Kunze, *Notholaena doradilla* Colla
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, LLA.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Doradilla.

Cheilanthes myriophylla Desv.

Sinónimos: *Cheilanthes elegans* Desv., *Cheilanthes myriophylla* Desv. var. *elegans* (Desv.) Hicken, *Notholaena myriophylla* J. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 200-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Cheilanthes pilosa Goldm.

Sinónimos: *Cheilanthes macleanii* Hook., *Cheilanthes andina* Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 800-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cheilanthes pruinata Kaulf.

Sinónimos: *Cheilanthes mathewsii* Kunze, *Cheilanthes fasciculata* Goldm., *Cheilanthes micropteris* auct. non Sw.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chujchu, qusupe.

Cryptogramma

Cryptogramma fumariifolia (Phil. ex Baker) H. Christ
Sinónimos: *Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. var. *chilensis* (C. Chr.) Looser, *Allosorus crispus* Bernh. var. *chilensis* C. Chr., *Pellaea fumariaefolia* Phil. ex Baker, *Allosorus fumariaefolius* (Phil. ex Baker) Kuntze, *Pellaea fumariifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 900-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Myriopteris

Myriopteris aurea (Poir.) Grusz & Windham
Sinónimos: *Notholaena rufa* C. Presl, *Notholaena bonariensis* (Willd.) C. Chr., *Notholaena aurea* (Poir.) Desv., *Acrostichum bonariense* Willd., *Pteris aurea* Poir., *Cheilanthes bonariensis* (Willd.) Proctor
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 600-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Notholaena

Notholaena sulphurea (Cav.) J. Sm.

Sinónimos: *Notholaena lepida* (Phil.) Looser, *Pteris sulphurea* Cav., *Chrysochosma sulphurea* (Cav.) Kümmerle, *Cheilanthes lepida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Pellaea

Pellaea myrtilifolia Mett. ex Kuhn

Sinónimos: *Allosorus andromedaefolius* auct. non (Kaulf.)

Kunze, *Pellaea andromedaefolia* auct. non (Kaulf.) Fée

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-2000 m.

Nombre vulgar: Coca, hierba coca, lendo del cerro.

Pellaea ternifolia (Cav.) Link

Sinónimos: *Allosorus ternifolius* Kunze ex Klotzsch, *Pteris ternifolia* Cav., *Cheilanthes ternifolia* (Cav.) T. Moore, *Pteris tryphylla* Bertero ex Colla, nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, VAL, LBO, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 200-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Qusupi, qusupe, yuquelahuén.

Pteris

Pteris berteriana J. Agardh

Sinónimos: *Litobrochia berteriana* (J. Agardh) Fée, *Pteris comans* G. Forst. var. *berteriana*, *Pteris tenera* auct. non Kaulf., *Litobrochia decurrens* auct. non C. Presl, *Pteris comans* auct. non G. Forst., *Pteris incisa* auct. non Thunb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Pteris chilensis Desv.

Sinónimos: *Pteris tenera* Kaulf., *Pteris fernandeziana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Pteris semiadnata Phil.

Sinónimos: *Pteris marattiaefolia* Hook., *Pteris flexuosa* auct. non Kaulf.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 600-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trismeria

Trismeria trifoliata (L.) Diels

Sinónimos: *Pityrogramma trifoliata* (L.) R.M. Tryon, *Acrostichum trifoliatum* L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Vittaria

Vittaria ensiformis Sw.

Sinónimos: *Vittaria incurvata* Cav., *Vittaria elongata* auct., non Sw., *Vittaria costata* auct. non Kunze

Hierba saxícola. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

SALVINIACEAE

Azolla

Azolla filiculoides Lam.

Sinónimos: *Azolla magellanica* Willd., *Azolla squamosa* Molina, *Azolla arbuscula* Desv.

Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Flor del pato, tembladerilla, luchecillo, jupajupa.

Salvinia

Salvinia auriculata Aubl.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL.

SCHIZAEACEAE

Schizaea

Schizaea fistulosa Labill.

Sinónimos: *Schizaea australis* Gaudich., *Schizaea palmata* Hombr. & Jacq., *Schizaea chilensis* Phil., *Schizaea fistulosa* Labill. var. *australis* (Gaudich.) Hook.f., *Microschizaea fistulosa* (Labill.) C.F. Reed, *Schizaea valdiviana* Phil. ex Hook. & Baker

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris

Thelypteris argentina (Hieron.) Abbiatti
Sinónimos: *Aspidium argentinum* Hieron., *Dryopteris argentina* (Hieron.) C. Chr., *Lastrea argentina* (Hieron.) Copel., *Aspidium rivulorum* auct. non Link
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-3300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Regalis.

Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats.
Sinónimos: *Aspidium gongyloides* Schkuhr, *Dryopteris gongyloides* (Schkuhr) Kuntze, *Polypodium tottum* Thunb., *Pteris interrupta* Willd., *Thelypteris totta* (Thunb.) Schelpe
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

WOODSIACEAE

Woodsia

Woodsia montevidensis (Sprengel) Hieron.
Sinónimos: *Dicksonia montevidensis* Sprengel, *Woodsia crenata* (Kunze) Hieron.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

PINOPHYTA

GNETOPSIDA

EPHEDRACEAE

Ephedra

Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sinónimos: *Ephedra breana* Phil., *Ephedra wraithiana* I.M. Johnst., *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *humboldtii* Stapf
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 500-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pingo-pingo.

Ephedra chilensis C. Presl
Sinónimos: *Ephedra rupestris* Benth., *Ephedra frustillata* Miers, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *andina* (Poepp. ex C.A. Mey.) Stapf, *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey. fma. *abbreviata* Stapf ex Skottsb., *Ephedra araucana* Phil., *Ephedra bracteata* Miers, *Ephedra dumosa* Miers, *Ephedra monticola* Miers, *Ephedra nana* Dusén, *Ephedra patagonica* Phil. ex Stapf, *Ephedra americana* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *rupestris* (Benth.) Ball, *Ephedra humilis* Wedd., *Ephedra andina* Poepp. ex C.A. Mey. var. *humilis* Parlat.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 100-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pingo-pingo, solupe, sulupe, transmontana.

Ephedra gracilis Phil. ex Stapf
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 10-1200 m.

Ephedra multiflora Phil. ex Stapf
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pingo-pingo.

Ephedra ochreatea Miers
Sinónimos: *Ephedra ochreatea* Miers var. *striata* Gillies ex Miers
Arbusto. Nativo.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 389-389 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ephedra trifurcata Zoellner

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 200-300 m.

PINOPSIDA

ARAUCARIACEAE

Araucaria

Araucaria araucana (Molina) K. Koch

Sinónimos: *Araucaria imbricata* Pav., *Columbea quadrifaria* Salisb., *Pinus araucana* Molina, *Dombeya chilensis* Lam., *Araucaria chilensis* Mirb., *Araucaria dombeyi* Rich.

Árbol. Nativo.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 600-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Araucaria, piñonero, pehuén.

CUPRESSACEAE

Austrocedrus

Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Serm. & Bizzarri

Sinónimos: *Austrocedrus chilensis* (D. Don) Florin & Boutelje, comb. illeg., *Libocedrus chilensis* (D. Don) Endl., *Thuja andina* Poepp., *Thuja chilensis* D. Don

Árbol. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 250-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ciprés de la cordillera, ciprés, len.

Fitzroya

Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Fitzroya patagonica* Hook.f. ex Lindl., *Libocedrus cupressoides* (Molina) Kuntze, *Pinus cupressoides* Molina

Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Alerce, lahuén, lahual.

Pilgerodendron

Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin

Sinónimos: *Juniperus uvifera* D. Don, *Libocedrus tetragona* (Hook.) Endl., *Thuja tetragona* Hook., *Libocedrus uvifera* (D. Don) Pilg.

Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ciprés de las Guaitecas.

PINACEAE

Pinus

Pinus contorta Douglas ex Loudon

Árbol. Introducido.

Distribución: ARA, AIS.

Pinus pinaster Aiton

Árbol. Introducido.

Distribución: NUB, BIO.

Nombre vulgar: Pino marítimo.

Pinus radiata D. Don

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Pino insigne.

PODOCARPACEAE

Lepidothamnus

Lepidothamnus fonkii Phil.

Sinónimos: *Dacrydium foncki* (Phil.) Ball

Arbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ciprés enano.

Podocarpus

Podocarpus nubigena Lindl.

Árbol. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mañío, mañío de hojas punzantes, pino amarillo.

Podocarpus saligna D. Don

Sinónimos: *Podocarpus chilinus* Rich.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Nombre vulgar: Mañío de hojas largas, mañío.

Prumnopitys

Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub.

Sinónimos: *Prumnopitys spicata* (Poepp. ex Endl.) Molloy & Muñoz-Schick, comb. illeg., *Podocarpus andina* Poepp. ex Endl., *Prumnopitys elegans* Phil., *Podocarpus spicatus* Poepp., *Podocarpus valdiviana* J. Nelson, *Stachycarpus andina* (Poepp. ex Endl.) Tiegh., *Nageia andina* (Poepp. ex Endl.) F. Muell.

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lleuque, uva de la cordillera.

Saxegothaea

Saxegothaea conspicua Lindl.

Sinónimos: *Squamataxus albertiana* J. Nelson

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mañío hembra, mañío.

MAGNOLIOPHYTA

LILIOPSIDA

ALISMATACEAE

Alisma

Alisma lanceolatum With.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Alisma plantago-aquatica L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Sagittaria

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltld. subsp. ***chilensis*** (Cham. & Schltld.) Bogin

Sinónimos: *Sagittaria chilensis* Cham. & Schltld., *Sagittaria andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Lengua de vaca.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltld. subsp. ***montevidensis***

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Sagittaria rhombifolia Cham.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

ALSTROEMERIACEAE

Alstroemeria

Alstroemeria achirae Muñoz-Schick & Brinck

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1500-1900 m.

Alstroemeria andina Phil. var. ***andina***

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2900-3700 m.

Alstroemeria andina Phil. var. ***venustula*** (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Alstroemeria venustula* Phil., *Alstroemeria andina* Phil. subsp. *venustula* (Phil.) Ehr. Bayer

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2300-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. ***angustifolia***

Sinónimos: *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *conferta* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *intermedia* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *solliana* Herb., *Alstroemeria angustifolia* Herb. var. *acuminata* Herb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Alstroemeria angustifolia Herb. var. *velutina* (Ehr. Bayer) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Alstroemeria angustifolia* Herb. subsp. *velutina* Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 500-2000 m.

Alstroemeria aurea Graham
Sinónimos: *Alstroemeria aurantiaca* D. Don, *Alstroemeria mutabilis* Kunze, *Alstroemeria chiloensis* Phil., *Alstroemeria araucana* Phil., *Alstroemeria ligtu* auct. non L., *Alstroemeria stenopetala* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 200-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Liuto amarillo.
Nota: Introducida en Magallanes según E. Domínguez.

Alstroemeria citrina Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.

Alstroemeria crispata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1100-3000 m.

Alstroemeria cummingiana Herb.
Sinónimos: *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *cummingiana* (Herb.) Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. *chrysantha* Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Alstroemeria diluta Ehr. Bayer subsp. *diluta*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 300 m.

Alstroemeria exerens Meyen
Sinónimos: *Alstroemeria diazii* Phil., *Alstroemeria pallens* Phil., *Alstroemeria exserens* Meyen
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-2100 m.

Alstroemeria garaventae Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1200-2000 m.

Alstroemeria graminea Phil.
Sinónimos: *Taltalia graminea* (Phil.) Ehr. Bayer
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *hookeri*
Sinónimos: *Alstroemeria rosea* Hook., *Alstroemeria hookeriana* Schult.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *maculata* Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *recumbens* (Herb.) Ehr. Bayer
Sinónimos: *Alstroemeria recumbens* Herb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. *sansebastianae* C.M. Baeza & E. Ruiz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria kingii Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Alstroemeria leporina Ehr. Bayer & Grau
Sinónimos: *Alstroemeria hirtella* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 900-2000 m.

Alstroemeria ligtu L. subsp. *ligtu*
Sinónimos: *Alstroemeria flava* Phil., *Alstroemeria lothiana* Utnet, *Alstroemeria chilensis* Lem., *Alstroemeria haemantha* Ruiz & Pav.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Liuto.

Alstroemeria ligtu L. subsp. *simsii* (Spreng.) Ehr. Bayer
Sinónimos: *Alstroemeria haemantha* auct. non Ruiz & Pav.,
Alstroemeria simsii Spreng., *Alstroemeria ciliata* Poepp.,
Alstroemeria pulchella auct. non L.f., *Alstroemeria pulchella*
L. f. var. *pilosa* Lindl., *Alstroemeria haemantha* Ruiz &
Pav. var. *pilosa* (Lindl.) Herb., *Alstroemeria haemantha*
Ruiz & Pav. var. *simsiana* Herb., *Alstroemeria quillotensis*
Herb., *Alstroemeria macraeana* Herb., *Alstroemeria aurea*
Graham var. *valparadisiaca* Herb., *Alstroemeria aurea*
Meyen, hom. illeg., *Alstroemeria dentata* Klotzsch
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Alstroemeria ligtu L. subsp. *splendens* Muñoz-Schick
Sinónimos: *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *incarnata* Ehr.
Bayer, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1100-1400 m.

Alstroemeria lutea Muñoz-Schick
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR.

Alstroemeria magnifica Herb. var. *magenta* (Ehr. Bayer)
Muñoz-Schick
Sinónimos: *Alstroemeria magenta* Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Alstroemeria magnifica Herb. var. *magnifica*
Sinónimos: *Alstroemeria gayana* Phil., *Alstroemeria*
magnifica Herb. subsp. *gayana* (Phil.) Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Lirio morado.

Alstroemeria magnifica Herb. var. *sierrae* (Muñoz)
Muñoz-Schick
Sinónimos: *Alstroemeria sierrae* Muñoz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Alstroemeria magnifica Herb. var. *tofoensis* Muñoz-Schick
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 600-700 m.

Alstroemeria marticorenae Negritto & C.M. Baeza
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Alstroemeria mollensis Muñoz-Schick & Brinck
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2000-2200 m.

Alstroemeria pallida Graham
Sinónimos: *Alstroemeria albiflora* C. Presl, *Alstroemeria*
rosea Phil., *Alstroemeria ligtu* L. var. *andina* Phil.,
Alstroemeria nivalis Phil., hom. illeg., *Alstroemeria*
nubigena Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1100-2800 m.

Alstroemeria parvula Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2200-2600 m.

Alstroemeria patagonica Phil.
Sinónimos: *Alstroemeria nana* Rendle, *Alstroemeria*
patagonica Phil. fma. *biflora* Ravenna, *Alstroemeria*
pygmaea auct. non Herb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Alstroemeria pelegrina L.
Sinónimos: *Alstroemeria amoena* Salisb., *Alstroemeria*
pelegrina L. var. *albescens* Herb., *Alstroemeria gayana*
Phil. var. *humilis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria philippii Baker var. *albicans* Muñoz-Schick
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 300-400 m.

Alstroemeria philippii Baker var. *philippii*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.

Alstroemeria piperata A.R. Flores & J.M. Watson
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1200-1500 m.

Alstroemeria polyphylla Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 800-900 m.

Alstroemeria presliana Herb. subsp. *australis* Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-1500 m.

Alstroemeria presliana Herb. subsp. *presliana*
Sinónimos: *Alstroemeria chillanensis* Grau & Ehr.
Bayer, *Alstroemeria diazii* auct. non Phil., *Alstroemeria epulauquensis* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1300-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Alstroemeria pseudospathulata Ehr. Bayer
Sinónimos: *Alstroemeria crocea* Phil., *Alstroemeria lacrima-solis* Ravenna, *Alstroemeria spathulata* auct. non C. Presl, *Alstroemeria oxyphylla* Ravenna, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Alstroemeria pulchra Sims subsp. *lavandulacea* Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Alstroemeria pulchra Sims subsp. *pulchra* var. *maxima* Phil.
Sinónimos: *Alstroemeria magnifica* Herb. subsp. *maxima* (Phil.) Ehr. Bayer, *Alstroemeria spectabilis* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Alstroemeria pulchra Sims subsp. *pulchra* var. *pulchra*
Sinónimos: *Alstroemeria ligtu* L. var. *pulchra* (Sims) Baker, *Alstroemeria tricolor* Hook., *Alstroemeria flos-martinii* Ker Gawl., *Alstroemeria bicolor* Hook.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Flor del águila, flor del traro.

Alstroemeria revoluta Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Alstroemeria herbertiana* Roem., *Alstroemeria reflexa* Roem., *Alstroemeria inconspicua* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.

Alstroemeria schizanthoides Grau var. *alba* Muñoz-Schick
Sinónimos: *Alstroemeria modesta* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Alstroemeria schizanthoides Grau var. *schizanthoides*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 800-1900 m.

Alstroemeria spathulata C. Presl
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Alstroemeria traudliae J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 300-350 m.

Alstroemeria umbellata Meyen
Sinónimos: *Alstroemeria sericantha* Schauer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Alstroemeria versicolor Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Alstroemeria meyeniana* Schauer, *Alstroemeria tigrina* Phil., *Alstroemeria sotoana* Phil., *Alstroemeria xanthina* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-2000 m.

Alstroemeria violacea Phil.
Sinónimos: *Alstroemeria paupercula* Phil., *Alstroemeria violacea* Knight & Perry, nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Lirio del campo.

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer var. *flavicans* Muñoz-Schick
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer var. *werdermannii*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Alstroemeria zoellneri Ehr. Bayer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1100-1800 m.

Bomarea

Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd
Sinónimos: *Bomarea engleriana* auct. non Kraenzl.,
Alstroemeria dulcis Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2500-5200 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Bomarea involucrosa (Herb.) Baker
Sinónimos: *Collania involucrosa* Herb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3500-3700 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Bomarea salsilla (L.) Herb.
Sinónimos: *Alstroemeria salsilla* L., *Alstroemeria oculata*
Lodd., *Bomarea oculata* (Lodd.) M. Roem.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Salsilla, zalcilla.

Leontochir

Leontochir ovallei Phil. var. *luteus* Muñoz-Schick
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.

Leontochir ovallei Phil. var. *ovallei*
Sinónimos: *Bomarea ovallei* (Phil.) Ravenna, *Alstroemeria*
ovallei (Phil.) Hunz.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Nombre vulgar: Garra de león.

AMARYLLIDACEAE

Allium

Allium vineale L. var. *compactum* (Thuill.) Coss. & Germ.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA.

Allium vineale L. var. *vineale*
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA.

Amaryllis

Amaryllis belladona L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, JFE.

Clinanthus

Clinanthus humilis (Herb.) Meerow
Sinónimos: *Stenomesson humile* (Herb.) Baker, *Clitanthes*
humilis Herb., *Stenomesson chilense* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3000-4200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Famatina

Famatina andina (Phil.) Ravenna
Sinónimos: *Rhodophiala andina* Phil., *Hippeastrum*
andinum (Phil.) Phil., *Bathya andina* (Phil.) Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Países limítrofes: Argentina.

Famatina cisandina Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

Famatina maulensis Ravenna
Sinónimos: *Miltinea maulensis* (Ravenna) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1500 m.

Gethyum

Gethyum atropurpureum Phil.
Sinónimos: *Solaria atropurpurea* (Phil.) Ravenna, *Solaria*
major Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Gethyum cuspidatum (Harv. ex Baker) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Solaria cuspidata* (Harv. ex Baker) Ravenna,
Ancrumia cuspidata Harv. ex Baker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 100-200 m.

Gilliesia

Gilliesia dimera Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Gilliesia graminea Lindl.
Sinónimos: *Gilliesia curicana* Ravenna, *Gilliesia gaudichaudiana* Kunth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gilliesia isopetala Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 1000-1700 m.

Gilliesia montana Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Gilliesia monophylla* Reiche, *Miersia scalae* Gunckel, *Gilliesia nahuelbutae* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Ipheion

Ipheion sessile (Phil.) Traub
Sinónimos: *Brodiaea sessiliflora* (Baker) Baker, *Brodiaea sessilis* (Phil.) F. Meigen, *Milla sessiliflora* Baker, *Triteleia sessilis* Phil., *Tristagma sessile* (Phil.) Traub, *Tristagma leichtlinii* (Baker) Ravenna, *Milla leichtlinii* Baker, *Brodiaea leichtlinii* (Baker) Baker, *Tristagma leichtlinii* (Baker) Traub, *Triteleia leichtlinii* (Baker) G. Nicholson
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Latace

Latace andina (Poepp.) Sassone fma. **andina**
Sinónimos: *Zoellnerallium andinum* (Poepp.) Crosa, *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes, *Nothoscordum bivalve* auct. non (L.) Britton, *Nothoscordum brevispathum* Phil., *Nothoscordum sellowianum* Kunth var. *brevispathum* (Phil.) Fuentes, *Nothoscordum strictum* Gay, *Ornithogalum andinum* Poepp., *Nothoscordum poeppigii* Fuentes, *Latace volkmanni* Phil., *Leucocoryne volkmanni* (Phil.) Engl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, LLA.
Rango altitudinal: 1500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Latace andina (Poepp.) Sassone fma. **lutea** (Ravenna) Sassone
Sinónimos: *Nothoscordum andinum* (Poepp.) Fuentes fma. *luteum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Latace serenense (Ravenna) Sassone
Sinónimos: *Nothoscordum serenense* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-500 m.

Leucocoryne

Leucocoryne alliacea Miers ex Lindl.
Sinónimos: *Leucocoryne angustipetala* Gay, *Leucocoryne reflexa* Grau
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 900-2200 m.

Leucocoryne angosturiae Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Leucocoryne appendiculata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 400-800 m.

Leucocoryne arrayanensis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1700-2500 m.

Leucocoryne candida Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 700-800 m.

Leucocoryne codehuensis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.

Leucocoryne conconensis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Leucocoryne conferta Zoellner
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 200-1200 m.

Leucocoryne connivens Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Leucocoryne conostyla Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. var. *alba* Zoellner
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Leucocoryne coquimbensis F. Phil. var. *coquimbensis*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.

Leucocoryne coronata Ravenna
Sinónimos: *Leucocoryne narcissoides* Phil., *Pabellonia*
incrassata (Phil.) Quezada & Martic., *Stemmatium*
narcissoides Phil., *Leucocoryne incrassata* Phil.,
Chrysocoryne incrassata (Phil.) Zoellner
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.

Leucocoryne curacavina Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Leucocoryne dimorphopetala (Gay) Ravenna
Sinónimos: *Tristagma dimorphopetala* Gay, *Leucocoryne*
gayii Baker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.

Leucocoryne editiana Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2200 m.

Leucocoryne foetida Phil.
Sinónimos: *Leucocoryne odorata* Lindl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, MAU.

Leucocoryne fragrantissima Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1500 m.

Leucocoryne fuscostriata Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Leucocoryne gilliesioides (Phil.) Ravenna
Sinónimos: *Erinna gilliesioides* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1400-1600 m.

Leucocoryne inclinata Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 800-1000 m.

Leucocoryne ixiooides (Hook.) Lindl.
Sinónimos: *Leucocoryne pauciflora* Phil., *Brodiaea ixiooides*
Hook.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA.
Rango altitudinal: 800-1100 m.

Leucocoryne leucogyna Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Leucocoryne lilacea Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.

Leucocoryne lurida Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Leucocoryne macropetala Phil.
Sinónimos: *Pabellonia oxypetala* (Phil.) Quezada &
Martic., *Leucocoryne oxypetala* Phil., *Chrysocoryne*
oxypetala (Phil.) Zoellner
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 800 m.

Leucocoryne maulensis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Leucocoryne modesta Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1300 m.

Leucocoryne mollensis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Leucocoryne montana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Leucocoryne pachystyla Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Leucocoryne porphyrea Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 800-1500 m.

Leucocoryne praealta Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1000-1200 m.

Leucocoryne purpurea Gay
Sinónimos: *Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl. var.
purpurea (Gay) Baker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.

Leucocoryne quilimarina Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Leucocoryne rungensis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 900-1100 m.

Leucocoryne simulans Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1800-2000 m.

Leucocoryne subulata Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000 m.

Leucocoryne taguataguensis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.

Leucocoryne talinensis L. Mansur & M. Cisternas
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Leucocoryne tricornis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000 m.

Leucocoryne unguifera Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.

Leucocoryne valparadisea Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Leucocoryne violacescens Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.

Leucocoryne vittata Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.

Leucojum

Leucojum vernum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: JFE.

Miersia

Miersia chilensis Lindl.
Sinónimos: *Miersia major* Kunth, *Miersia rusbyi* Britton,
Miersia chilensis Lindl. var. *bicolor* Muñoz-Schick
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Miersia cornuta Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 700-900 m.

Miersia leporina Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 800 m.

Miersia minor Kunth
Sinónimos: *Miersia myodes* Bertero
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 220-600 m.

Miersia tenuiseta Ravenna

Sinónimos: *Miersia tenuiseta* Ravenna fma. *castanea* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Myostemma

Myostemma advena (Ker Gawl.) Ravenna

Sinónimos: *Amaryllis advena* Ker Gawl., *Hippeastrum hesperidius* Herb. var. *pallidum* Herb., *Hippeastrum pallidum* (Herb.) Pax, *Hippeastrum advenum* (Ker Gawl.) Herb., *Habranthus pallidus* Lodd., *Habenaria miniatus* D. Don ex Sweet, *Habranthus hesperius* Herb., *Amaryllis valparadisiaca* Steud., *Chlidanthus cumingii* C. Presl, *Rhodophiala advena* (Ker Gawl.) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.
Rango altitudinal: 1400 m.
Nombre vulgar: Añañuca.

Myostemma ananuca (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores
Sinónimos: *Hippeastrum ananuca* Phil., *Amaryllis ananuca* (Phil.) Traub & Moldenke, *Rhodophiala ananuca* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Añañuca.

Myostemma araucana (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Amaryllis araucana* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum araucanum* Phil., *Rhodophiala araucana* (Phil.) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-1500 m.
Nombre vulgar: Añañuca.

Myostemma bagnoldii (Herb.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Habranthus bagnoldii* Herb., *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker, *Hippeastrum bagnoldii* (Herb.) Baker var. *minor* Speg., *Amaryllis bagnoldii* (Herb.) D. Dietr., *Rhodophiala bagnoldii* (Herb.) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Añañuca.

Myostemma berteroaana (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Hippeastrum berteroaanum* (Phil.) Baker, *Amaryllis berteroaana* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus berteroaanus* Phil., *Rhodophiala berteroaana* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

Nombre vulgar: Añañuca.

Myostemma maculata (L'Hér.) Ravenna

Sinónimos: *Amaryllis maculata* L'Hér., *Rhodophiala maculata* (L'Hér.) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Nombre vulgar: Añañuca.

Myostemma monantha Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.

Myostemma montana (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Hippeastrum montanum* (Phil.) Baker, *Amaryllis montana* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus montanus* Phil., *Rhodophiala montana* (Phil.) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, ARA.
Nombre vulgar: Añañuca.

Myostemma phycelloides (Herb.) Ravenna

Sinónimos: *Amaryllis phycelloides* (Herb.) Steud., *Habranthus phycelloides* Herb., *Hippeastrum phycelloides* (Herb.) Baker, *Phycella phycelloides* (Herb.) Traub, *Rhodophiala phycelloides* (Herb.) Hunz.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, RME, MAU.
Rango altitudinal: 0-2200 m.
Nombre vulgar: Añañuca.

Myostemma tiltiensis (Traub & Moldenke) Ravenna

Sinónimos: *Hippeastrum laetum* Phil., *Amaryllis tiltiensis* Traub & Moldenke, *Amaryllis laeta* (Phil.) Traub & Uphof, *Rhodophiala tiltiensis* (Traub & Moldenke) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Nombre vulgar: Añañuca.

Nothoscordum

Nothoscordum flavescens Kunth

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn

Sinónimos: *Allium gracile* Aiton, *Maligia gracilis* (Aiton) Raf.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, LLA.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nothoscordum gramineum (Sims) Beauverd
Sinónimos: *Nothoscordum striatellum* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum gramineum* Sims, *Allium striatellum* Lindl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nothoscordum mahui Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 300-400 m.

Nothoscordum nidulans Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Nothoscordum nubense Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Phycella

Phycella angustifolia Phil.
Sinónimos: *Hippeastrum angustifolium* (Phil.) Phil., comb. illeg., *Amaryllis philippiana* Traub & Uphof
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.

Phycella australis Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Amancay.

Phycella cyrtanthoides (Sims) Lindl.
Sinónimos: *Hippeastrum igneum* (Lindl.) Muñoz, *Phycella magnifica* Herb., *Amaryllis ignea* Lindl., *Amaryllis cyrtanthoides* Sims, *Amaryllis demissa* Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Phycella gayana (Kuntze) Traub
Sinónimos: *Hippeastrum gayanum* Kuntze, *Amaryllis gayana* (Kuntze) Traub & Uphof
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Phycella scarlatina Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 2000 m.

Placea

Placea amoena Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 800-2000 m.

Placea arzae Phil.
Sinónimos: *Placea germainii* Phil. subsp. *arzae* (Phil.) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 300-2000 m.
Nombre vulgar: Macaya.

Placea davidii Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Placea lutea Phil.
Sinónimos: *Placea germainii* Phil. subsp. *lutea* (Phil.) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Placea ornata Miers ex Lindl.
Sinónimos: *Placea germainii* Phil., *Placea grandiflora* Lem.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 900-1700 m.
Nombre vulgar: Lagañosa.

Pyrolirion

Pyrolirion tubiflorum (L'Hér.) M. Roem.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR.

Rhodolirium

Rhodolirium andicola (Poepp.) Ravenna
Sinónimos: *Amaryllis andicola* Poepp., *Amaryllis purpurata* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus andicola* (Poepp.) Herb., *Hippeastrum andicola* (Poepp.) Baker, *Hippeastrum purpuratum* Phil., *Rhodophiala purpurata* (Phil.) Traub, *Zephyranthes andicola* (Poepp.) Baker, *Rhodophiala andicola* (Poepp.) Traub
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1200-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rhodolirium chilense (L'Hér.) Ravenna
Sinónimos: *Amaryllis chilensis* L'Hér., *Hippeastrum chilense* (L'Hér.) Baker, *Habranthus chilensis* (L'Hér.) Herb., *Rhodophiala chilensis* (L'Hér.) Traub, *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Rhodolirium fulgens (Hook. f.) Ravenna
Sinónimos: *Hippeastrum fulgens* (Hook. f.) Phil., *Amaryllis fulgens* (Hook. f.) Traub & Uphof, *Habranthus fulgens* Hook. f., *Rhodophiala fulgens* (Hook. f.) Traub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.

Rhodolirium laetum (Phil.) Ravenna
Sinónimos: *Rhodophiala laeta* Phil., *Rhodophiala uniflora* Phil., *Hippeastrum uniflorum* (Phil.) Baker, *Amaryllis uniflora* (Phil.) Traub & Uphof
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1000 m.

Rhodolirium montanum Phil.
Sinónimos: *Amaryllis rhodolirion* (Baker) Traub & Uphof, *Hippeastrum rhodolirion* (Phil.) Baker, *Rhodolirium andinum* Phil., *Rhodophiala rhodolirion* (Baker) Traub, *Amaryllis popetana* (Phil.) Traub & Uphof, *Hippeastrum popetanum* Phil., *Rhodophiala popetana* (Phil.) Traub
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rhodophiala

Rhodophiala bakeri (Phil.) Traub
Sinónimos: *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Habranthus bakeri* Phil., *Hippeastrum bakeri* (Phil.) Traub & Uphof, *Amaryllis bakeri* (Phil.) Traub & Uphof
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, ARA.

Rhodophiala flava (Phil.) Traub
Sinónimos: *Hippeastrum solisii* Phil., *Amaryllis solisii* (Phil.) Traub & Uphof, *Habranthus flavus* Phil., *Amaryllis flava* (Phil.) Traub & Uphof
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB.

Rhodophiala lineata (Phil.) Traub
Sinónimos: *Hippeastrum lineatum* (Phil.) Baker, *Amaryllis lineata* (Phil.) Traub & Uphof, hom. illeg., *Habranthus*

lineatus Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Rhodophiala moelleri (Phil.) Traub
Sinónimos: *Hippeastrum moelleri* Phil., *Amaryllis moelleri* (Phil.) Traub & Moldenke, *Myostemma cautinensis* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 900-1000 m.

Rhodophiala pratensis (Poepp.) Traub
Sinónimos: *Amaryllis pratensis* Poepp., *Hippeastrum pratense* (Poepp.) Baker, *Rhodophiala speciosa* (Herb.) Baker, *Amaryllis atacamensis* Traub & Uphof, *Habranthus speciosus* Herb., *Habranthus pratensis* (Poepp.) Herb., *Rhodophiala volckmannii* Phil., *Placea pratensis* F. Phil., nom. nud., *Rhodolirium speciosum* (Herb.) Ravenna, *Myostemma pratensis* (Poepp.) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Rhodophiala rosea (Sweet) Traub
Sinónimos: *Hippeastrum roseum* (Sweet) Baker, *Amaryllis barlowii* Traub & Moldenke, *Habranthus roseus* Sweet, *Amaryllis rosea* (Sweet) Traub & Uphof, *Zephyranthes purpurea* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rhodophiala splendens (Renjifo) Traub
Sinónimos: *Hippeastrum splendens* (Renjifo) Renjifo ex Phil., *Amaryllis splendens* (Renjifo) Traub & Moldenke, *Habranthus splendens* Renjifo
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Solaria

Solaria miersioides Phil.
Sinónimos: *Solaria brevicolita* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 900-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Speea

Speea humilis (Phil.) Loes. ex E.H.L. Krause
Sinónimos: *Speea triloba* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO.

Traubia

Traubia modesta (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Hippeastrum modestum* (Phil.) Baker, *Lapiedra chilensis* F. Phil., *Amaryllis modesta* (Phil.) Traub & Uphof, *Traubia chilensis* (F. Phil.) Moldenke, *Rhodophiala modesta* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Tristagma

Tristagma ameghinoi (Speg.) Speg.

Sinónimos: *Brodiaea ameghinoi* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tristagma berteroi (Kunth) S. Arroyo & Sassone

Sinónimos: *Brodiaea berteroi* (Kunth) Fuentes

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Tristagma bivalve (Hook. ex Lindl.) Traub

Sinónimos: *Triteleia bivalvis* Hook. ex Lindley, *Milla bivalvis* (Lindl.) Baker, *Hookera bivalvis* (Hook. ex Lindl.) Kuntze, *Brodiaea bivalvis* (Hook. ex Lindl.) Meigen, *Ipheion bivalve* (Hook. ex Lindl.) Traub, *Tristagma brevipes* (Kuntze) Traub, *Triteleia brevipes* Kuntze, *Milla brevipes* (Kuntze) Baker, *Brodiaea brevipes* (Kuntze) Baker, *Hookera brevipes* (Kuntze) Kuntze, *Ipheion brevipes* (Kuntze) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Tristagma circinatum (Sandw.) Traub

Sinónimos: *Brodiaea circinata* Sandwith

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO.

Países limítrofes: Argentina.

Tristagma gracile (Phil.) Traub

Sinónimos: *Triteleia gracilis* Phil., *Brodiaea philippiana* Baker, *Ipheion gracile* (Phil.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Tristagma graminifolium (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Garaventia graminifolia* (Phil.) Looser, *Nothoscordum graminifolium* (Phil.) Traub, *Steinmannia*

graminifolia F. Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 600-700 m.

Tristagma nivale Poepp. fma. ***australe*** (Neger ex Dusén)

Ravenna

Sinónimos: *Tristagma australe* Neger ex Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tristagma nivale Poepp. fma. ***nivale***

Sinónimos: *Milla nivalis* (Poepp.) Baker, *Tristagma philippii* Gandoger, *Tristagma fragrans* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 300-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tristagma patagonicum (Baker) Traub

Sinónimos: *Brodiaea patagonica* (Baker) Baker, *Milla patagonica* Baker

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tristagma poeppigianum (Gay) Traub

Sinónimos: *Triteleia poeppigiana* Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2400 m.

Tristagma porrifolium (Poepp.) Traub

Sinónimos: *Triteleia porrifolia* Poeppig, *Milla porrifolia* (Poepp.) Baker, *Brodiaea porrifolia* (Poepp.) Meigen, *Hookera porrifolia* (Poepp.) Kuntze, *Ipheion porrifolium* (Poepp.) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Tristagma violaceum (Kunth) Traub

Sinónimos: *Triteleia violacea* Kunth, *Brodiaea violacea* (Kunth) Baker, *Ipheion violaceum* (Kunth) Traub

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

APONOGETONACEAE

Aponogeton

Aponogeton distachyos L.f.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

ARACEAE

Colocasia

Colocasia esculenta (L.) Schott
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Taro (Rapa Nui).

Landoltia

Landoltia punctata (G. Mey.) Les & D.J. Crawford
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Lemna

Lemna gibba L.
Sinónimos: *Lemna parodiana* Giardelli
Hierba acuática. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, LLA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Lemna minuta Kunth
Sinónimos: *Lemna minima* Kunth, nom. nud., *Lemna minima* Phil. ex Hegelm., hom. illeg., *Lemna minuscula* Herter, nom. illeg., *Lemna valdiviana* Phil. var. *abbreviata* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *minima* Hegelm.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Lenteja de agua.

Lemna valdiviana Phil.
Sinónimos: *Lemna valdiviana* Phil. var. *platyclados* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *pellucida* Hegelm., *Lemna valdiviana* Phil. var. *robusta* Hegelm.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, VAL, RME, MAU, ARA, LLA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Lenteja de agua.

Pistia

Pistia stratiotes L.
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

Spirodela

Spirodela intermedia W. Koch
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Wolffia

Wolffia brasiliensis Wedd.
Sinónimos: *Wolffia papulifera* C.H. Thomps., *Wolffia punctata* Griseb.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Lenteja de agua.

Wolffiella

Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm.
Sinónimos: *Lemna oblonga* Phil., *Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm., *Wolffiella lingulata* Hegelm. var. *minor* Hegelm.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Lenteja de agua.

Zantedeschia

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LLA, JFE.

ARECACEAE

Juania

Juania australis (Mart.) Drude ex Hook. f.
Sinónimos: *Ceroxylon australe* Mart., *Nunnezharia chonta* (Phil.) Kuntze, *Morenia chonta* Phil.
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-800 m.
Nombre vulgar: Chonta, palma chonta.

Jubaea

Jubaea chilensis (Molina) Baill.

Sinónimos: *Palma chilensis* Molina, *Cocos chilensis* (Molina) Kunth, *Micrococos chilensis* (Molina) Phil., *Jubaea spectabilis* Kunth, *Molinaea micrococos* Bertero
Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300 m.

Nombre vulgar: Palma Chilena.

ASPARAGACEAE

Cordyline

Cordyline terminalis (L.) Kunth

Arbusto. Introducido.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Ti (Rapa Nui).

Herreria

Herreria stellata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Herreria verticillata* Molina

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Zarza.

Oziroë

Oziroë acaulis (Baker) Speta

Sinónimos: *Scilla acaulis* Baker

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Oziroë arida (Poepp.) Speta

Sinónimos: *Fortunatia arida* (Poepp.) Ravenna, *Oziroë arida* (Poepp.) Ravenna, *Ornithogalum aridum* Poepp., *Ornithogalum chloroleucum* Lindl., *Scilla chloroleuca* (Lindl.) Kunth, *Ornithogalum chilense* Phil., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *chloroleucum* (Lindl.) Baker, *Oziroë chloroleuca* (Poepp.) Speta

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Oziroë biflora (Ruiz & Pav.) Speta

Sinónimos: *Fortunatia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Camassia biflora* (Ruiz & Pav.) Cocucci, *Scilla biflora* Ruiz

& Pav., *Scilla triflora* Phil., *Ornithogalum biflorum* (Ruiz & Pav.) D. Don

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Lágrima de la virgen.

Oziroë pomensis Ravenna

Sinónimos: *Oziroë totorensis* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 1800-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Trichopetalum

Trichopetalum plumosum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.

Sinónimos: *Trichopetalum stellatum* Lindl., *Trichopetalum gracile* Lindl., *Anthericum plumosum* Ruiz & Pav., *Bottionea thysanotoides* Colla, *Endocoma peruviana* Raf., *Endocoma parviflora* Raf.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Flor de la plumilla.

ASPHODELACEAE

Asphodelus

Asphodelus fistulosus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, ATA.

Pasithea

Pasithea caerulea (Ruiz & Pav.) D. Don

Sinónimos: *Pasithea caerulea* (Ruiz & Pav.) D. Don var. *grandiflora* I.M. Johnst., *Anthericum caeruleum* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Flor del queltehue, azulillo.

ASTELIACEAE

Astelia

Astelia pumila (G. Forst.) Gaudich.
Sinónimos: *Astelia pumila* (G. Forst.) R. Br., comb. illeg.,
Melanthium pumilum G. Forst.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Argentina.

BROMELIACEAE

Deuterocohnia

Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez
Sinónimos: *Pitcairnia chrysantha* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Chagual del jote.

Fascicularia

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. *bicolor*
Sinónimos: *Fascicularia micrantha* (Phil.) Mez,
Fascicularia parviflora Mez, *Bromelia bicolor* Ruiz
& Pav., *Billbergia bicolor* (Ruiz & Pav.) Schult. f.,
Rhodostachys bicolor (Ruiz & Pav.) Benth. ex Hook. f. ex
Baker, *Rhodostachys micrantha* Phil., *Bromelia joinvillei* E.
Morren
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS.
Rango altitudinal: 600 m.
Nombre vulgar: Chupalla.

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pav.) Mez subsp. *canaliculata*
E.C. Nelson & Zizka
Sinónimos: *Fascicularia kirchhoffiana* (Wittm.) Mez,
Bromelia albobracteata Steud. ex Lechl., nom. nud.,
Rhodostachys albo-bracteata (Steud. ex Baker) Baker,
Rhodostachys pitcairniifolia (B. Verl.) Benth. var.
kirchhoffiana Wittm.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Nombre vulgar: Puñeño.

Greigia

Greigia berteroi Skottsbo.

Sinónimos: *Hesperogreigia berteroi* (Skottsbo.) Skottsbo.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 600-700 m.

Greigia landbeckii (Lechl. ex Phil.) Phil. ex F. Phil.
Sinónimos: *Bromelia landbeckii* Lechl. ex Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Ñocha.

Greigia pearcei Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 100-400 m.

Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel
Sinónimos: *Billbergia sphacelata* (Ruiz & Pav.) Schult. f.,
Bromelia discolor Lindl., *Bromelia crassa* Steud., nom.
nud., *Bromelia clandestina* Carrière, nom. nud., *Bromelia*
sphacelata Ruiz & Pav.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Chupón.

Ochagavia

Ochagavia andina (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Sinónimos: *Rhodostachys andina* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 700-2500 m.

Ochagavia carnea (Beer) L.B. Sm. & Looser
Sinónimos: *Ochagavia chamissonis* (Mez) L.B. Sm.
& Looser, *Rhodostachys chamissonis* Mez, *Bromelia*
longifolia auct. non Rudge, *Bromelia lindleyana* Lem., nom.
illeg., *Bromelia carnea* Beer, *Rhodostachys grandiflora*
Phil., *Ruckia ellemeti* Regel, *Pourretia argentea* Wittm.,
nom. nud., *Rhodostachys carnea* (Beer) Mez, *Ochagavia*
grandiflora (Phil.) Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Nombre vulgar: Cardoncillo.

Ochagavia elegans Phil.
Sinónimos: *Rhodostachys elegans* (Phil.) Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Chupón.

Ochagavia litoralis (Phil.) Zizka, Trumpler & Zoellner
Sinónimos: *Fascicularia litoralis* (Phil.) Mez, *Ochagavia lindleyana* Mez, *Placseptalia rebecae* Espinosa, *Fascicularia pitcairniifolia* (B. Verl.) Mez, *Hechtia pitcairniifolia* B. Verl., *Bromelia pitcairniifolia* (B. Verl.) K. Koch, *Rhodostachys pitcairniifolia* (B. Verl.) Benth., *Hechtia carnea* Wittm., nom. nud., *Rhodostachys litoralis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Puya

Puya alpestris (Poepp.) Gay subsp. ***alpestris***
Sinónimos: *Pourretia alpestris* Poepp., *Puya whytei* Hook. f., *Puya pumila* Ravenna, *Pitcairnia coerulea* auct. non Benth.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Puya alpestris (Poepp.) Gay subsp. ***zoellneri*** Zizka
Sinónimos: *Puya coerulea* auct. non Lindl., *Puya whytei* auct. non Hook.f., *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, *Puya berteroniana* auct. non Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Puya berteroniana Mez
Sinónimos: *Pitcairnia alpestris* L.H. Bailey, nom. nud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Chagual.
Nota: Según Zizka et al. (2013) esta especie sería un híbrido (*Puya x berteroniana* Mez).

Puya boliviensis Baker
Sinónimos: *Puya copiapina* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Puya chilensis Molina
Sinónimos: *Puya quillotana* W. Weber, *Pourretia coarctata* Ruiz & Pav., *Pitcairnia chilensis* Lodd., *Puya suberosa* Molina, *Puya gigantea* Phil., *Puya chilensis* Molina var. *gigantea* Baker ex Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Nombre vulgar: Puya.

Puya coerulea Lindl. var. ***coerulea***
Sinónimos: *Pourretia caerulea* Miers, nom. nud., *Pitcairnia coerulea* (Lindl) Benth., *Pitcairnia coerulea* auct. non Benth., *Puya violacea* auct. non Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Nombre vulgar: Chagualillo.

Puya coerulea Lindl. var. ***intermedia*** (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
Sinónimos: *Puya paniculata* Phil., *Puya glabrata* Phil. ex Baker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 400-700 m.

Puya coerulea Lindl. var. ***monteroana*** (L.B. Sm. & Looser) L.B. Sm. & Looser
Sinónimos: *Puya violacea* (Brongn.) Mez var. *monteroana* L.B. Sm. & Looser
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Puya coerulea Lindl. var. ***violacea*** (Brongn.) L.B. Sm. & Looser
Sinónimos: *Puya rubricaulis* Steud., *Pourretia rubricaulis* Miers, *Pitcairnia violacea* Brongn., *Pourretia violacea* Linden, *Puya violacea* (Brongn.) Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 400-1200 m.
Nombre vulgar: Chagual chico.

Puya gilmartiniae G.S. Varad. & A.R. Flores
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Puya pumila Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.

Puya venusta Phil.
Sinónimos: *Pitcairnia venusta* (Phil.) Baker, *Pitcairnia sphaerocephala* Baker, *Puya coquimbensis* Mez, *Puya gaudichaudii* Mez
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Nombre vulgar: Chagual.

Tillandsia

Tillandsia geissei Phil.

Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 200-600 m.

Tillandsia landbeckii Phil.

Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-1500 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Calachunca.

Tillandsia marconae W. Till & Vitek

Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 600-800 m.
Países limítrofes: Perú.

Tillandsia tragophoba M.O. Dillon

Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-500 m.

Tillandsia usneoides (L.) L.

Sinónimos: *Renealmia usneoides* L., *Tillandsia usneoides* (L.) L. var. *ferruginea* (André) Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. fma. *cretacea* Mez, *Tillandsia usneoides* (L.) L. fma. *ferruginea* André
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-3300 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Barbón, barbas de viejo.

Tillandsia virescens Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Tillandsia capillaris* Ruiz & Pav. fma. *virescens* (Ruiz & Pav.) L.B. Sm., *Tillandsia propinqua* Gay, *Diaphoranthema virescens* (Ruiz & Pav.) Beer, *Tillandsia stolpi* Phil.
Hierba epífita. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 450-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Calachunca.

BUTOMACEAE

Hydrocleys

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau

Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

COMMELINACEAE

Commelina

Commelina diffusa Burm. f.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Commelina erecta L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, RME.

Tradescantia

Tradescantia fluminensis Vell.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LRI, JFE.

CORSIACEAE

Arachnitis

Arachnitis uniflora Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Flor de la araña.

CYPERACEAE

Amphiscirpus

Amphiscirpus nevadensis (S. Watson) Oteng-Yeb.

Sinónimos: *Schoenoplectus nevadensis* (S. Watson) Soják, *Scirpus nevadensis* S. Watson, *Scirpus nevadensis* S. Watson var. *remireoides* (Griseb.) Beetle, *Scirpus remireoides* Griseb., *Isolepis oreophila* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bolboschoenus

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

Carex

Carex acaulis d'Urv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex acutata Boott

Sinónimos: *Carex anwandteri* Phil., *Carex foeminea* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Carex aematorhyncha E. Desv. var. ***aematorhyncha***

Sinónimos: *Carex filiformis* L. subsp. *aematorhyncha* (E. Desv.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex aematorhyncha E. Desv. var. ***corralensis*** (Phil.)

Kük.

Sinónimos: *Carex corralensis* Phil., *Carex filiforme* auct. non Gooden.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex andersonii Boott

Sinónimos: *Carex eleopsammodes* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex andina Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1200-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex aphylla Kunth

Sinónimos: *Carex ebracteata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 700-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex araucana Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Carex argentina Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex atropicta Steud.

Sinónimos: *Carex lechleri* Phil., hom. illeg., *Carex leporina* auct. non L., p.p., *Carex pampae* Kalela, p.p., *Carex peraltae* Phil., *Carex fuegina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex austroamericana G.A. Wheeler

Sinónimos: *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* Kük., p.p., *Carex andina* Phil. var. *subabscondita* auct. non Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex banksii Boott var. ***banksii***

Sinónimos: *Carex germana* Boott, *Carex trifida* Franch., hom. illeg., *Carex trifida* Cav. var. *franchetii* Kurtz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex banksii Boott var. ***fonskii*** (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex fonskii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex banksii Boott var. ***gilliesii*** (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex dessaueri* Phil., *Carex gilliesii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Carex berteroa E. Desv.

Sinónimos: *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *pungens* (Boeck.) Kük., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *berteroana* (E. Desv.) Gunkel, *Carex pungens* Boeck., *Carex setifolia* Kunze ex Kunth var. *colchaguensis* (Phil.) Kük., *Carex colchaguensis* Phil., *Carex moelleri* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Carex berteroniana Steud.

Sinónimos: *Carex paleata* Boott

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Carex bonariensis Desf. ex Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Carex bracteosa Kunze ex Kunth

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Carex brongniartii Kunth

Sinónimos: *Carex hypoxanthus* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex caduca Boott

Sinónimos: *Carex ortegae* Phil., *Carex caduca* Boott var. *ortegae* (Phil.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex camptoglochin V.I. Krecz.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex canescens L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Carex capitata L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex catamarcensis C.B. Clarke ex Kük.

Sinónimos: *Carex latibracteolata* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex chilensis Brongn. ex Duperrey

Sinónimos: *Carex riparia* Curtis var. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex riparia* Curtis subsp. *chilensis* (Brongn. ex Duperrey) Kük., *Carex vacillans* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex chillanensis Phil.

Sinónimos: *Carex melanolepis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex darwinii Boott var. *darwinii*

Sinónimos: *Carex incompta* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex darwinii Boott var. *serranoi* (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex darwinii* Boott var. *robustior* Kük., *Carex serranoi* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Carex darwinii Boott var. *urolepis* (Franch.) Kük.

Sinónimos: *Carex darwinii* Boott var. *aristata* C.B. Clarke ex Kük., *Carex urolepis* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex decidua Boott

Sinónimos: *Carex decidua* Boott var. *minor* Kük., *Carex pedicellata* Phil., *Carex rahmeri* Phil., *Carex vulgaris* R.E. Fr. var. *antucensis* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA,

AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex distenta Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Carex fuscula* d'Urv. var. *distenta* (Kuntze ex Kunth) Kük., *Carex huitensis* Steud., *Carex indecora* auct. non Kunth, *Carex pseudopunctata* Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex excelsa Poepp. ex Kunth

Sinónimos: *Carex lechleri* Steud., *Carex pseudocyperus* L. subsp. *haenkeana* auct. non (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *haenkeana* (J. Presl & C. Presl) Kük., *Carex pseudocyperus* L. var. *lechleri* Boott, *Carex psilostachys* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cortadera.

Carex fernandezensis Mack. ex G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-600 m.

Carex firmicaulis Kalela

Sinónimos: *Carex andicola* G.A. Wheeler, *Carex nebularum* Phil. fma. *major* (Kük.) Kük., *Carex pycnostachya* Kar. & Kir. var. *major* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, LBO.

Rango altitudinal: 100-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex fuscula d'Urv. var. *fuscula* fma. *fuscula*

Sinónimos: *Carex hieronymi* Boeck., *Carex calbucana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. var. *hieronymi* (Boeck.) Kük., *Carex inconspicua* Steud. var. *fuscula* (d'Urv.) Kük., *Carex indecora* Kunth var. *humilis* Kunth, *Carex riparia* auct. non Curtis, *Carex valdiviana* Phil., *Carex fuscula* d'Urv. f. *elatio* Kurtz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex fuscula d'Urv. var. *fuscula* fma. *indecora* (Kunth) Kük.

Sinónimos: *Carex indecora* Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Carex fuscula d'Urv. var. *pseudextensa* Kük.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Carex gayana E. Desv. var. *densa* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, LBO, MAU, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Carex gayana E. Desv. var. *gayana*

Sinónimos: *Carex nitens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex gayana E. Desv. var. *rufa* Kük.

Sinónimos: *Carex gayana* E. Desv. var. *taurina* (Phil.) Kük., *Carex taurina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex gayana E. Desv. var. *shedonautos* (Steud.) Kük.

Sinónimos: *Carex shedonautos* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Carex hookeri Kunth

Sinónimos: *Carex beecheyana* Boott ex E. Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, LLA.

Carex hypoleucos E. Desv.

Sinónimos: *Carex nebularum* Phil. var. *kurtziana* (Kük.) Kük., *Carex kurtziana* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex inconspicua Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex kingii (Boott) Reznicek

Sinónimos: *Uncinia kingii* Boott
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 700-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex lamprocarpa Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.

Carex lateriflora Phil.

Sinónimos: *Carex involucrata* Steud. ex Lechl., nom. nud.,
Carex trichodes Steud. ex Boott var. *lateriflora* (Phil.)
Kük., *Carex trichodes* Steud. ex Boott var. *major* Kük.,
Carex reicheana Boeck.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex macloviana d'Urv. var. ***macloviana***

Sinónimos: *Carex festiva* Dewey, *Carex inciso-dentata*
Steud., *Carex ovalis* auct. non Gooden., *Carex propinqua*
Nees & Meyen, *Carex allomacros* Steud., *Carex macloviana*
d'Urv. fma. *bracteata* Kük., *Carex pratensis* Phil., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex macloviana d'Urv. var. ***pseudoleporina*** Kük.

Sinónimos: *Carex leporina* auct. non L., p.p., *Carex*
leporina L. var. *elatior* Boeck., *Carex leucocarpa* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex macloviana d'Urv. var. ***thermarum*** (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Carex macloviana* d'Urv. var. *incrassata* Kük.,
Carex thermarum Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex macrorrhiza Boeck.

Sinónimos: *Carex macrorrhiza* Boeck. var. *simplex* Kük.,
Carex bonplandii auct. non Kunth, *Carex curvifolia* Boeck.,
Carex hypoleucos auct. non E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, RME.
Rango altitudinal: 2000-4200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Carex macrosolen Steud.

Sinónimos: *Carex macrocarpa* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex magellanica Lam.

Sinónimos: *Carex atrata* L. var. *magellanica* (Lam.)
Wahlenb., *Carex cernua* Phil., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex malmei Kalela

Sinónimos: *Carex atropicta* Steud. var. *platycarpa* Phil. ex
Kük.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 2600-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex maritima Gunnerus

Sinónimos: *Carex incurva* Lightf. var. *misera* (Phil.) Kük.,
Carex melanocystis E. Desv., *Carex melanocystis* E. Desv.
var. *misera* (Phil.) Kük., *Carex misera* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, MAG.
Rango altitudinal: 200-4200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Carex microglochin Wahlenb.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-4100 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Carex minutissima Barros

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex molinae Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2200-2400 m.

Carex moorei G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 600-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex multispicata Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Carex acutata* Boott var. *multispicata* (Kunze ex Kunth) Kük.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.

Carex nebularum Phil.

Sinónimos: *Carex propinqua* auct. non Nees & Meyen, *Carex pycnostachya* auct. non Kar. & Kir.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, AIS.
Rango altitudinal: 1000-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex ochrostachya Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Carex odontolepis Phil.

Sinónimos: *Carex banksii* Boott var. *odontolepis* (Phil.) Kük., *Carex promaucana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, ARA.
Rango altitudinal: 100-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex phalaroides Kunth

Sinónimos: *Carex chlorolepis* Steud., *Carex schenkiana* Boeck., *Uncinia phalaroides* (Kunth) Nees
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Carex pisanoi G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Carex pleioneura G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, COQ, RME.
Rango altitudinal: 1900-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex poeppigii C.B. Clarke ex G.A. Wheeler

Sinónimos: *Carex lamprocarpa* Phil. var. *rotundata* Kük.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.

Carex pumila Thunb.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, BIO, LLA, AIS, MAG.

Carex reichei Kük.

Sinónimos: *Carex aueri* Kalela
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex sagei Phil.

Sinónimos: *Carex barrosii* Nelmes, *Carex flava* L. subsp. *brevirostrata* Kük.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex setifolia Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Carex pissisii* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Países limítrofes: Perú.

Carex sorianoi Barros

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 100-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex stuessyi G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 900-1400 m.

Carex subantarctica Speg.

Sinónimos: *Carex chubutensis* C.B. Clarke
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Carex toroensis G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Carex trachycystis Griseb.

Sinónimos: *Carex sororia* auct. non Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex transandina G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 300-600 m.

Carex trichodes Steud. ex Boott

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Carex trifida Cav.

Sinónimos: *Carex aristata* auct. non R. Br.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex vallis-pulchrae Phil. var. *barrosiana* G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex vallis-pulchrae Phil. var. *vallis-pulchrae*

Sinónimos: *Carex castellanosii* Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Carex werdermannii Gross

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 1000 m.

Carpha

Carpha schoenoides Banks & Sol. ex Hook. f.

Sinónimos: *Carpha alpina* R. Br. var. *schoenoides* (Banks & Sol. ex Hook. f.) Kük., *Carpha viridis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cyperus

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.

Sinónimos: *Cyperus flavomarisicus* Griseb., *Didymia cyperomorpha* Phil., *Mariscus aggregatus* Willd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk.

Sinónimos: *Kyllinga brevifolia* Rottb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

Cyperus cyperoides (L.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

Cyperus difformis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Cyperus eragrostis Lam. var. *compactus* (E. Desv.) Kük.

Sinónimos: *Cyperus lutescens* Phil., hom. illeg., *Cyperus vegetus* Willd. var. *compactus* E. Desv., *Cyperus vegetus* Willd. var. *trigonus* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

Cyperus eragrostis Lam. var. *eragrostis*

Sinónimos: *Cyperus declinatus* Moench, *Cyperus vegetus* Willd., *Cyperus eragrostis* Lam. fma. *latifrons* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cyperus fraternus Kunth

Sinónimos: *Cyperus reflexus* Vahl var. *fraternus* (Kunth) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Cyperus grammicus Kunze ex Kunth

Sinónimos: *Pycreus grammicus* (Kunze ex Kunth) C.B. Clarke, *Cyperus parvulus* Steud.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Cyperus involucratus Rott.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, RME, MAU, LLA.

Cyperus laevigatus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Cyperus lanceolatus Poir.

Sinónimos: *Cyperus lepidus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Cyperus megapotamicus Kunth var. ***jaeggii*** (Boeck.) Kük.

ex Barros

Sinónimos: *Pycneis megapotamicus* (Kunth) Nees var. *jaeggii* (Boeck.) Guagl., *Cyperus jaeggii* Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Cyperus odoratus L.

Sinónimos: *Cyperus flexuosus* Vahl, *Torulinium odoratum* (L.) Hooper

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Cyperus poeppigii Kunth

Sinónimos: *Torulinium poeppigii* (Kunth) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Cyperus polystachyos Rottb.

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Hikukio'e (Rapa Nui).

Cyperus reflexus Vahl

Sinónimos: *Cyperus haematostachys* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Morcacho, ñocha.

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl

Sinónimos: *Cyperus chilensis* Boeck., *Cyperus conceptionis* Steud., *Cyperus lacustris* Phil., *Cyperus laetus* auct. non J. Presl & C. Presl, *Cyperus laetus* J. Presl & C. Presl var. *conceptionis* (Steud.) Kük., *Mariscus conceptionis* (Steud.) C.B. Clarke, *Cyperus paposanus* Phil., *Cyperus nocha* Phil., *Cyperus rancoanus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Ñocha, lleivún.

Cyperus rotundus L.

Sinónimos: *Chlorocyperus rotundus* (L.) Palla

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Coquillo.

Cyperus squarrosus L.

Sinónimos: *Cyperus aristatus* Rottb., nom. illeg.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, BIO, LRI.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Cyperus tweediei C.B. Clarke

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 200-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cyperus virens Michx. var. ***montanus*** (Boeck.) Denton

Sinónimos: *Cyperus montanus* Boeck., *Cyperus uleanus* Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cyperus virens Michx. var. ***virens***

Sinónimos: *Cyperus acutangulus* Boeck., *Cyperus vegetus* Willd. var. *acutangulus* (Boeck.) Kuntze, *Cyperus virens* Michx. var. *acutangulus* (Boeck.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Cortadera, lleivún.

Cyperus volckmannii Phil.

Sinónimos: *Cyperus araeus* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, MAU.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Cyperus xanthostachyus Steud.
Sinónimos: *Cyperus lechlerii* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Cortadera, ñocha.

Eleocharis

Eleocharis atacamensis Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, NUB, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eleocharis bonariensis Nees
Sinónimos: *Eleocharis striatula* E. Desv., *Scirpus striatulus* (E. Desv.) Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Eleocharis cordillerana S. González, Guagl. & Ruthsatz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 500-900 m.

Eleocharis dombeyana Kunth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, RME.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.
Sinónimos: *Scirpus flavescens* Poir.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eleocharis fuscopurpurea (Steud.) H. Pfeiff.
Sinónimos: *Eleocharis melanocarpa* Phil., *Eleocharis vincentina* Phil., *Eleocharis vincentina* Phil. var. *arcuata* (Kuntze) C.B. Clarke, *Isolepis fuscopurpurea* Steud., *Scirpus desvauxii* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, BIO, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Eleocharis lechleri Boeck.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 400-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Eleocharis macrostachya Britton
Sinónimos: *Eleocharis palustris* auct. non (L.) R. Br., *Scirpus palustris* auct. non L.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult.
Sinónimos: *Scirpus maculosus* Vahl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eleocharis melanocephala E. Desv.
Sinónimos: *Scirpus melanocephalus* (E. Desv.) Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eleocharis melanomphala C.B. Clarke
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eleocharis melanostachys (d'Urv.) C.B. Clarke
Sinónimos: *Eleocharis litoralis* Phil., *Eleocharis valdiviana* Phil., *Scirpus melanostachys* d'Urv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2200 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.
Sinónimos: *Scirpus montanus* Kunth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 100-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eleocharis pachycarpa E. Desv.

Sinónimos: *Eleocharis dubia* Phil., *Eleocharis fuscanguinea* Boeck., *Eleocharis lepida* Phil., *Eleocharis leptocaulis* Steud., *Eleocharis liocarpa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Eleocharis pseudoalbibracteata S. González & Guagl.

Sinónimos: *Eleocharis albibracteata* auct. non Nees & Meyen ex Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, IPA.

Rango altitudinal: 400-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz

Sinónimos: *Scirpus quinqueflorus* Hartmann, *Isolepis andina* Phil., *Scirpus andinus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Eleocharis radicans (Poir.) Kunth

Sinónimos: *Eleocharis costulata* Nees & Meyen ex Kunth, *Eleocharis rivularis* Phil., *Scirpus radicans* Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eleocharis tucumanensis Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, RME.

Rango altitudinal: 3900-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eleocharis uniflora Seberg

Sinónimos: *Chillania pusilla* Roiv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB.

Ficinia

Ficinia nodosa (Rottb.) Goetgh., Muasya & D.A. Simpson

Sinónimos: *Scirpus molinianus* Beetle, *Isolepis nodosa* (Rottb.) R. Br., *Scirpus nodosus* Rottb., *Isolepis monocephala* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

Isolepis

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.

Sinónimos: *Cyperus pumilio* Steud., *Isolepis erubescens* Steud., *Isolepis heterophylla* Steud., *Isolepis modesta* Phil., *Isolepis monostachya* Phil., *Isolepis purpurascens* Steud., *Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hayek, *Scirpus cernuus* Vahl, *Scirpus chloroticus* Phil., *Scirpus modestus* (Phil.) F. Phil., *Scirpus terminalis* Phil., *Scirpus aegialitis* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Isolepis nigricans Kunth

Sinónimos: *Cyperus urvilleanus* Steud., *Isolepis albescens* E. Desv., *Isolepis angachillensis* Steud., *Isolepis phaecocarpa* Phil., hom. illeg., *Isolepis ramulosa* Steud., *Isolepis vivipara* Schrad. ex E. Desv., *Scirpus angachillensis* (Steud.) Boeck., *Scirpus bridgesii* Boeck., *Scirpus constitutionis* Phil., *Scirpus didymostachyus* Phil., *Scirpus phaecarpus* Phil., *Scirpus albescens* (E. Desv.) Phil., *Isolepis nana* Phil., *Isolepis tristachya* Phil., *Scirpus trichocaulos* Phil., *Scirpus philippii* C.B. Clarke

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Isolepis ranko (Steud.) Vegetti

Sinónimos: *Cyperus ranko* Steud., *Isolepis perpusilla* Phil., hom. illeg., *Scirpus philippii* auct. non C.B. Clarke, *Scirpus ranko* (Steud.) Gunckel, *Scirpus ranko* (Steud.) Beetle, comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Isolepis varians Steud.

Sinónimos: *Isolepis valdiviae* Steud., *Scirpus varians* (Steud.) Boeck., *Isolepis valdiviae* F. Phil. ex Boeck., nom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 700-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Machaerina

Machaerina scirpoidea (Steud.) T. Koyama
Sinónimos: *Terobera scirpoidea* Steud., *Vincentia scirpoidea* (Steud.) Boeck., *Cladium scirpoideum* (Steud.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl., *Mariscus scirpoideus* (Steud.) Kuntze, *Agylla ensifolia* Phil., *Cladium ensifolium* (F. Phil.) H. Pfeiff.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-700 m.

Oreobolus

Oreobolus obtusangulus Gaudich.
Sinónimos: *Gaimardia australis* auct. non Gaudich., *Oreobolus clandestinus* Phil., *Oreobolus obtusangulus* Gaudich. fma. *borealis* Skottsbo.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Phylloscirpus

Phylloscirpus acaulis (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson
Sinónimos: *Scirpus macrolepis* Phil., *Scirpus acaulis* Phil., *Scirpus atacamensis* auct. non Phil., *Scirpus nubigenus* Phil., *Scirpus sessiliflorus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Phylloscirpus boliviensis (Barros) Dhooge & Goetgh.
Sinónimos: *Scirpus boliviensis* Barros
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 4100-4800 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Phylloscirpus deserticola (Phil.) Dhooge & Goetgh.
Sinónimos: *Scirpus deserticola* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 2000-4800 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Rhodoscirpus

Rhodoscirpus asper (J. Presl & C. Presl) Léveillé-Bourret, Donadio & J.R. Starr
Sinónimos: *Scirpus asper* J. Presl & C. Presl, *Scirpus*

brachycaulos Phil., *Scirpus trachycaulos* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 700-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rhynchospora

Rhynchospora brownii Roem. & Schult. subsp. *americana* Guagl.
Sinónimos: *Rhynchospora rugosa* auct. non (Vahl) Gale
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Schoenoplectus

Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller
Sinónimos: *Scirpus chilensis* auct. non Nees & Meyen, *Scirpus americanus* Pers.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL, LBO, MAU, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják var. *californicus*
Sinónimos: *Elytrospermum californicus* C.A. Mey., *Malacochaete chilense* Nees & Meyen ex Boeck., *Malacochaete oligostachya* Phil. ex Boeck., *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, IPA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Totora, ngaatu (Rapa Nui).

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják var. *spoliatus* (Barros) Vegetti
Sinónimos: *Dichromena atosanguinea* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Totora.

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják var. *tereticulmis* (Steud.) Vegetti
Sinónimos: *Scirpus californicus* (C.A. Mey.) Steud. var.

tereticulmis (Steud.) Beetle, *Scirpus pseudotriqueteter* Steud.,
Scirpus riparius J. Presl & C. Presl var. *tereticulmis* (Steud.)
C.B. Clarke, *Scirpus tereticulmis* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Totora.

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO.

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. *badius* (J. Presl
& C. Presl) S.G. Sm.

Sinónimos: *Scirpus badius* J. Presl & C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, MAU, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. *longispicatus*
(Britton) S.G. Sm.

Sinónimos: *Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart ex
Schinz & R. Keller subsp. *longispicatus* (Britton) Soják

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. *pungens*

Sinónimos: *Scirpus americanus* Pers. var. *pungens* (Vahl)

Barros & Osten, *Scirpus pungens* Vahl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,
MAU, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Schoenus

Schoenus andinus (Phil.) H. Pfeiff.

Sinónimos: *Carpha andina* Phil., *Schoenus sodalium*
(Franch.) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Schoenus antarcticus (Hook. f.) Dusén

Sinónimos: *Carpha antarctica* (Hook. f.) C.B. Clarke,
Chaetospora antarctica Hook. f., *Elynanthus antarcticus*
(Hook. f.) Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Schoenus nitens (R. Br.) Poir. subsp. *krausei* (Phil.) Kük.

Sinónimos: *Schoenus krausei* (Phil.) Gunckel, *Isolepis*
krausei Phil., *Scirpus spadiceus* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Schoenus rhynchosporoides (Steud.) Kük.

Sinónimos: *Carpha laxa* (Hook. f.) Macloskie, *Carpha*
paniculata Phil., *Chaetospora laxa* Hook.f., *Elynanthus*
laxus (Hook.f.) Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Scirpus

Scirpus angustisquamis Beetle

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Scirpus melanocaulos Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Scirpus spegazzianus Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Uncinia

Uncinia andina G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Uncinia araucana G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1400-1700 m.

Uncinia aspericaulis G.A. Wheeler

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 900 m.

Uncinia austroamericana G.A. Wheeler
Sinónimos: *Uncinia lechleriana* auct. non Steud., *Uncinia macrolepis* auct. non Decne.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Uncinia chilensis G.A. Wheeler
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Uncinia costata Kük.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Uncinia douglasii Boott
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-600 m.

Uncinia erinacea (Cav.) Pers.
Sinónimos: *Carex erinacea* Cav., *Uncinia longearistata* Steud., *Uncinia macrotricha* Franch., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *angustata* Kük., *Uncinia erinacea* (Cav.) Pers. var. *longifolia* (Kük.) C.B. Clarke, *Uncinia longifolia* Kunth, *Uncinia philippii* Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Uncinia lechleriana Steud.
Sinónimos: *Uncinia brevicaulis* auct. non (Thouars) Kunth, *Uncinia macloviana* auct. non Gaudich.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Uncinia macloviana Gaudich.
Sinónimos: *Carex delacosta* Kuntze, *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *macloviana* (Gaudich.) C.B. Clarke, *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth fma. *montana* (Phil.) Kük., *Uncinia montana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Uncinia macloviformis G.A. Wheeler
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 1100-1400 m.

Uncinia macrolepis Decne.
Sinónimos: *Uncinia sinclairii* auct. non Boott
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Uncinia macrophylla Steud.
Sinónimos: *Uncinia bella* Phil., *Uncinia bracteosa* Phil., *Uncinia phalaroides* auct. non (Kunth) Nees
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, LRI.
Rango altitudinal: 100-1100 m.

Uncinia multifaria Nees ex Boott
Sinónimos: *Uncinia multifaria* Nees ex Boott var. *macrostachya* (E. Desv.) C.B. Clarke
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Quinquina.

Uncinia negerii Kük.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Uncinia phleoides (Cav.) Pers.
Sinónimos: *Carex phleoides* Cav., *Uncinia lasiocarpa* Steud. ex Boeck., *Uncinia longifolia* E. Desv., hom. illeg., *Uncinia montteana* Phil., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *krausei* Kük.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Quinquín.

Uncinia scabriuscula G.A. Wheeler
Sinónimos: *Uncinia brevicaulis* (Thouars) Kunth var. *laticarpa* Kük.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 200-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Uncinia setifolia Kunze

Sinónimos: *Carex pissisii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Uncinia tenuis Poepp. ex Kunth

Sinónimos: *Uncinia gracillis* d'Urv., hom. illeg., *Uncinia tenuis* Poepp. ex Kunth fna. *firmula* Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Uncinia trichocarpa C.A. Mey.

Sinónimos: *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *trichocarpa* (C.A. Mey.) C.B. Clarke, *Uncinia longispica* Boeck., *Uncinia urvillei* Steud., *Uncinia phleoides* (Cav.) Pers. var. *longispica* (Boeck.) C.B. Clarke, *Uncinia chlorostachya* Phil., *Uncinia loliacea* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Uncinia triquetra Kük.

Sinónimos: *Uncinia lechleriana* Steud. var. *triquetra* (Kük.) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Zameioscirpus

Zameioscirpus atacamensis (Phil.) Dhooge & Goetgh.

Sinónimos: *Scirpus atacamensis* (Phil.) Boeck., *Isolepis atacamensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3200-4800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Zameioscirpus gaimardioides (E. Desv.) Dhooge & Goetgh.

Sinónimos: *Carex gaimardioides* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, LBO.

Rango altitudinal: 3100-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Zameioscirpus muticus Dhooge & Goetgh.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4100-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea

Dioscorea acerifolia Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Dioscorea andina Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

Dioscorea antucoana Uline ex R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Dioscorea araucana Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1500 m.

Dioscorea aristolochiifolia Poepp.

Sinónimos: *Dioscorea trichoneura* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Dioscorea auriculata Poepp.

Sinónimos: *Dioscorea acutifolia* Phil., *Dioscorea helicifolia* Kunth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Ñame.

Dioscorea axilliflora Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Dioscorea besseriana Kunth var. *berteroi* Uline ex R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Dioscorea besseriana Kunth var. *besseriana*

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Dioscorea biloba (Phil.) Caddick & Wilkin subsp. ***biloba***

Sinónimos: *Epipetrum bilobum* Phil.
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 400-500 m.

Dioscorea biloba (Phil.) Caddick & Wilkin subsp.

coquimbana Viruel, Segarra & L. Villar
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Dioscorea brachybotrya Poepp. var. ***brachybotrya***

Sinónimos: *Dioscorea novemloba* Steud. ex F. Phil.,
Dioscorea scandens Kunze ex Kunth, *Dioscorea buchtienii*
R. Knuth
Hierba trepadora. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1500-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Poñi.

Dioscorea brachybotrya Poepp. var. ***germainii*** Uline ex R.
Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Dioscorea brachystachya Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.

Dioscorea bridgesii Griseb. ex Kunth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Nombre vulgar: Papa cimarrona.

Dioscorea bryoniifolia Poepp.

Sinónimos: *Dioscorea hederacea* Miens ex Bertero
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Camisilla.

Dioscorea cissophylla Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Dioscorea fastigiata Gay

Sinónimos: *Dioscorea cylindrostachya* I.M. Johnst.,
Dioscorea thinophila Phil.
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Dioscorea gayi Phil.

Sinónimos: *Dioscorea arenaria* auct. non Kunth
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.

Dioscorea geissei Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.

Dioscorea gracilis Hook. ex Poepp.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Dioscorea humifusa Poepp. var. ***gracilis*** (Hook. & Arn.)

L.E. Navas
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Dioscorea humifusa Poepp. var. ***humifusa***

Sinónimos: *Dioscorea nigrescens* Phil.
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Huanqui.

Dioscorea humilis Bertero ex Colla subsp. ***humilis***

Sinónimos: *Dioscorea pusilla* Hook., *Epipetrum humile*
(Bertero ex Colla) Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Dioscorea humilis Bertero ex Colla subsp. ***polyanthes*** (F.

Phil.) Viruel, Segarra & L. Villar
Sinónimos: *Epipetrum polyanthes* F. Phil., *Dioscorea*
polyanthes (F. Phil.) Caddick & Wilkin
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Dioscorea litoralis Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, BIO.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Dioscorea longipes Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, ARA.
Rango altitudinal: 100-200 m.

Dioscorea modesta Phil.

Sinónimos: *Dioscorea parvifolia* Phil., *Dioscorea aristolochiifolia* Poepp. var. *parvifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Dioscorea nana Poepp.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-1300 m.

Dioscorea obtusifolia Hook. & Arn. var. *obtusifolia*

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Dioscorea obtusifolia Hook. & Arn. var. *philippii* Uline ex R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Dioscorea oligophylla Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME.

Dioscorea paupera Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Dioscorea pedicellata Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

Dioscorea pencana Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Dioscorea reticulata Gay

Sinónimos: *Dioscorea brachybotrya* Poepp. var. *reticulata* (Gay) Uline ex R. Knuth, *Dioscorea helicifolia* auct. non Kunth, *Dioscorea reticulata* Gay var. *nervosa* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea thermarum* Phil., *Dioscorea nervosa* Phil., *Dioscorea pedatifida* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Jabón del monte.

Dioscorea saxatilis Poepp.

Sinónimos: *Dioscorea heterophylla* Poepp., *Dioscorea*

parviflora Phil., *Dioscorea longifolia* Phil., *Dioscorea heterophylla* Poepp. var. *longifolia* (Phil.) L.E. Navas & Erba, *Dioscorea linearis* Bertero ex Colla, *Dioscorea arenaria* Kunth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

Dioscorea stenocolpus Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Dioscorea tenella Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ.

Rango altitudinal: 400-700 m.

Nombre vulgar: Papa cimarrona.

Dioscorea tenuis R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Dioscorea uliginosa Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Dioscorea valdiviensis R. Knuth

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Dioscorea variifolia Bertero ex Colla

Sinónimos: *Dioscorea acuminata* Steud., *Dioscorea microphylla* Steud.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Dioscorea volckmannii Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

HYDROCHARITACEAE

Egeria

Egeria densa Planch.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, LRI, LLA.

Elodea

Elodea potamogeton (Bertero) Espinosa

Sinónimos: *Diplandra potamogeton* Bertero, *Anacharis potamogeton* (Bertero) Vict., *Anacharis chilensis* Planch., *Egeria chilensis* (Planch.) Benth. & Hook., *Elodea chilensis* (Planch.) Casp.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, VAL, RME, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 20-4450 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Limnobium

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, BIO.

IRIDACEAE

Calydorea

Calydorea xiphioides (Poepp.) Espinosa

Sinónimos: *Sisyrinchium xiphioides* Poepp., *Sisyrinchium grandiflorum* Poepp., *Sisyrinchium speciosum* Hook., *Calydorea speciosa* (Hook.) Herb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Nombre vulgar: Lahue.

Crocsmia

Crocsmia crocosmiiflora (Lemoine ex Burbidge & Dean)

N.E. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, ARA, LLA, JFE.

Herbertia

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt

Sinónimos: *Trifurcia lahue* (Molina) Goldblatt subsp. *lahue*, *Alophia lahue* (Molina) Espinosa, *Ferraria lahue* Molina

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lahue.

Iris

Iris germanica L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: JFE.

Iris pseudacorus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

Libertia

Libertia chilensis (Molina) Gunckel

Sinónimos: *Libertia elegans* Poepp., *Libertia formosa* Graham, *Libertia ixiooides* auct. non (G. Forst.) Spreng., *Strumaria chilensis* Molina, *Libertia crassa* Graham, *Choeradodia chilensis* Herb., *Sisyrinchium fernandezianum* Steud. & Hochst., nom. nud., *Libertia grandiflora* Phil., *Libertia formosa* Graham var. *crassa* (Graham) Baker, *Roterbe elegans* Steud. ex Baker, nom. nud., *Libertia chilensis* Klotzsch ex Baker, nom. nud., *Libertia formosa* Graham var. *grandiflora* (Phil.) Johow, *Libertia insignis* Ravenna, *Libertia umbellata* Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calle-calle, tek-el-tek-el.

Libertia sessiliflora (Poepp.) Skottsbo.

Sinónimos: *Sisyrinchium sessiliflorum* Poepp., *Libertia caeruleascens* Kunth & Bouché, *Sisyrinchium huismo* Dombey ex Baker, nom. nud., *Sisyrinchium caeruleascens* F. Muell.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Trique.

Libertia tricocca Phil.

Sinónimos: *Libertia falcata* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Trique.

Mastigostyla

Mastigostyla cyrtophylla I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cypella cyrtophylla* (I.M. Johnst.) Diels

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Perú.

Olsynium

Olsynium biflorum (Thunb.) Goldblatt

Sinónimos: *Galaxia narcissoides* (Cav.) Willd., *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster, *Phaiophleps odoratissimum* (Lindl.) Raf., *Sisyrinchium odoratissimum* Lindl., *Solenomelus biflorus* (Thunb.) Baker, *Symphystemon biflorus* (Thunb.) Dusén, *Symphystemon narcissoides* (Cav.) Miers ex Klatt, *Symphystemon odoratissimum* (Lindl.) Miers, *Symphystemon patagonicum* Speg., *Gladiolus biflorus* Thunb., *Sisyrinchium narcissoides* Cav., *Phaiophleps patagonica* (Speg.) R.C. Foster

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Olsynium chrysochromum J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Olsynium luteum* (Phil.) Goldblatt, comb. illeg., *Chamelum luteum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Olsynium frigidum (Poepp.) Goldblatt

Sinónimos: *Chamelum andinum* (Phil.) Benth. & Hook., *Chamelum frigidum* (Poepp.) Ravenna, *Sisyrinchium andinum* Phil., *Sisyrinchium frigidum* Poepp., *Solenomelus andinus* (Phil.) Baker, *Solenomelus frigidus* (Poepp.) Klatt, *Susarium andinum* (Phil.) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1100-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp.

colchaguense (Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *colchaguense* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *colchaguense* (Phil.) Baker, *Sisyrinchium colchaguense* Phil., *Sisyrinchium eleutherostemon* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2600 m.

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp.

depauperatum (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl subsp. *depauperatum* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium depauperatum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. ***junceum***

Sinónimos: *Sisyrinchium argentinense* Hauman, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex J. Presl, *Sisyrinchium middletoni* Baker, *Sisyrinchium pauciflorum* Phil., *Sisyrinchium junciforme* Poepp., *Olsynium argentinense* (Hauman) Ravenna, *Sisyrinchium roseum* Herb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 200-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Huilmo.

Olsynium lyckholmi (Dusén) Goldblatt

Sinónimos: *Phaiophleps biflora* (Thunb.) R.C. Foster subsp. *lyckholmi* (Dusén) Goldblatt, *Symphystemon lyckholmi* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Olsynium nigricans (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.

Sinónimos: *Phaiophleps nigricans* (Phil.) R.C. Foster, *Susarium nigricans* Phil., *Sisyrinchium maulense* Ravenna, *Solenomelus nigricans* (Phil.) Baker, *Symphystemon nigricans* (Phil.) Benth. ex Baker

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Olsynium obscurum (Cav.) Goldblatt

Sinónimos: *Galaxia obscura* Cav., *Ona obscura* (Cav.) Ravenna, *Tapeinia obscura* (Cav.) D.M. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Olsynium philippii (Klatt) Goldblatt subsp. ***illapelinum***

(Phil.) J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Sisyrinchium illapelinum* Phil., *Sisyrinchium roseum* Phil., hom. illeg., *Sisyrinchium philippii* Klatt subsp. *illapelinum* (Phil.) Rodr.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Olsynium philippii (Klatt) Goldblatt subsp. ***philippii***

Sinónimos: *Sisyrinchium philippii* Klatt, *Sisyrinchium scabrum* Phil., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. ***leucanthum*** (Colla) R.A. Rodr. & Martic.
Sinónimos: *Sisyrinchium leucanthum* Colla, *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *leucanthum* (Colla) R.A. Rodr., *Sisyrinchium bifolium* Phil., *Sisyrinchium stenophyllum* Phil., *Sisyrinchium nuno* Colla var. *leucanthum* (Colla) Baker, *Sisyrinchium filiforme* Steud., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. ***luridum*** (Ravenna) R.A. Rodr. & Martic.
Sinónimos: *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *luridum* (Ravenna) R.A. Rodr., *Sisyrinchium luridum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. ***scirpeum*** (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.
Sinónimos: *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp. subsp. *scirpeum* (Phil.) R.A. Rodr., *Sisyrinchium scirpeum* Phil., *Sisyrinchium stenopetalum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB.
Rango altitudinal: 500-1000 m.

Olsynium scirpoideum (Poepp.) Goldblatt subsp. ***scirpoideum***
Sinónimos: *Sisyrinchium scirpiforme* Poepp., *Sisyrinchium scirpoideum* Poepp., *Sisyrinchium asperulum* Phil., *Sisyrinchium berterooanum* Phil., *Sisyrinchium floribundum* Phil., *Sisyrinchium gracile* Phil., *Sisyrinchium junciforme* Poepp. var. *nivale* Phil., *Sisyrinchium strictum* Phil., nom. nud., *Sisyrinchium nivale* Phil., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *scirpiforme* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium nuno* Colla, *Sisyrinchium nunna* Steud., *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *gracile* (Phil.) Baker, *Sisyrinchium junceum* E. Mey. ex C. Presl var. *asperulum* (Phil.) Baker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2300 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Huilmo.

Olsynium trinerve (Baker) R.A. Rodr. & Martic.
Sinónimos: *Sisyrinchium trinerve* Baker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2500-4100 m.
Países limítrofes: Perú.

Romulea

Romulea rosea (L.) Eckl.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, BIO.

Sisyrinchium

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. ***adenostemon*** (Phil.) Ravenna
Sinónimos: *Sisyrinchium adenostemon* Phil., *Sisyrinchium pauperculum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sisyrinchium arenarium Poepp. subsp. ***arenarium***
Sinónimos: *Sisyrinchium adenostemon* Phil. subsp. *microspatum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium arenarium* Poepp. subsp. *microspatum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium flexuosum* Lindl., *Sisyrinchium microspatum* Phil., *Sisyrinchium multiflorum* Phil., *Sisyrinchium nervosum* Phil., *Sisyrinchium oligostachyum* Phil., *Sisyrinchium striatum* Sm. var. *microspatum* (Phil.) Speg., *Sisyrinchium angustifolium* Phil., *Sisyrinchium antucense* Ravenna, *Sisyrinchium breviarmium* Ravenna, *Sisyrinchium limarinum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sisyrinchium azureum Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Sisyrinchium chilense Hook.
Sinónimos: *Sisyrinchium iridifolium* auct. non Kunth, *Sisyrinchium iridifolium* Kunth subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium scabrum* Cham. & Schltld. var. *exaltatum* Klatt, *Sisyrinchium uniflorum* Gay ex Phil., *Sisyrinchium ramosum* Herb. var. *chilense* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium graminifolium* auct. non Lindl., *Sisyrinchium graminifolium* Bertero ex Steud., *Sisyrinchium arrayanicum*

Ravenna, *Sisyrinchium micranthum* Cav. subsp. *valdivianum* (Phil.) Ravenna, *Sisyrinchium valdivianum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Clavelillo.

Sisyrinchium cuspidatum Poepp.

Sinónimos: *Sisyrinchium convallium* Ravenna, *Sisyrinchium longifolium* Phil., *Sisyrinchium adenocarpum* Steud., *Sisyrinchium flexuosum* Phil., p.p.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sisyrinchium graminifolium Lindl.

Sinónimos: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *maculatum* (Hook.) Klatt, *Sisyrinchium maculatum* Hook., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *luteum* (Bertero ex Steud.) R.A. Rodr., comb. illeg., *Sisyrinchium luteum* Bertero ex Steud., nom. nud., *Sisyrinchium dasycarpum* Phil., *Sisyrinchium piligerum* Phil., *Sisyrinchium volckmanni* Phil., *Echthronema graminifolium* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *pumilum* Lindl., *Echthronema pumilum* (Lindl.) Herb., *Sisyrinchium tenuifolium* Willd., *Echthronema maculatum* (Hook.) Herb., *Sisyrinchium ascendens* Poepp., *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. var. *ascendens* (Poepp.) Baker, *Sisyrinchium guttatum* Moris, *Sisyrinchium majale* Link, *Sisyrinchium pymaeum* Klotzsch ex Klatt, nom. nud., *Sisyrinchium tingens* Steud., *Sisyrinchium maipoanum* Ravenna, *Sisyrinchium orbiculatum* Ravenna, *Sisyrinchium valparadiseum* Ravenna, *Sisyrinchium gratissimum* Ravenna, *Sisyrinchium tofoense* Ravenna, *Sisyrinchium vestitum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ñuño.

Sisyrinchium micranthum Cav.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Sisyrinchium nanum Phil.

Sinónimos: *Sisyrinchium graminifolium* Lindl. subsp. *nanum* (Phil.) Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 700-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sisyrinchium patagonicum Phil. ex Baker

Sinónimos: *Sisyrinchium lechleri* Phil., *Sisyrinchium nudicaule* Phil., *Sisyrinchium palenae* Phil., *Sisyrinchium rahmeri* Phil., *Sisyrinchium inclinatum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sisyrinchium pearcei Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-2000 m.

Sisyrinchium striatum Sm.

Sinónimos: *Sisyrinchium bracteosum* Phil., *Bermudiana striata* (Sm.) Moench, *Marica striata* (Sm.) Ker Gawl., *Paneguia striata* (Sm.) Raf., *Spathirachis striata* (Sm.) Klotzsch ex Klatt, *Sisyrinchium spicatum* Cav., *Moraea sertata* Jacq., *Sisyrinchium lutescens* Lodd., *Sisyrinchium libertoides* Steud., *Sisyrinchium nigricans* Gay, *Sisyrinchium laevigatum* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Maicillo.

Solenomelus

Solenomelus pedunculatus (Gillies ex Hook.) Hochr.

Sinónimos: *Sisyrinchium pedunculatum* Gillies ex Hook., *Sisyrinchium longistylum* Lem., *Sisyrinchium scabriusculum* Steud., *Solenomelus chilensis* Miers
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1900 m.
Nombre vulgar: Maicillo.

Solenomelus segethii (Phil.) Kuntze

Sinónimos: *Lechera sisyrinchium* Griseb. ex Lechl., nom. nud., *Susarium segethii* (Phil.) Phil., *Symphostemon segethii* (Phil.) Macloskie, *Solenomelus sisyrinchium* (Griseb.) Pax ex Diels, nom. illeg., *Sisyrinchium segethi* Phil., *Solenomelus lechleri* Baker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tapeinia

Tapeinia pumila (G. Forst.) Baill.
Sinónimos: *Ixia magellanica* Lam., *Ixia pumila* G. Forst., *Moraea magellanica* (Lam.) Willd., *Sisyrinchium pumilum* (G. Forst.) Hook., *Tapeinia magellanica* (Lam.) Ker Gawl., *Witsenia magellanica* (Lam.) Pers., *Witsenia pumila* (G. Forst.) Vahl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tigridia

Tigridia philippiana I.M. Johnston.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-900 m.

JUNCACEAE

Distichia

Distichia filamentosa Buchenau
Sinónimos: *Agapatea filamentosa* Buchenau, nom. nud., *Distichia filamentosa* (Buchenau) Griseb., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3500-4700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Distichia muscoides Nees & Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3600-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Juncus

Juncus acuminatus Michx. var. *multiceps* (Kunze ex Kunth) Barros
Sinónimos: *Juncus multiceps* Kuntze ex Kunth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Juncus acutus L. subsp. *acutus* var. *decompositus* Guss.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 600 m.

Juncus acutus L. subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup
Sinónimos: *Juncus acutus* L. var. *leopoldii* (Parl.) Buchenau, *Juncus leopoldii* Parl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LLA.
Rango altitudinal: 900-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Juncus balticus Willd. subsp. *andicola* (Hook.) Snogerup
Sinónimos: *Juncus pictus* Phil., *Juncus andicola* Hook., *Juncus balticus* Willd. var. *pictus* (Phil.) Griseb., *Juncus conceptionis* Steud., *Juncus deserticola* Phil., *Juncus arcticus* Willd. var. *andicola* (Hook.) Balslev
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-4100 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Hunquillo.

Juncus balticus Willd. subsp. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner
Sinónimos: *Juncus balticus* Willd. var. *crassiculmis* Buchenau ex Griseb., *Juncus balticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd.) Kuntze, *Juncus mexicanus* Willd. ex Schult. & Schult. f., *Juncus crassiculmis* (Buchenau) Herter, *Juncus balticus* Willd. var. *columnaris* Buchenau, *Juncus arcticus* Willd. var. *mexicanus* (Willd. ex Roem. & Schult.) Balslev
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3900 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Juncus bufonius L.
Sinónimos: *Juncus bufonius* L. var. *genuinus* Cout., nom. illeg., *Juncus bufonius* L. var. *pumilio* Griseb.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-4100 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Juncus bulbosus L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

Juncus capillaceus Lam.
Sinónimos: *Juncus capillaceus* Lam. var. *montevidensis* Buchenau, *Juncus tenuifolius* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Juncus capitatus Weigel

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Juncus cyperoides Laharpe

Sinónimos: *Juncus graminifolius* E. Mey., *Juncus rivularis* Poepp. ex Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Juncus dichotomus Elliot

Sinónimos: *Juncus cognatus* Kunth, *Juncus tenuis* A. Gray, hom. illeg., *Juncus tenuis* Willd. var. *dichotomus* (Elliott) Wood

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Juncus diemii Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Juncus effusus L. var. *effusus*

Sinónimos: *Juncus bogotensis* Kunth, *Juncus leersii* auct. non T. Marsson

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Juncus effusus L. var. *subglomeratus* DC.

Sinónimos: *Juncus effusus* L. var. *compactus* Lej. & Courtois

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Juncus ernesti-barrosii Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Juncus filiformis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 90-900 m.

Juncus homalocaulis F. Muell. ex Benth.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Juncus imbricatus Laharpe

Sinónimos: *Juncus capillaceus* Lam. var. *chilensis* Buchenau, *Juncus chamissonis* Kunth, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *chamissonis* (Kunth) Buchenau, *Juncus imbricatus* Laharpe var. *lechleri* (Steud.) Buchenau, *Juncus lechleri* Steud., *Juncus spanianthus* Steud., *Juncus collinus* Steud., *Juncus multiflorus* Bertero ex Steud., *Juncus urvillei* Steud., *Juncus chamissonis* Kunth fma. *pusillus* Buchenau

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Juncus involucratus Steud. ex Buchenau

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, BIO, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

Juncus kraussii Hochst. subsp. *austerus* (Buchenau)

Snogerup

Sinónimos: *Juncus austerus* Buchenau

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Juncus llanquihuensis Barros

Sinónimos: *Juncus mendocinus* Barros

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Juncus microcephalus Kunth

Sinónimos: *Juncus floribundus* Kunth, *Juncus luzuloxiphium* Griseb., *Juncus microcephalus* Kunth var. *floribundus* (Kunth) Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *intermedius* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth var. *typicus* Buchenau, nom. illeg., *Juncus microcephalus* Kunth var. *virens* Griseb., *Juncus sellowianus* Kunth, *Juncus microcephalus* Kunth fma. *conglobatus* Barros, *Juncus timotensis* Barros, *Juncus floribundus* Phil., nom. illeg., *Juncus rudis* Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Juncus pallescens Lam.

Sinónimos: *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *elatus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *pycnanthus* Buchenau, *Juncus dombeyanus* J. Gay ex Laharpe var. *typicus* Buchenau, nom. illeg., *Juncus commixtus* Steud., *Juncus proximus* Steud., *Juncus fernandezianus* Steud., *Juncus longifolius* Steud., *Juncus megakoleos* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Hierba de la vaca.

Juncus planifolius R. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Juncus procerus E. Mey.

Sinónimos: *Juncus valdiviae* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Junquillo.

Juncus scheuchzerioides Gaudich.

Sinónimos: *Juncus capillaceus* Hook., hom. illeg., *Juncus exiguus* Gaudich. ex Hook. f., *Juncus inconspicuus* d'Urv., *Juncus pusillus* auct. non Buchenau, *Juncus scheuchzerioides* Gaudich. var. *inconspicuus* (d'Urv.) Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Juncus stipulatus Nees & Meyen

Sinónimos: *Juncus chilensis* Gay, *Juncus corralensis* Phil., *Juncus depauperatus* Phil., *Juncus gayanus* Steud., *Juncus mandonii* Buchenau, *Juncus microcephalus* Kunth var. *pusillus* E. Mey., *Juncus oliganthus* Phil., *Juncus stipulatus* Nees & Meyen var. *corralensis* (Phil.) Buchenau, *Juncus biflorus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Juncus tenuis Willd. var. *congestus* Engelm. ex Buchenau
Sinónimos: *Juncus occidentalis* Wiegand, *Juncus tenuis*

Willd. var. *occidentalis* (Wiegand) Coville
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU.
Países limítrofes: Argentina.

Juncus tenuis Willd. var. *tenuis*

Sinónimos: *Juncus smithii* Kunth, *Juncus subtenuis* Herter, *Juncus tenuis* Willd. var. *multicornis* E. Mey., *Juncus tenuis* Willd. var. *williamsii* Fernald
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Luzula

Luzula alopecurus Desv.

Sinónimos: *Juncodes alopecurus* (Desv.) Kuntze, *Juncoides alopecurus* (Desv.) Macloskie, *Luzula villosa* Wikstr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Luzula antarctica Hook. f.

Sinónimos: *Juncodes antarcticus* (Hook. f.) Kuntze, *Juncoides antarcticum* (Hook. f.) Macloskie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 300-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Luzula brachyphylla Phil.

Sinónimos: *Luzula racemosa* Desv. fma. *brachyphylla* (Phil.) Fuentes
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Luzula campestris (L.) DC.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, BIO, LLA, MAG.

Luzula chilensis Nees & Meyen ex Kunth

Sinónimos: *Luzula rigida* Phil., *Juncodes chilense* (Nees & Meyen ex Kunth) Kuntze, *Luzula chilensis* Nees & Meyen ex Kunth fma. *rigida* (Phil.) Fuentes
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 400-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Luzula excelsa Buchenau

Sinónimos: *Juncodes excelsum* (Buchenau) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Luzula leiboldii Buchenau

Sinónimos: *Juncodes leiboldii* (Buchenau) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 100-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Luzula masafuerana Skottsbo.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 900-1400 m.

Luzula parvula Barros

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 3300-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Luzula racemosa Desv.

Sinónimos: *Juncodes racemosum* (Desv.) Kuntze, *Luzula racemosa* Desv. var. *typica* Buchenau
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1500-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Luzula tristachya Desv.

Sinónimos: *Luzula campestris* (L.) DC. var. *tristachya* (Desv.) Buchenau, *Luzula pauciflora* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Marsippospermum

Marsippospermum grandiflorum (L. f.) Hook. f.

Sinónimos: *Juncus grandiflorus* L. f., *Marsippospermum calyculatum* Desv., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Marsippospermum philippii (Buchenau) Hauman

Sinónimos: *Marsippospermum grandiflorum* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* Buchenau, *Rostkovia gracilis* Phil., hom. illeg., *Rostkovia grandiflora* (L. f.) Hook. f. var. *philippii* (Buchenau) Hosseus
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Marsippospermum reichei Buchenau

Sinónimos: *Rostkovia reichei* (Buchenau) Hosseus
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxychloë

Oxychloë andina Phil.

Sinónimos: *Distichia andina* (Phil.) Benth. & Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 3200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Oxychloë bisexualis Kuntze

Sinónimos: *Andesia bisexualis* (Kuntze) Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2800-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxychloë haumaniana (Barros) Barros

Sinónimos: *Andesia haumaniana* Barros
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Patosia

Patosia clandestina (Phil.) Buchenau

Sinónimos: *Oxychloë clandestina* (Phil.) Hauman, *Rostkovia clandestina* Phil., *Rostkovia brevifolia* Phil., *Oxychloë brevifolia* (Phil.) Buchenau, *Distichia clandestina* (Phil.) Buchenau
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2700-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Rostkovia

Rostkovia magellanica (Lam.) Hook. f.

Sinónimos: *Juncus magellanicus* Lam., *Rostkovia sphaerocarpa* Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

JUNCAGINACEAE

Lilaea

Lilaea scilloides (Poir.) Hauman

Sinónimos: *Lilaea subulata* Humb. & Bonpl., *Phalangium scilloides* Poir.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Tetroncium

Tetroncium magellanicum Willd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Triglochin

Triglochin concinna Burt Davy

Sinónimos: *Triglochin maritima* L. var. *altoandina* Cabrera, *Triglochin maritima* L. var. *deserticola* Phil., *Triglochin monanthos* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, VAL, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Triglochin palustris L.

Sinónimos: *Triglochin fonticola* Phil., *Triglochin andinum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU, LLA, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Triglochin striata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Triglochin montevidensis* Spreng, *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *filifolia* Buchenau, *Triglochin striata* Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Buchenau, *Triglochin lechleri* Steud., *Triglochin litoreum* Phil., *Triglochin volckmanni* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

LUZURIAGACEAE

Luzuriaga

Luzuriaga marginata (Gaertn.) Benth.

Sinónimos: *Callixene marginata* (Gaertn.) Lam., *Enargea marginata* Gaertn., *Callixene magellanicum* Raesch.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Luzuriaga polyphylla (Hook.) J.F. Macbr.

Sinónimos: *Callixene polyphylla* Hook., *Luzuriaga erecta* Kunth, *Enargea polyphylla* (Hook.) F. Muell.

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Quilineja.

Luzuriaga radicans Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Callixene radicans* (Ruiz & Pav.) Macloskie, *Enargea radicans* (Ruiz & Pav.) F. Muell.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quilineja.

ORCHIDACEAE

Bipinnula

Bipinnula fimbriata (Poepp.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Chloraea fimbriata* Poepp., *Bipinnula mystacina* Lindl., *Jouyella fimbriata* (Poepp.) Szlach. & Marg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Bipinnula gabriel P.A. Bravo & G.M. Baeza

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Bipinnula plumosa Lindl.

Sinónimos: *Bipinnula philipporum* Kraenzl., *Bipinnula*

plumosa Lindl. var. *philipporum* (Krzl) Reiche, *Jouyella philipporum* (Kraenzl.) Szlach. & Marg., *Jouyella plumosa* (Lindl.) Szlach. & Marg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Bipinnula taltalensis I.M. Johnst.
Sinónimos: *Jouyella taltalensis* (I.M.Johnst.) Szlach. & Marg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.

Bipinnula volkmannii Kraenzl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, BIO, ARA.

Brachystele

Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr.
Sinónimos: *Ophrys unilateralis* Poir., *Gyrostachys chilensis* (A. Rich.) Kuntze, *Gyrostachys unilateralis* (Poir.) Kuntze, *Spiranthes chilensis* A. Rich., *Spiranthes diuretica* Lindl., *Neottia diuretica* Willd., *Sarcoglottis diuretica* (Willd.) W.H. Baxter, *Epipactis diuretica* (Willd.) Stokes, *Spiranthes nuil* A. Rich., *Odontorrhynchus chilensis* (A. Rich.) Garay, *Odontorrhynchus domeykoanus* Szlach., *Odontorrhynchus erosus* Szlach., *Odontorrhynchus variabilis* Garay
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Nuil.

Chloraea

Chloraea alpina Poepp.
Sinónimos: *Asarca alpina* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea hookeriana* Speg. & Kraenzl., *Chloraea ferruginea* Speg. & Kraenzl., *Chloraea xerophila* Kraenzl., *Chloraea perez-moreaui* Garay, *Chloraea cholilensis* Speg. & Kraenzl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tulipán del monte.

Chloraea barbata Lindl.
Sinónimos: *Asarca barbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea aurea* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.

Chloraea bidentata (Poepp. & Endl.) M.N. Correa
Sinónimos: *Asarca bidentata* Poepp. & Endl., *Chloraea*

bicallosa Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.

Chloraea bletioides Lindl.
Sinónimos: *Chloraea ulanthoides* Lindl., *Asarca bletioides* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea grandis* Kraenzl., *Chloraea affinis* Lindl., *Asarca affinis* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea ulanthoides* Lindl. var. *affinis* (Lindl.) Reiche, *Chloraea ulanthoides* Lindl. var. *grandis* (Kraenzl.) Reiche, *Chloraea lindleyi* Poepp.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Nombre vulgar: Lengua de loro.

Chloraea chrysantha Poepp.
Sinónimos: *Asarca chrysantha* (Poepp.) Kuntze, *Asarca aurantiaca* Lindl., *Chloraea crocata* Phil., *Chloraea aurantiaca* Lindl., *Asarca speciosa* Lindl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Nombre vulgar: Pico de loro.

Chloraea chrysochlora Phil.
Sinónimos: *Asarca chrysochlora* (Phil.) Kuntze, *Chloraea collicensis* Kraenzl., *Chloraea hemichloris* Kraenzl., *Asarca lechleri* (Lindl. ex Kraenzl.) Kunze, *Chloraea lechleri* Lindl. ex Kraenzl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.
Países limítrofes: Argentina.

Chloraea crispa Lindl.
Sinónimos: *Asarca crispa* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea cygnea* Phil., *Asarca cygnea* (Phil.) Kuntze, *Chloraea spectabilis* Phil., *Asarca conspicua* Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Nombre vulgar: Gavilú, pico de loro.

Chloraea cristata Lindl.
Sinónimos: *Chloraea pogonata* Phil., *Asarca pogonata* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.

Chloraea cuneata Lindl.
Sinónimos: *Asarca cuneata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca obovata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea obovata* Phil., *Chloraea nervosa* Phil. ex Kraenzl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI.

Chloraea disoides Lindl.

Sinónimos: *Chileorchis disoides* (Lindl.) Szlach., *Asarca disodes* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea picta* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea disoides* Lindl. var. *picta* (Phil. ex Kraenzl.) M.N. Correa

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA.

Chloraea galeata Lindl.

Sinónimos: *Asarca galeata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca maculosa* Poepp., *Chloraea alaris* Lindl., *Chloraea secunda* Phil., *Chloraea suaveolens* Phil., *Asarca maculata* Steud., *Chloraea besseri* Rchb.f., *Chloraea berteriana* Kraenzl., *Asarca besseri* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea rypaloglossa* A. Rich., *Asarca rypaloglossa* (A. Rich.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Chloraea gaudichaudii Brongn.

Sinónimos: *Asarca gaudichaudii* (Brongn.) Kuntze, *Arethusa lutea* Gaud., *Epipactis lutea* (Gaudich.) Steud., *Chloraea fonki* Phil. orth. mut., *Asarca fonckii* (Phil.) Kuntze orth. mut., *Chloraea inconspicua* Phil., *Asarca inconspicua* (Phil.) Kuntze, *Chloraea falklandica* Kraenzl., *Chloraea gymnoglossa* Phil., *Asarca gymnoglossa* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Chloraea gavilu Lindl.

Sinónimos: *Limodorum luteum* Lam., *Chloraea sceptrum* Rchb.f., *Epidendrum luteum* (Lam.) Poir., *Chloraea lutea* (Wild.) Schltr., nom. illeg., *Chloraea lindleyi* Poepp., *Chloraea semitensis* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea lotensis* Rolfe, *Cymbidium luteum* (Lam.) Willd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Chloraea heteroglossa Rchb.f.

Sinónimos: *Asarca heteroglossa* (Rchb.f.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Chloraea lamellata Lindl.

Sinónimos: *Asarca lamellata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea decipiens* Poepp., *Chloraea semibarbata* Lindl., *Asarca semibarbata* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea semibarbata* Lindl. ssp. *pearcei* Kraenzl., *Chloraea pearcei* Phil., *Asarca pearcei* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Chloraea longipetala Lindl.

Sinónimos: *Asarca longipetala* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea*

panduraeformis Phil., *Chloraea multilamellata* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea liliaceae* Kraenzl., *Chloraea reicheana* Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Chloraea magellanica Hook. f.

Sinónimos: *Asarca magellanica* (Hook.f.) Kuntze, *Chloraea bouganvilleana* Franch., *Chloraea spegazziniana* Kraenzl., *Chloraea hystrix* Speg. & Kraenzl., *Chloraea leontoglossa* Kraenzl. & Speg., *Chloraea kraenzliniana* Hoehne

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Chloraea multiflora Lindl.

Sinónimos: *Asarca multiflora* (Lindl.) Kuntze, *Chloraea densa* Rich., *Chloraea campestris* Poepp., *Chloraea stenantha* Kraenzl., *Asarca densa* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea poeppigiana* A. Rich., *Asarca poeppigiana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea pseudo-campestris* Kraenzl., *Chloraea decipiens* Poepp.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Nombre vulgar: Gavilú.

Chloraea nudilabia Poepp.

Sinónimos: *Asarca nudilabia* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea leucojiflora* Kraenzl., *Chloraea heteroglossa* Rchb.f., *Chloraea homopetala* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Chloraea parviflora (Poepp.) Mourgues & Novoa

Sinónimos: *Asarca parviflora* Poepp. *Chloraea reflexa* Phil., *Chloraea reflexa* Phil. var. *latifolia* Phil., *Asarca reflexa* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, BIO.

Chloraea philippii Rchb.f.

Sinónimos: *Asarca philippii* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea lagunae-pacis* Kraenzl., *Chloraea lineata* Phil. ex Kraenzl., *Chloraea modesta* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

Chloraea prodigiosa Rchb.f.

Sinónimos: *Asarca prodigiosa* (Rchb.f.) Kuntze, *Chloraea calopogon* Phil., *Asarca calopogon* (Phil.) Kuntze, *Chloraea dasypogon* Phil., *Asarca dasypogon* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Chloraea speciosa Poepp.

Sinónimos: *Chloraea gayana* Rich., *Asarca gayana* (A. Rich.) Kuntze, *Chloraea elwelsii* Rolfe, *Chloraea speciosa* Poepp. fma. *sterilis* Kraenzl., *Asarca insignis* Kuntze, comb. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Chloraea virescens (Willd.) Lindl.

Sinónimos: *Asarca patagonica* (Phil.) Kuntze, *Chloraea patagonica* Phil., *Chloraea pigichen* Kuntze, *Chloraea piquichen* Lindl., *Chloraea pleistodactyla* Kraenzl. & Speg., *Cymbidium virescens* Willd., *Chloraea incisa* Poepp., *Chloraea odontoglossa* A. Rich., *Chloraea unguis-cati* Rchb.f., *Chloraea chlorosticta* Phil., *Asarca chlorosticta* (Phil.) Kuntze, *Asarca odontoglossa* (A. Rich.) Kuntze, *Asarca unguis-cati* (Rchb.f.) Kuntze, *Asarca incisa* (Poepp.) Kuntze, *Asarca fimbriata* (Phil.) Kuntze, *Chloraea fimbriata* Phil., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Piquichén, pichiquén.

Chloraea viridiflora Poepp.

Sinónimos: *Asarca viridiflora* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea verrucosa* Phil., *Chloraea piquichen* (Lam.) Lindl., *Chloraea viridiflora* Poepp. var. *reticulata* Reiche, *Chloraea robusta* Rolfe, *Chloraea leontoglossa* Kraenzl., nom. illeg., *Asarca tuberculata* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Países limítrofes: Argentina.

Chloraea volkmannii Phil. ex Kraenzl.

Sinónimos: *Chloraea lineata* Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Codonorchis

Codonorchis lessonii (Brongn.) Lindl.

Sinónimos: *Epipactis lessonii* d'Urv., *Calopogon lessonii* (d'Urv.) Brong., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f., *Pogonia tetraphylla* Poepp. & Endl., *Codonorchis tetraphylla* (Poepp. & Endl.) L.O. Williams, *Codonorchis poeppigii* Lindl., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f. var. *poeppigii* Reiche, *Codonorchis lessonii* (Brong.) Lindl. var. *poeppigii* (Lindl.) Reiche, *Codonorchis skottsbergii* Kraenzl., *Pogonia lessonii* (D'Urv.) Rchb.f. var. *skottsbergii* Reiche, *Codonorchis lessonii* (Brong.) Lindl. var. *skottsbergii* (Kraenzl.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palomita, azucena.

Correorchis

Correorchis cylindrostachya (Poepp.) Szlach.

Sinónimos: *Chloraea cylindrostachya* Poepp., *Asarca cylindrostachya* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea papillosa* Phil., *Chloraea major* Ravenna, *Chloraea leptopetala* Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

Gavilea

Gavilea araucana (Phil.) M.N. Correa

Sinónimos: *Asarca araucana* Phil., *Asarca araucana* Phil. var. *incisa* Hauman, *Gavilea araucana* (Phil.) M.N. Correa var. *incisa* Hauman

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Gavilea australis (Skotts.) M.N. Correa

Sinónimos: *Asarca australis* Skotts., *Asarca enigmatica* Hauman

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Gavilea cardioglossa (Reiche) Martic.

Sinónimos: *Gavilea cardioglossa* (Reiche) M.N. Correa, comb. illeg., *Asarca cardioglossa* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Gavilea chica (Speg. & Kraenzl.) Chemisquy

Sinónimos: *Chloraea chica* Speg. & Kraenzl., *Chloraea kruegeri* F. Phil. ex Kraenzl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Gavilea gladysiae Chemisquy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Gavilea glandulifera (Poepp.) M.N. Correa
Sinónimos: *Asarca appendiculata* Phil. ex Kraenzl., *Asarca glandulifera* Poepp., *Chloraea albo-rosea* Kraenzl. & Speg., *Chloraea volucris* Lindl., *Gavilea auriculata* Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea insularis M.N. Correa
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.

Gavilea kingii (Hook. f.) M.N. Correa
Sinónimos: *Asarca kingii* Hook.f., *Chloraea kingii* Macloskie
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAG.

Gavilea litoralis (Phil.) M.N. Correa
Sinónimos: *Chloraea litoralis* Phil., *Asarca litoralis* (Phil.) Kunze, *Asarca litoralis* (Phil.) Reiche, *Asarca macroptera* Kraenzl., *Gavilea macroptera* (Kraenzl.) M. N. Correa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea longibracteata (Lindl.) Sparre ex L.E. Navas
Sinónimos: *Chloraea longibracteata* Lindl., *Asarca longibracteata* (Lindl.) Kuntze, *Asarca sinuata* Lindl., *Asarca longibracteata* (Lindl.) Skottsb., comb. illeg., *Asarca berterii* Rchb.f., *Asarca verrucosa* A. Rich. ex Gay, *Asarca spectabilis* Phil., *Chloraea semibarbata* Lindl. ssp. *spectabilis*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Gavilea lutea (Pers.) M.N. Correa
Sinónimos: *Serapias lutea* Comm. ex Pers., *Asarca lutea* (Comm. ex Pers.) Kuntze, *Asarca lutea* (Comm. ex Pers.) Skottsb., comb. illeg., *Chloraea lutea* (Comm. ex Pers.) Skottsb., *Chloraea commersonii* Brongn., nom. illeg., *Asarca commersonii* (Brongn.) Hook. f., comb. illeg., *Asarca commersonii* (Brongn.) Kuntze, comb. illeg., *Gavilea acutiflora* Poepp., *Asarca acutiflora* (Poepp.) Poepp. & Endl., *Asarca brachychila* Phil., *Asarca thermarum* Phil. ex Kraenzl., *Asarca tenuiflora* Rolfe, *Asarca acutifolia* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea odoratissima Poepp.
Sinónimos: *Asarca odoratissima* Poepp. & Endl., *Chloraea*

odoratissima (Poepp. & Endl.) Macloskie, *Asarca chrysostachya* Phil., *Asarca platyantha* Kraenzl. auct. non Rchb.f., *Asarca sulphurea* Phil., *Asarca ventanai* Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea platyantha (Rchb.f.) Ormd.
Sinónimos: *Asarca platyantha* Rchb.f., *Asarca glandulifera* Poepp. var. *illapelina* Reiche, *Gavilea glandulifera* (Poepp.) M.N. Correa var. *illapelina* (Reiche) Novoa, J. Espejo, Cisternas, M. Rubio y Domínguez, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea supralabellata M.N. Correa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea trullata Ormd.
Sinónimos: *Asarca cardioglossa* Reiche var. *patagonica* Garay, *Gavilea cardioglossa* (Reiche) Martic. var. *patagonica* (Garay) M.N. Correa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Países limítrofes: Argentina.

Gavilea venosa (Lam.) Garay & Ormd.
Sinónimos: *Limodorum venosum* Lam., *Gavilea leucantha* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Asarca leucantha* Poepp. & Endl., comb. illeg., *Gavilea feuilleana* (Kraenzl.) Lehnebach, *Asarca feuilleana* Kraenzl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Gavilea wittei (Hicken) Ormd.
Sinónimos: *Asarca patagonica* Skottsb., hom. illeg., *Chloraea wittei* Hicken, *Gavilea patagonica* (Skottsb.) M.N. Correa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Habenaria

Habenaria pumila Poepp.
Sinónimos: *Habenaria paucifolia* Lindl., *Habenaria germainii* Phil., *Habenaria uliginosa* Phil., hom. illeg., *Habenaria brachyceros* Phil., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Países limítrofes: Argentina.

Myrosmodes

Myrosmodes nervosa (Kraenzl.) Novoa, C. Vargas & Cisternas
Sinónimos: *Aa nervosa* (Kraenzl.) Schltr., *Altensteinia nervosa* Kraenzl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.

Ulantha

Ulantha apinnula (Gosewijn) Szlach.
Sinónimos: *Chloraea apinnula* (Gosewijn) Szlach., *Bipinnula apinnula* Gosewijn
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Ulantha grandiflora (Poepp.) Szlach.
Sinónimos: *Asarca grandiflora* (Poepp.) Kuntze, *Chloraea grandiflora* Poepp.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

PHILESIACEAE

Lapageria

Lapageria rosea Ruiz & Pav.
Arbusto trepador. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-400 m.
Nombre vulgar: Copihue.

Philesia

Philesia magellanica J.F. Gmel.
Sinónimos: *Philesia buxifolia* Lam.
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Coicopihue.

POACEAE

Agropyron

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Agrostis

Agrostis arvensis Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, LLA.
Rango altitudinal: 10-420 m.

Agrostis brachyathera Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 300-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis breviculmis Hitchc.
Sinónimos: *Agrostis nana* (J. Presl) Kunth, *Trichodium nanum* J. Presl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 820-2800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Agrostis capillaris L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Agrostis castellana Boiss. & Reut.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Agrostis gigantea Roth
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. *glabra*
Sinónimos: *Trichodium glabrum* J. Presl, *Agrostis gayana* E. Desv., *Agrostis andina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 170-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis glabra (J. Presl) Kunth var. *melanthes* (Phil.) Rúgolo & De Paula
Sinónimos: *Agrostis melanthes* Pilg., *Calamagrostis laxiflora* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 45-2070 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis idahoensis Nash

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 10-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Especie de distribución disyunta en Norte y Sudamérica.

Agrostis imberbis Phil.

Sinónimos: *Agrostis stenophylla* Phil., *Agrostis scotantha* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 175-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis inconspicua Kunze ex E. Desv.

Sinónimos: *Agrostis airiformis* Steud. (*A. airaeformis*), *Agrostis airoides* Franch.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-2250 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis insularis Rúgolo & A.M. Molina

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 25-30 m.

Agrostis leptotricha E. Desv.

Sinónimos: *Agrostis lechleri* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis masafuerana Pilg.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 880-1350 m.

Agrostis mertensii Trin.

Sinónimos: *Agrostis williamsii* Phil., *Agrostis poeppigiana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 15-2200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Agrostis meyenii Trin.

Sinónimos: *Agrostis conferta* Nees & Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 15-3200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Agrostis perennans (Walter) Tuck.

Sinónimos: *Agrostis tenuifolia* M. Bieb. var. *fretensis* Hook.f., *Agrostis flavidula* Steud., *Agrostis aberrans* Steud., *Agrostis violacea* Phil., *Agrostis exarata* Trin. var. *angustifolia* Hack., *Agrostis canina* L. var. *grandiflora* Hack. hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 10-2200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Agrostis philippiana Rúgolo & De Paula

Sinónimos: *Agrostis clausa* Phil. hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-2070 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis scabra Willd.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Agrostis serranoi Phil.

Sinónimos: *Agrostis vaginata* Phil., *Agrostis delfini* Phil., *Agrostis oligoclada* Phil., *Agrostis fuegiana* Hack., *Agrostis aristata* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 25-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ilusión.

Agrostis stolonifera L. var. *palustris* (Huds.) Farw.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Agrostis stolonifera L. var. *stolonifera*

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Agrostis tolucensis Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3930-4750 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Agrostis uliginosa Phil.

Sinónimos: *Agrostis paucinodis* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis umbellata Colla

Sinónimos: *Agrostis chilensis* Trin., *Agrostis canina* var. *umbellata* (Colla) Kuntze, *Agrostis glabra* Hochst. ex E. Desv., *Agrostis paradisiaca* Steud., *Agrostis patens* Trin., *Agrostis stricta* Trin.
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, AIS.
Rango altitudinal: 70-2000 m.

Agrostis vidalii Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 15-1250 m.
Países limítrofes: Argentina.

Agrostis vinealis Schreb.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ.

Aira

Aira caryophyllea L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Aira elegantissima Schur

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, ARA.

Aira praecox L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG, JFE.

Alopecurus

Alopecurus aequalis Sobol.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Alopecurus geniculatus L. var. *geniculatus*

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Alopecurus geniculatus L. var. *patagonicus* Parodi

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 300-550 m.
Países limítrofes: Argentina.

Alopecurus heleochloides Hack.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, RME, MAG.
Rango altitudinal: 25-3000 m.

Alopecurus lechleri Steud.

Sinónimos: *Alopecurus antarcticus* Lechler ex Steud., nom. illeg. como sin. de *Alopecurus lechleri* Steud., *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *lechleri* (Steud.) Parodi
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI.
Rango altitudinal: 10-10 m.

Alopecurus magellanicus Lam. var. *bracteatus* (Phil.)

Mariano
Sinónimos: *Alopecurus bracteatus* Phil., *Alopecurus antarcticus* Vahl var. *bracteatus* (Phil.) Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Alopecurus magellanicus Lam. var. *magellanicus*

Sinónimos: *Alopecurus antarcticus* Vahl, *Alopecurus alpinus* Sm. var. *antarcticus* (Vahl) Macloskie & Dusén, *Alopecurus alpinus* Sm. fma. *antarctica* (Vahl) Hack., *Alopecurus alpinus* Sm. var. *aristatus* Hook fma., nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-1750 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Alopecurus myosuroides Huds.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Alopecurus pratensis L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Amelichloa

Amelichloa brachychaeta (Godr.) Arriaga & Barkworth

Sinónimos: *Stipa brachychaeta* Godr., *Nassella brachychaeta* (Godr.) Barkworth, *Achnatherum brachychaetum* (Godr.) Barkworth, *Jarava brachychaeta* (Godr.) Peñail.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 120-120 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Amelichloa brevipes (E. Desv.) Arriaga & Barkworth
Sinónimos: *Stipa brevipes* E. Desv., *Jarava brevipes* (E. Desv.) Peñail.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-3325 m.
Países limítrofes: Argentina.

Amelichloa caudata (Trin.) Arriaga & Barkworth
Sinónimos: *Stipa caudata* Trin., *Achnatherum caudatum* (Trin.) S.W.L. Jacobs & J. Everett, *Jarava caudata* (Trin.) Peñail., *Stipa bertrandii* Phil., *Stipa amphiocarpa* Phil., *Stipa litoralis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 20-950 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ammophila

Ammophila arenaria (L.) Link
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, MAU, ARA, LLA, MAG.

Amphibromus

Amphibromus scabrivalvis (Trin.) Swallen
Sinónimos: *Avena scabrivalvis* Trin., *Bromus holciformis* Steud. & Hochst., *Helictotrichon scabrivalvis* (Trin.) Renvoize
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-450 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Anatherostipa

Anatherostipa bomanii (Hauman) Peñail.
Sinónimos: *Nicoraella bomanii* (Hauman) Torres, *Stipa bomanii* Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3750-4550 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anatherostipa hans-meyeri (Pilg.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa hans-meyeri* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Anatherostipa mucronata (Griseb.) F. Rojas
Sinónimos: *Piptochaetium mucronatum* Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anatherostipa rigidiseta (Pilg.) Peñail.
Sinónimos: *Oryzopsis rigidiseta* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3890-4100 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Anatherostipa venusta (Phil.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa venusta* Phil., *Nicoraella venusta* (Phil.) Torres
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3400-4600 m.
Nombre vulgar: Vizcachera.

Anthoxanthum

Anthoxanthum altissimum (Steud.) Veldkamp
Sinónimos: *Hierochloe altissima* Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 5-780 m.
Nombre vulgar: Paja ratonera.

Anthoxanthum guncelii (Parodi) Veldkamp
Sinónimos: *Hierochloe guncelii* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 5-280 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Paja ratonera.

Anthoxanthum juncifolium (Hack.) Veldkamp
Sinónimos: *Hierochloe juncifolia* (Hack.) Parodi, *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth var. *juncifolia* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 20-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anthoxanthum odoratum L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Anthoxanthum pusillum (Hack. ex Dusén) Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe pusilla* Hack. ex Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Anthoxanthum redolens (Vahl) P. Royen

Sinónimos: *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. et Schult.,

Holcus redolens Vahl, *Avena redolens* (Vahl) Pers., *Melica*

magellanica Desr., *Hierochloe antarctica* (Labill.) R. Brown

var. *redolens* (Vahl) Brongn., *Hierochloe redolens* (Vahl)

Roem. & Schult. var. *magellanica* (Hook.f.) Macloskie,

Hierochloe magellanica Hook.f., *Hierochloe sorianoi* De

Paula

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-1320 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

Anthoxanthum spicatum (Parodi) Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe spicata* Parodi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, MAG.

Rango altitudinal: 950-950 m.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

Anthoxanthum utriculatum (Ruiz & Pav.) Y. Schouten & Veldkamp

Sinónimos: *Hierochloe utriculata* (Ruiz & Pav.) Kunth,

Torresia utriculata Ruiz & Pav., *Hierochloe utriculata* (Ruiz

& Pav.) Kunth var. *minor* Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 2-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Paja ratonera.

Apera

Apera interrupta (L.) P. Beauv.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, ARA.

Aristida

Aristida adscensionis L.

Sinónimos: *Aristida bromoides* Kunth., *Aristida dispersa*

var. *nana* Trin. & Rupr., *Aristida festucoides* Steud. &

Hoscht., *Aristida nana* Steud., *Chaetaria bromoides* Roem.

& Schult., *Chaetaria nana* Nees ex Steud., *Aristida humilis*

Kunth, *Aristida adscensionis* L. var. *bromoides* (Kunth)

Henrard

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 25-3660 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Aristida pallens Cav. var. ***intermedia*** Trin. & Rupr.

Sinónimos: *Aristida pallens* var. *geminata* Caro

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón.

Aristida pallens Cav. var. ***pallens***

Sinónimos: *Aristida glaberrima* Steud., *Aristida pallens* var.

genuina Trin. & Rupr., *Chetaria pallens* (Cav.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón.

Aristida spegazzinii Arechav.

Sinónimos: *Aristida pampeana* Speg., *Aristida spegazzinii*

var. *abbreviata* Hack., *Aristida spegazzinii* fma. *colorata*

Hack., *Aristida spegazzinii* var. *genuina* Hack., *Aristida*

spegazzinii var. *pallescens* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 65-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Arrhenatherum

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

var. ***bulbosum*** (Willd.) Spenn.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,

MAG.

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

var. ***elatius***

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA.

Arundo

Arundo donax L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO,

MAU, NUB, BIO, ARA.

Austrostipa

Austrostipa scabra (Lindl.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Avena

Avena barbata Pott ex Link
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LLA, JFE.

Avena fatua L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA, IPA.

Avena sativa L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Avena sterilis L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME.

Avena strigosa Schreb.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, LLA.

Avenella

Avenella flexuosa (L.) Drejer
Sinónimos: *Aira flexuosa* L., *Deschampsia flexuosa* (L.)
Nees, *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., *Deschampsia*
tenella Phil. hom. illeg., *Deschampsia philippii* Macloskie,
Aira vestita Steud., *Deschampsia vestita* (Steud.) Hauman,
Deschampsia martinii Phil., *Avenella flexuosa* (L.) Parl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Axonopus

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.
Sinónimos: *Axonopus paschalis* (Stapf) Pilg., *Paspalum*
paschale Stapf, *Paspalum scoparium* Flügge var.
oligostachyum Hack. ex Fuentes, *Milium compressum* Sw.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 5-400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Heriki hare (Rapa Nui).

Bothriochloa

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter
Sinónimos: *Andropogon barbinodis* Lag.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 400-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter
Sinónimos: *Andropogon laguroides* DC.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 10-1000 m.
Nombre vulgar: Cola de zorro.

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. *australis*
Scrivanti
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 120-2600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Coirón.

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp.
parvispiculus (Hitchc.) Davidse
Sinónimos: *Andropogon saccharoides* Sw. subsp.
parvispiculus Hitchc., *Andropogon cacharoides* Sw. var.
parvispiculus (Hitchc.) Standl., *Bothriochloa saccharoides*
var. *parvispiculus* (Hitchc.) Tovar
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. subsp. *saccharoides*
Sinónimos: *Andropogon saccharoides* Sw., *Andropogon*
berteronianus Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 10-740 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Bouteloua

Bouteloua simplex Lag.
Sinónimos: *Chondrosium tenue* P. Beauv. ex Kunth,
Bouteloua tenuis (P. Beauv. ex Kunth) Griseb., *Chondrosium*
humile P. Beauv. ex Kunth, *Bouteloua tenuis* var. *humilis* (P.
Beauv. ex Kunth) Griseb., *Bouteloua brachyanthera* Phil.,
Bouteloua rahmeri Phil., *Bouteloua simplex* var. *rahmeri*

(Phil.) Henrard
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2700-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Brachypodium

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, JFE.

Briza

Briza maxima L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Briza minor L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Bromelica

Bromelica cepacea (Phil.) Nicora
Sinónimos: *Festuca cepacea* Phil., *Melica cepacea* (Phil.)
Scribn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 1000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bromidium

Bromidium anomalum (Trin.) Döll.
Sinónimos: *Aira anomala* Trin., *Agrostis koelerioides*
E. Desv., *Deyeuxia anomala* (Trin.) Benth. & Hook.f.,
Bromidium hygrometricum (Nees) Nees & Meyen var.
anomalum (Trin.) Kuntze, *Agrostis anomala* (Trin.) Herter,
Koeleria chilensis Steud., nom. nud., *Didymochaeta*
chilensis Steud.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-900 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Bromidium trisetoides (Steud.) Rúgolo
Sinónimos: *Agrostis trisetoides* Steud.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 25-300 m.

Bromus

Bromus araucanus Phil.
Sinónimos: *Bromus alpestris* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, MAG.
Rango altitudinal: 600-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bromus berteroi Colla
Sinónimos: *Trisetum hirtum* Trin., *Avena villosula* Kunze
ex E. Desv., *Trisetum barbartum* Steud., *Bromus trinii* E.
Desv. var. *micranthera* E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var.
pallidiflora E. Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *manicata* E.
Desv., *Bromus trinii* E. Desv. var. *stricta* E. Desv., *Bromus*
bicuspidis Nees ex Steud., *Danthonia pseudo-spicata* Muell.,
Trisetum litorale Phil., *Trisetum trinii* (E. Desv.) Louis-
Marie var. *pallidiflorus* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum*
trinii (E. Desv.) var. *manicatum* (E. Desv.) Louis-Marie,
Trisetum trinii (E. Desv.) Louis-Marie var. *micrantherum*
(E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii* (E. Desv.) Louis-
Marie var. *strictum* (E. Desv.) Louis-Marie, *Trisetum trinii*
(E. Desv.) Louis-Marie var. *litorale* (Phil.) Louis-Marie,
Trisetobromus hirtus (Trin.) Nevski
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,
MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 5-1600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bromus burkartii Muñoz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1080-1490 m.

Bromus catharticus Vahl var. *catharticus*
Sinónimos: *Bromus haenkeanus* (J. Presl) Kunth,
Ceratochloa haenkeana J. Presl, *Bromus willdenowii* Kunth
var. *haenkeanus*, *Bromus uniolooides* Kunth var. *haenkeanus*
(J. Presl) Shear
Hierba. Anual, bienal o perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE,
IPA.
Rango altitudinal: 5-4550 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bromus catharticus Vahl var. *elatus* (E. Desv.) Planchuelo
Sinónimos: *Bromus cebadilla* Steud., *Bromus stamineus* E.
Desv., *Bromus valdivianus* Phil., *Bromus uniolooides* fma.
elatus (E. Desv.) Allen & Thell. ex Kloos, *Ceratochloa*
valdiviana (Phil.) Holub, *Ceratochloa staminea* (E. Desv.)
Stace, *Bromus catharticus* subsp. *stamineus* (E. Desv.)
Massa

Hierba. Anual, bienal o perenne. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,
NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 2-4680 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Lanco, cebadilla, pasto del perro.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Bromus coloratus Steud.

Sinónimos: *Bromus patagonicus* Phil., *Bromus uniolooides*
Kunth var. *coloratus* (Steud.) Pilg., *Ceratochloa colorata*
(Steud.) Holub
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 25-1490 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bromus erectus Huds.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: BIO, MAG.

Bromus guncckelii Matthei

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3100-3740 m.

Bromus hordeaceus L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Bromus lanatus Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 4100-4720 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bromus lanceolatus Roth

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU.

Bromus lithobius Trin.

Sinónimos: *Bromus uniolooides* var. *humilis* E. Desv., *Bromus*
chilensis Trin., *Bromus fonckii* Phil., *Bromus scaber* Phil.,
Bromus andinus Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 2-1900 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Bromus madritensis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, MAU, ARA.

Bromus mango E. Desv.

Sinónimos: *Ceratochloa mango* (E. Desv.) Holub
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, ARA.
Rango altitudinal: 349-1490 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Mango.

Bromus pellitus Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 800-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bromus racemosus L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA, MAG.

Bromus rigidus Roth

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Bromus scoparius L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.

Bromus secalinus L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Bromus setifolius J. Presl var. *brevifolius* Nees

Sinónimos: *Bromus macranthos* Meyen, *Bromus*
macranthos Meyen ex E. Desv. var. *macrantha*
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO,
ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 15-3950 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bromus setifolius J. Presl var. *pictus* (Hook.) Skottsb.

Sinónimos: *Bromus pictus* Hook.f., *Bromus macranthos* E.
Desv. var. *minor* E. Desv., *Bromus setifolius* J. Presl var.
pictus (Hook.f.) J.A. Cámara
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAG.
Rango altitudinal: 15-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bromus setifolius J. Presl var. *setifolius*

Sinónimos: *Bromus macranthos* Meyen var. *setifolius* (J.
Presl) E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 80-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Bromus squarrosus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, BIO, LLA.

***Bromus stamineus* E.Desv.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO,
ARA, LLA, MAG, JFE.

***Bromus sterilis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Bromus tectorum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, ARA, LLA.

***Bromus tunicatus* Phil.**

Sinónimos: *Bromus culmineus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 5-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calotheca

***Calotheca brizoides* (Lam.) Desv.**

Sinónimos: *Bromus brizoides* Lam., *Briza patula* Phil.,
Chascolytrum brizoides (Lam.) Essi, Longhi-Wagner &
Souza-Chies
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 10-350 m.
Países limítrofes: Argentina.

Catabrosa

***Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

***Catabrosa werdermannii* (Pilg.) Nicora & Rùgolo**

Sinónimos: *Phippsia werdermannii* Pilg., *Phippsia*
werdermannii Pilg. fma. *minor* Pilg., *Phippsia werdermannii*
Pilg. fma. *major* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1900-4700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Catapodium

***Catapodium rigidum* (L.) C.E. Hubb.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA,
MAG.

Cenchrus

***Cenchrus chilensis* (E. Desv.) Morrone**

Sinónimos: *Gymnotrix chilensis* E. Desv., *Pennisetum*
chilense (E. Desv.) B.D. Jacks. ex R.R. Fr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 430-3300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Cenchrus clandestinus* (Hochst. ex Chiov.) Morrone**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, IPA.

***Cenchrus echinatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, MAU, LRI, LLA, IPA.

***Cenchrus longisetus* M.C. Johnst.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME.

***Cenchrus myosuroides* Kunth**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ATA, MAU.

***Cenchrus spinifex* Cav.**

Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, MAU.
Rango altitudinal: 50-2700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Chascolytrum

***Chascolytrum koelerioides* (Trin.) Essi, Longhi-Wagner &
Souza-Chies**

Sinónimos: *Gymnachne koelerioides* (Trin.) Parodi,
Rhombolytrum berterioanum E. Desv., *Poa tenuiculmis*
Steud., *Gymnachne jaffuelii* Parodi, *Poa philippii* Steud.,
Poa koelerioides Trin.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 5-1300 m.

Chascolytrum rhomboideum (Link) L. Essi, Longhi-Wagner Souza Chies
Sinónimos: *Rhombolytrum rhomboideum* Link, *Poa tumidula* Steud., *Rhombolytrum quinquenervium* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 80-900 m.

Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv.
Sinónimos: *Briza subaristata* Lam., *Calotheca stricta* Hook. & Arn., *Briza stricta* (Hook. & Arn.) Steud., *Briza violascens* Steud., *Briza berteroniana* Steud., *Festuca commersonii* Spreng., nom. illeg. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Chloris

Chloris gayana Kunth
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Chloris radiata (L.) Sw.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP.

Chloris virgata Sw.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 50-840 m.

Chusquea

Chusquea argentina Parodi
Sinónimos: *Chusquea culeou* E. Desv. fma. *longiramea* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 440-440 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Coligüe, Colihue.

Chusquea ciliata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 400-400 m.

Chusquea culeou E. Desv.
Sinónimos: *Chusquea andina* Phil., *Chusquea breviglumis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2060 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Coligüe, colihue.

Chusquea cumingii Nees
Sinónimos: *Chusquea parvifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 5-1600 m.
Nombre vulgar: Coligüe, Colihue, quila, quila chica, colihue de la zona central.

Chusquea fernandeziana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 412-830 m.
Nombre vulgar: Colihue.

Chusquea macrostachya Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 70-885 m.
Nombre vulgar: Quila, itihue, taihuén.

Chusquea montana Phil. fma. *montana*
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 60-2280 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quila enana, tihuén.

Chusquea montana Phil. fma. *nigricans* (Phil.) Matthei
Sinónimos: *Chusquea nigricans* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA, AIS.
Nombre vulgar: Quila enana.

Chusquea quila Kunth
Sinónimos: *Nastus prolifer* Desv., *Chusquea quila* var. *laxiflora* E. Desv., *C. parvifolia* Phil., *C. parviflora* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 5-1600 m.
Nombre vulgar: Quila.

Chusquea uliginosa Phil.
Sinónimos: *Chusquea tenuiflora* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 5-1500 m.
Nombre vulgar: Quila chica, quila de los ñadis.

Chusquea valdiviensis E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 10-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Quila, quila del sur, quila vutre.

Coix

Coix lacryma-jobi L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

Cortaderia

Cortaderia araucana Stapf emend. Testoni & Villamil

Sinónimos: *Cortaderia araucana* Stapf, *Cortaderia araucana* Stapf var. *fuenzalidae* Acevedo, *Cortaderia araucana* Stapf var. *skottsbergii* Acevedo, *Cortaderia longicauda* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cola de zorro.

Cortaderia egmontiana (Roem. & Schult.) M. Lyle ex Connor

Sinónimos: *Arundo egmontiana* Roem. & Schult., *Calamagrostis patula* Steud., *Calamagrostis scirpiformis* Phil., *Cortaderia minima* Conert, *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack., *Cortaderia pilosa* (d'Urv.) Hack. var. *minima* (Conert) Nicora, *Poa phragmites* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 10-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cola de zorro.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil subsp. *jubata* (Lemoine) Testoni & Villamil

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cortadera.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil subsp. *selloana*

Sinónimos: *Arundo selloana* Schult. & Schult.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,

NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, IPA.

Rango altitudinal: 10-3550 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Cortadera.

Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

Cortaderia speciosa (Nees & Meyen) Stapf

Sinónimos: *Gynerium speciosum* Nees & Meyen, *Arundo quila* Mol., *Gynerium quila* (Mol.) Nees & Meyen, *Gynerium argenteum* Nees var. *parviflorum* E. Desv., *Gynerium argenteum* Nees var. *strictum* E. Desv., *Gynerium atacamense* Phil., *Cortaderia rudiuscula* Stapf, *Moorea speciosa* (Nees & Meyen) Stapf, *Cortaderia atacamensis* (Phil.) Pilg., *Cortaderia rudiuscula* Stapfma. emend. Acevedo

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA.

Rango altitudinal: 3450 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Espural, espuro.

Corynephorus

Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

Cymbopogon

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

Cynodon

Cynodon affinis Caro & E.A. Sánchez

Sinónimos: *Cynodon dactylon* (L.) Pers. var. *affinis* (Caro & E.A. Sánchez) Romero Zarco

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, IPA.

Nombre vulgar: Mati (Rapa Nui).

Cynodon nitidus Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Cynosurus

***Cynosurus cristatus* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, BIO, AIS, MAG.

***Cynosurus echinatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Dactylis

***Dactylis glomerata* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Danthonia

***Danthonia araucana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-930 m.

***Danthonia californica* Boland. var. *americana* (Scribn.)**

Hitchc.

Sinónimos: *Danthonia grandiflora* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 60-450 m.

***Danthonia chilensis* E. Desv. var. *aureofulva* (E. Desv.)**

C.M. Baeza

Sinónimos: *Danthonia aureofulva* E. Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-630 m.

Danthonia chilensis* E. Desv. var. *chilensis

Sinónimos: *Avena ariguensis* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 10-820 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Danthonia chilensis* E. Desv. var. *glabriflora* Nicora**

Sinónimos: *Danthonia calva* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 25-480 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Danthonia decumbens* (L.) DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

***Danthonia malacantha* (Steud.) Pilg.**

Sinónimos: *Trisetum malacanthum* Steud., *Danthonia collina* Phil., *Danthonia octoflora* Phil., *Danthonia oresigena* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 5-1700 m.

Deschampsia

***Deschampsia airiformis* (Steud.) Benth. & Hook.f.**

Sinónimos: *Trisetum airiforme* Steud., *Agrostis desvauxii* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, NUB, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 60-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia antarctica* E. Desv.**

Sinónimos: *Aira antarctica* Hook. fma. *hom. illeg.*, *Airidium elegantulum* Steud., *Deschampsia elegantula* (Steud.)

Parodi, *Deschampsia fueguina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, MAG.

Rango altitudinal: 10-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Deschampsia berteriana* (Kunth) Trin.**

Sinónimos: *Trisetum berterianum* Kunth, *Aira berteriana* (Kunth) Steudel, *Monandrya berteriana* (Kunth) E. Desv., *Deschampsia berteriana* (Kunth) fma. *Meigen*, *Deschampsia berteriana* (Kunth) Trin. var. *parvispicula* Parodi

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 10-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. var. *caespitosa

Sinónimos: *Aira caespitosa* L., *Deschampsia andina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-4200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Deschampsia caespitosa* (L.) P. Beauv. var. *pulchra* (Nees & Meyen) Nicora**

Sinónimos: *Deschampsia pulchra* Nees & Meyen, *Aira pulchra* (Nees & Meyen) Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1600-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia cordilleranum Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 3200-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia danthonioides (Trin.) Munro
Sinónimos: *Aira danthonioides* Trin.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, LBO.
Rango altitudinal: 40-700 m.

Deschampsia elongata (Hook.) Munro
Sinónimos: *Aira elongata* Hook., *Aira aciphylla* Franch.,
Aira aciphylla Franch. var. *pumila* Franch., *Deschampsia*
aciphylla (Franch.) Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia kingii (Hook.f.) E. Desv.
Sinónimos: *Aira kingii* Hook.f., *Deschampsia kingii*
(Hook.f.) Macloskie, *Aira elatior* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia laxa Phil.
Sinónimos: *Calamagrostis hirthii* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-485 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia looseriana Parodi var. *looseriana*
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 10-2475 m.

Deschampsia looseriana Parodi var. *triandra* Parodi
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 500-500 m.

Deschampsia micrantha Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: m.

Deschampsia monandra Parodi
Sinónimos: *Deschampsia glauca* (E. Desv.) Parodi, hom.
illeg., *Monandraira glauca* E. Desv.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, NUB, ARA.
Rango altitudinal: 45-3500 m.

Deschampsia parvula (Hook.f.) E. Desv.
Sinónimos: *Aira parvula* Hook.f., *Trisetum parvulum*
(Hook.f.) Speg., *Deschampsia parvula* (Hook.f.) Macloskie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 20-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia patula (Phil.) Pilg. ex Skottsbo.
Sinónimos: *Monandraira patula* Phil., *Deschampsia*
elegantula (Steud.) Parodi var. *patula* (Phil.) Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 10-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME.

Deschampsia venustula Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 900-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia

Deyeuxia breviaristata Wedd.
Sinónimos: *Deyeuxia variegata* Phil., *Calamagrostis*
variegata (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.
Rango altitudinal: 3700-4810 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pasto vicuña.

Deyeuxia brevifolia J. Presl var. *brevifolia*
Sinónimos: *Calamagrostis brevifolia* (J. Presl) Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia brevifolia J. Presl var. *expansa* Rúgolo & Villav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3200-3900 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Deyeuxia cabreræ (Parodi) Parodi var. *aristulata* Rúgolo & Villav.
Sinónimos: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var. *aristulata* (Rúgolo & Villav.) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3200-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Deyeuxia cabreræ (Parodi) Parodi var. *cabreræ*
Sinónimos: *Calamagrostis cabreræ* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3600-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia cabreræ (Parodi) Parodi var. *trichopoda* Parodi ex Rúgolo
Sinónimos: *Calamagrostis cabreræ* Parodi var. *trichopoda* (Rúgolo) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3700-4570 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Deyeuxia chrysantha J. Presl var. *chrysantha*
Sinónimos: *Calamagrostis nitida* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 3500-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Sora.

Deyeuxia chrysantha J. Presl var. *phalaroides* (Wedd.) Villav.
Sinónimos: *Deyeuxia phalaroides* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4100-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia chrysophylla Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3800-5300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Deyeuxia chrysostachya E. Desv.
Sinónimos: *Deyeuxia chrysostachya* E. Desv. var. *B* E. Desv., *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) Kuntze, *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) Hack., *Calamagrostis chrysostachya* (E. Desv.) V.N. Vassil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia crista Rúgolo & Villav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4400-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Paja viscachera.

Deyeuxia curvula Wedd.
Sinónimos: *Deyeuxia tenuifolia* Phil., *Calamagrostis tenuifolia* (Phil.) R.E. Fr., *Calamagrostis curvula* (Wedd.) Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2600-4900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pasto vicuña.

Deyeuxia deserticola Phil. var. *breviaristata* Rúgolo & Villav.
Sinónimos: *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil. var. *breviaristata* (Rúgolo & Villav.) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 4300-4950 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Deyeuxia deserticola Phil. var. *deserticola*
Sinónimos: *Calamagrostis deserticola* (Phil.) Phil., *Agrostis canescens* Griseb., *Deyeuxia trisetoides* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2800-4900 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Deyeuxia diemii Rúgolo
Sinónimos: *Calamagrostis diemii* (Rúgolo) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1250-1950 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia eminens J. Presl var. *discreta* Rúgolo & Villav.
Sinónimos: *Deyeuxia leiopoda* Wedd. var. *discreta* Wedd., *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud. var. *discreta*

(Rúgolo & Villav.) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3680-4000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Deyeuxia eminens J. Presl var. ***eminens***

Sinónimos: *Calamagrostis eminens* (J. Presl) Steud.,
Deyeuxia robusta Phil., *Agrostis eminens* (J. Presl) Griseb.,
Deyeuxia elegans Wedd., *Deyeuxia polystachya* Wedd.,
Deyeuxia arundinacea Phil., *Calamagrostis robusta* (Phil.)
Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3000-4730 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pasto huaila, huaya, chillagua, chillagua
blanda, iru, guaia, sora-sora.

Deyeuxia eminens J. Presl var. ***fulva*** (Griseb.) Rúgolo
Sinónimos: *Deyeuxia laxiflora* Phil., *Calamagrostis
eminens* (J. Presl) Steud. var. *fulva* (Griseb.) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 3200-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pasto de vega, cebadilla de vicuña.

Deyeuxia erythrostachya E. Desv. var. ***erythrostachya***
Sinónimos: *Aira gayana* Steud., *Calamagrostis
erythrostachya* (E. Desv.) Hack., *Stylagrostis
erythrostachya* (E. Desv.) Mez, *Calamagrostis stipitata*
Hitc., *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 550-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia erythrostachya E. Desv. var. ***neuquenensis***
Rúgolo
Sinónimos: *Calamagrostis gayana* (Steud.) Soreng var.
neuquenensis (Rúgolo) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB.
Rango altitudinal: 2200-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia filifolia Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia hackelii (Lillo) Parodi
Sinónimos: *Calamagrostis hackelii* Lillo
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3900-5000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Deyeuxia heterophylla Wedd.
Sinónimos: *Calamagrostis heterophylla* (Wedd.) Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3520-4150 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Cebadilla.

Deyeuxia patagonica Speg.
Sinónimos: *Calamagrostis patagonica* (Speg.) Macloskie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia poaeoides (Steud.) Rúgolo
Sinónimos: *Calamagrostis poaeoides* (Steud.) Hack.,
Calamagrostis fuegiana Speg., *Calamagrostis magellanica*
Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia rigescens (J. Presl) Túrpe
Sinónimos: *Agrostis rigescens* J. Presl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 3500-4340 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia rigida Kunth
Sinónimos: *Calamagrostis gusindei* Pilg. ex Skottsbo.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 15-4680 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia spicigera J. Presl var. ***cephalotes*** (Wedd.) Rúgolo
& Villav.
Sinónimos: *Deyeuxia cephalotes* Wedd., *Calamagrostis
spicigera* (J. Presl) Steud. var. *cephalotes* (Wedd.) Soreng
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3750-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia spicigera J. Presl var. ***spicigera***

Sinónimos: *Calamagrostis spicigera* (J. Presl.) Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3600-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia suka (Speg.) Parodi

Sinónimos: *Calamagrostis suka* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 5-785 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia velutina Nees & Meyen var. ***nardifolia*** (Griseb.)

Rúgolo

Sinónimos: *Agrostis nardifolia* Griseb., *Deyeuxia nardifolia*

(Griseb.) Phil., *Calamagrostis nardifolia* (Griseb.) Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3800-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia velutina Nees & Meyen var. ***velutina***

Sinónimos: *Calamagrostis velutina* (Nees & Meyen) Steud.,

Deyeuxia chilensis E. Desv., *Deyeuxia agrostidea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LLA.

Rango altitudinal: 2300-4200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia vicunarum Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-4860 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia viridiflavescens (Poir.) Kunth var. ***montevidensis***

(Nees) Cabrera & Rúgolo

Sinónimos: *Calamagrostis montevidensis* Nees

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI.

Rango altitudinal: 5-2300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Deyeuxia viridiflavescens (Poir.) Kunth var. ***viridiflavescens***

Sinónimos: *Arundo viridiflavescens* Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI.

Rango altitudinal: 10-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Deyeuxia viridis Phil.

Sinónimos: *Calamagrostis nemoralis* Phil., *Calamagrostis*

nemoralis Phil. ex Kuntze, *Deyeuxia nemoralis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-820 m.

Países limítrofes: Argentina.

Dichanthelium

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & Clark var.

polycladum (E. Ekman) Zuloaga

Sinónimos: *Panicum polycladum* E. Ekman, *Panicum*

pencanum Phil., *Panicum sabulorum* var. *polycladum* (E.

Ekman) Palacios ex Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 10-10 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & Clark var.

sabulorum

Sinónimos: *Panicum sabulorum* Lam., *Panicum acutatum*

Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 10-1460 m.

Países limítrofes: Argentina.

Dichelachne

Dichelachne crinita (L.f.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Dichelachne micrantha (Cav.) Domin

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Dielsiochloa

Dielsiochloa floribunda (Pilg.) Pilg.

Sinónimos: *Trisetum floribundum* Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4240-5250 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Digitaria

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: IPA.
Países limítrofes: Argentina.

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, LLA.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Digitaria setigera Roth ex Roemer et Schultes
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Digitaria violascens Link
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, IPA.

Diplachne

Diplachne fusca (L.) Kunth subsp. *uninervia* (J. Presl) P.M.
Peterson & N. Snow
Sinónimos: *Megastachya uninervia* J. Presl, *Poa uninervia*
(J. Presl) Kunth, *Diplachne verticillata* Nees & Meyen,
Uralapis verticillata (Nees & Meyen) Steud, *Eragrostis*
uninervia (J. Presl) Steud., *Brizopyrum uninervium* (J.
Presl) E. Fourn., *Diplachne tarapacana* Phil., *Leptochloa*
uninervia (J. Presl.) Hitchc. & Chase, *Diplachne uninervia*
(J. Presl.) Parodi, *Diplachne fusca* var. *uninervia* (J. Presl.)
P.M. Peterson & N. Snow., *Leptochloa fusca* (L.) Kunth
subsp. *uninervia* (J. Presl.) N.W. Snow
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 20-1300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Distichlis

Distichlis humilis Phil.
Sinónimos: *Distichlis misera* Phil., *Distichlis spicata* (L.)
Greene var. *humilis* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2310-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Distichlis scoparia (Nees ex Kunth) Arechav.
Sinónimos: *Poa scoparia* Nees ex Kunth, *Uniola scoparia*
(Nees ex Kunth) Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,
BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Distichlis spicata (L.) Greene
Sinónimos: *Distichlis maritima* Rafma., *Distichlis*
deserticola Phil., *Distichlis hirsuta* Phil., *Distichlis*
mendocina Phil., *Distichlis hirta* Phil., *Distichlis spicata* var.
andina Beetle, *Distichlis spicata* var. *stricta* (Torr.) Scribn.,
Uniola stricta Torr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,
MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 5-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Echinochloa

Echinochloa colona (L.) Link
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, JFE.

Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. var. *crusgalli*
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI.

Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. var. *mitis* (Pursh)
Petersen.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA.

Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv. var. *zelayensis* (Kunt)
Hitchc.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU.

Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, MAU, NUB,
BIO, ARA.

Ehrharta

Ehrharta longiflora Sm.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 50-100 m.

Ehrharta stipoides Labill.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Eleusine

Eleusine indica (L.) Gaertn.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, MAU, BIO, ARA,
LRI, LLA, JFE.

Elymus

Elymus angulatus J. Presl
Sinónimos: *Elymus agropyroides* J. Presl, *Elymus andinus* Poepp. ex Trin., *Elymus antarcticus* Hook.f. var. *fulvescens* Kurtz, *Elymus valdiviae* Steud., *Elymus asper* Nees ex Steud., *Elymus chonoticus* Phil., *Elymus corralensis* Phil., *Elymus gayanus* E. Desv., *Elymus gracilis* Phil., *Elymus latiglumis* Phil., *Elymus muticus* Phil., *Elymus oreophilus* Phil., *Elymus palenae* Phil., *Elymus paposanus* Phil., *Elymus pratensis* Phil., *Elymus rigescens* Poepp. ex Trin., *Elymus uniflorus* Phil., *Elymus vaginatus* Phil., *Hordeum valdiviae* (Steud.) Schenck
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,
NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-2800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Elymus magellanicus (E. Desv.) A. Löve
Sinónimos: *Triticum repens* L. var. *magellanicum* E. Desv., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg., *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack., *Triticum pubiflorum* Steud., *Triticum magellanicum* (E. Desv.) Speg. var. *pubiflorum* (Steud.) Speg., *Agropyron pubiflorum* (Steud.) P. Candargy, *Agropyron magellanicum* (E. Desv.) Hack. var. *pubiflorum* (Steud.) Hauman & Vanderv., *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi, *Elytrigia pubiflora* (Steud.) Tzvelev, *Elymus glaucescens* Seberg, *Agropyron antarcticum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *brachyatherum* Parodi, *Agropyron fuegianum* (Speg.) Kurtz var. *polystachyum* Parodi, *Agropyron pubiflorum* (Steud.) Parodi var. *fragile* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Elymus patagonicus Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Países limítrofes: Argentina.

Elymus repens (L.) Gould
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, ARA, LLA, MAG.

Elymus scabriglumis (Hack.) A. Löve
Sinónimos: *Agropyron repens* P. Beauv. var. *scabriglume* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Elytrigia

Elytrigia repens (L.) Nevski
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, ARA, LRI, MAG.

Enneapogon

Enneapogon desvauxii P. Beauv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-2580 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eragrostis

Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Eragrostis attenuata Hitchc.
Sinónimos: *Sporobolus scaber* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 610-610 m.
Países limítrofes: Perú.

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: BIO, MAG.

Eragrostis kuschelii Skottsbo.
Sinónimos: *Eragrostis peruviana* var. *macranthera* Skottsbo.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 5-100 m.

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. ***virescens*** (J. Presl) S.D. Koch & Sánchez Vega
Sinónimos: *Eragrostis virescens* J. Presl, *Poa virescens* (Presl) Kunth, *Eragrostis chilensis* (Moris) Nees, *Poa*

chilensis Moris, *Eragrostis scabra* Phil., *Eragrostis rahmeri* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 20-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. var. ***nigricans***

Sinónimos: *Poa nigricans* Kunth, *Eragrostis subatra* Jedwabn., *Eragrostis tristis* Jebwabn., *Eragrostis nigricans* Jebwabn. var. *tristis*

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2600-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. var. ***punensis*** Nicora

Sinónimos: *Eragrostis mexicana* (Hornem.) Link subsp. *mexicana*

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, ANT, VAL.

Rango altitudinal: 2950-3800 m.

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.

Sinónimos: *Eragrostis deserticola* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, IDE.

Rango altitudinal: 500-3460 m.

Países limítrofes: Perú.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, MAU, MAG.

Eragrostis polytricha Nees

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Eragrostis pycnantha (Phil.) Nicora

Sinónimos: *Poa pycnantha* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 140-140 m.

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

Eragrostis weberbaueri Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2100-3700 m.

Países limítrofes: Perú.

Eremium

Eremium erianthum (Phil.) Seberg & Linde-Laursen

Sinónimos: *Elymus erianthus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1800-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Eriochloa

Eriochloa montevidensis Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 50-840 m.

Países limítrofes: Argentina.

Festuca

Festuca acanthophylla E. Desv. var. ***acanthophylla***

Sinónimos: *Festuca tunicata* E. Desv., *Festuca coiron* Steud., *Festuca berteroniana* Steud., *Festuca robusta* Phil., *Festuca thermarum* Phil., *Festuca desvauxii* Phil., *Festuca acuta* Phil., *Festuca desvauxii* Phil. var. *ampla* St.-Yves, *Festuca barrazae* Muñoz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: (50)900-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Festuca acanthophylla E. Desv. var. ***scabriuscula*** (Phil.)

J.C. Ospina, Aliscioni & S. Denham

Sinónimos: *Festuca scabriuscula* Phil., *Festuca robusta* Phil. var. *scabriuscula* (Phil.) St.-Yves, *Festuca asperata* Phil., *Festuca pascua* Phil., *Festuca steudelii* Phil., *Festuca morenensis* Matthei

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, RME, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 700-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Festuca argentina (Speg.) Parodi

Sinónimos: *Poa argentina* Speg., *Festuca cavallieri* St.-Yves

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 50-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Festuca arundinacea Schreb.

Sinónimos: *Festuca orthophylla* Pilg.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,
MAU, NUB, BIO, LLA, JFE.

Festuca chrysophylla Phil.

Sinónimos: *Festuca deserticola* Phil. var. *chrysophylla*
(Phil.) St.-Yves, *Festuca deserticola* Phil. var. *juncea* St.-
Yves, *Festuca juncea* Phil., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4860 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Festuca cirrosa (Speg.) Parodi

Sinónimos: *Festuca erecta* d'Urv. var. *cirrosa* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 5-175 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca contracta Kirk

Sinónimos: *Festuca erecta* d'Urv., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 200-1050 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca gracillima Hook.f. var. *glacialis* Rúgolo & Nicora

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 5-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca gracillima Hook.f. var. *gracillima*

Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *brevifolia* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca hypsophylla Phil.

Sinónimos: *Festuca deserticola* Phil. var. *hypsophylla*
(Phil.) St.-Yves
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3200-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Festuca juncifolia St.-Amans

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Festuca kurtziana St.-Yves

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1630-2740 m.

Países limítrofes: Argentina.

Festuca magellanica Lam.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, LLA,
AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca monticola Phil.

Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *monticola* (Phil.)
St.-Yves, *Festuca subandina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 5-1550 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca ovina L. subsp. *tenuifolia* (Sibth.) Celak.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi

Sinónimos: *Festuca gracillima* Hook. var. *pallescens* St.-
Yves
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 15-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Festuca panda Sw.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, COQ.
Rango altitudinal: 2900-3400 m.

Festuca purpurascens Banks & Sol. ex Hook.f.

Sinónimos: *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook.
var. *submutica* E. Desv., *Festuca purpurascens* Banks
& Sol. ex Hook. var. *aristata* E. Desv., *Festuca insularis*
Steud., *Festuca lechleriana* Steud., *Festuca platyphylla*
Steud., *Festuca purpurascens* Banks & Sol. ex Hook.
var. *platyphylla* (Steud.) St.-Yves, *Festuca laxiflora* Phil.,
hom. illeg., *Festuca dumetorum* Phil., hom. illeg., *Festuca*
trachylepis Hack. ex Druce, *Festuca philippii* Becherer,
nom. illeg., *Festuca davilae* Phil., *Festuca glaucophylla*
Phil., *Festuca serranoi* Phil., *Festuca purpurascens*
Banks & Sol. ex Hook.f. fma. *aristata* St.-Yves, *Festuca*
purpurascens Banks & Sol. ex Hook.f. fma. *scabriuscula*
St.-Yves
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca pyrogea* Speg.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca rigescens* (J. Presl) Kunth**

Sinónimos: *Diplachne rigescens* Presl, *Festuca deserticola* Phil., *Festuca paupera* Phil., *Festuca deserticola* Phil. var. *paupera* (Phil.) St.-Yves
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 2500-4800 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca rubra* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

***Festuca subantarctica* Parodi**

Sinónimos: *Festuca commersonii* Franch., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 5-175 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Festuca werdermannii* St.-Yves**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2800-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gastridium

***Gastridium phleoides* (Nees & Meyen) C.E. Hubb.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

***Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz & Thell.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA, JFE.

Glyceria

***Glyceria fluitans* (L.) R. Br.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, MAG.

***Glyceria multiflora* Steud.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-760 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Gynerium

***Gynerium sagittatum* (Aubl.) P. Beauv.**

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR.

Hainardia

***Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, NUB, BIO.

Helictotrichon

***Helictotrichon bulbosum* (Hitchc.) Parodi**

Sinónimos: *Trisetum bulbosum* Hitchc.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Países limítrofes: Argentina.

Holcus

***Holcus lanatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Hordeum

***Hordeum brachyatherum* Phil.**

Sinónimos: *Critesion brachyatherum* (Phil.) A. Löve
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 2-50 m.

***Hordeum chilense* Roem. & Schult.**

Sinónimos: *Critesion chilense* (Roem. & Schult.) A. Löve, *Hordeum chilense* Brongn., nom. illeg., *Hordeum secalinum* Schreb. var. *chilense* (Brongn.) E. Desv., *Hordeum pratense* Huds. var. *chilense* (Brongn.) Macloskie, *Hordeum pratense* Huds. var. *brongniartii* Macloskie, *Hordeum cylindricum* Steud., *Hordeum depauperatum* Steud., *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *pseudosecalinum* Hauman, *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *pilosum* Nevski
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 5-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Hordeum comosum J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-4300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hordeum fuegianum Bothmer, N. Jacobsen & R.R. Jorg.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 10-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hordeum hystrix Roth

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB.

Hordeum jubatum L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Hordeum lechleri (Steud.) Schenck

Sinónimos: *Critesion lechleri* (Steud.) A. Löve, *Elymus lechleri* Steud
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hordeum marinum Huds. subsp. ***gussoneanum*** (Parl.)

Thell.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Hordeum marinum Huds. subsp. ***marinum***

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Hordeum murinum L. subsp. ***leporinum*** (Link.) Arcang.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, BIO.

Hordeum murinum L. subsp. ***murinum***

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Hordeum muticum J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, RME, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 460-4040 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Hordeum parodii Covas

Sinónimos: *Critesion parodii* (Covas) A. Löve
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp.

magellanicum (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Sinónimos: *Hordeum chilense* Roem. & Schult. var. *magellanicum* Parodi & Nicora, *Critesion magellanicum* (Parodi & Nicora) A. Löve
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 150-700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hordeum patagonicum (Hauman) Covas subsp.

santacrucense (Parodi & Nicora) Bothmer, Giles & N. Jacobsen
Sinónimos: *Hordeum santacrucense* (Parodi & Nicora), *Critesion santacrucense* (Parodi & Nicora) A. Löve
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: m.
Países limítrofes: Argentina.

Hordeum pubiflorum Hook.f. subsp. ***halophilum*** (Griseb.)

Baden & Bothmer
Sinónimos: *Hordeum halophilum* Griseb., *Hordeum jubatum* L. fma. *versicolor* Kuntze, *Hordeum jubatum* L. fma. *violaceum* Kuntze, *Hordeum jubatum* fma. *viride* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO, BIO, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 20-4170 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hordeum pubiflorum Hook.f. subsp. ***pubiflorum***

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, BIO, MAG.
Rango altitudinal: 15-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hordeum vulgare L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, RME, BIO, ARA.

Imperata

Imperata brasiliensis Trin.

Sinónimos: *Imperata arundinacea* Cirillo var. *americana*

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Paja colorada.

Imperata condensata Steud.
Sinónimos: *Imperata arundinacea* Cirillo var. *condensata* (Steud.) Hack., *Imperata cylindrica* (L.) Raeusch. var. *condensata* (Steud.) Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-2233 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: maicillo.

Imperata parodii Acevedo
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.

Jarava

Jarava annua (Mez) Peñail.
Sinónimos: *Stipa annua* Mez
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 100-3700 m.
Países limítrofes: Perú.

Jarava ichu Ruiz & Pav. var. *pungens* (Nees & Meyen) Ciald.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4040-4040 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Jarava leptostachya (Griseb.) F. Rojas
Sinónimos: *Stipa leptostachya* Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3300-4040 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Paja amarilla.

Jarava neaei (Nees ex Steud.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa neaei* Nees ex Steud., *Stipa bella* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, MAU, AIS.
Rango altitudinal: 1000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L. Jacobs & Everett
Sinónimos: *Calamagrostis plumosa* Spreng., *Stipa tenuiflora* Phil., *Stipa papposa* Nees, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 5-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava plumosula (Nees ex Steud.) F. Rojas
Sinónimos: *Stipa plumosula* Nees ex Steud., *Stipa plumosa* Trin.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 10-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Jarava pogonathera (E. Desv.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa pogonathera* E. Desv., *Stipa buchtienii* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 720-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava psylantha (Speg.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa psylantha* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 150-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava pungionata (Caro & E.A. Sánchez) Matthei
Sinónimos: *Stipa pungionata* Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3725-4150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava scabrifolia (Torres) Peñail.
Sinónimos: *Stipa scabrifolia* Torres, *Jarava mattheii* F. Rojas
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Jarava subaristata (Matthei) Matthei
Sinónimos: *Stipa leptostachya* Griseb. var. *subaristata* Matthei, *Stipa subaristata* (Matthei) Caro & E.A. Sánchez
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 1870-4040 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jarava tortuosa (E. Desv.) Peñail.
Sinónimos: *Stipa tortuosa* E. Desv.
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 10-900 m.

Koeleria

Koeleria fueguina Calderón ex Nicora
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 400-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Koeleria kurtzii Hack. emend. A.M. Molina
Sinónimos: *Trisetum subaristatum* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, RME, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 3400-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Lachnagrostis

Lachnagrostis filiformis (G. Forst.) Trin.
Sinónimos: *Agrostis avenacea* J.F. Gmel.
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, LLA, IPA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tuere heu (Rapa Nui).
Nota: Introducida en el continente: regiones de Valparaíso, Maule y Los Lagos.

Lagurus

Lagurus ovatus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

Lamarckia

Lamarckia aurea (L.) Moench
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Leptophyllochloa

Leptophyllochloa micrathera (E. Desv.) C.E. Calderón ex Nicora
Sinónimos: *Trisetum micratherum* E. Desv., *Koeleria micrathera* (E. Desv.) Griseb., *Koeleria philippiana* E. Desv., *Trisetum depauperatum* Phil., *Trisetum brachyatherum* Phil., *Trisetum laxiflorum* Phil., *Trisetum laxum* Phil., *Trisetum nemorosum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 25-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Lepturus

Lepturus repens (G. Forst.) R. Br.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Leymus

Leymus arenarius (L.) Hochst.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, MAG.

Lolium

Lolium multiflorum Lam.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Lolium perenne L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Lolium rigidum Gaudin

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LRI, MAG.

Lolium temulentum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA.

Megalachne

Megalachne berteroniana Steud.

Sinónimos: *Bromus megalachne* Pilg., *Pantathera fernandeziana* Phil., *Bromus fernandezianus* Phil., *Pantathera avenacea* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 180-670 m.

Megalachne masafuerana (Skotts. & Pilg.) Matthei

Sinónimos: *Bromus masafueranus* Skotts. & Pilg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 320-1100 m.

Megalachne robinsoniana C. Peña

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-400 m.

Megathyrsus

Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L.

Jacobs var. *pubiglumis* (K. Schum.) B. K. Simon & S. W.

L. Jacobs

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Melica

Melica argentata E. Desv.

Sinónimos: *Melica glabra* Steud., *Melica ampla* Phil.,

Melica nitida Phil., *Melica tortuosa* Phil., *Melica argentata*

var. *breviglumis* Papp, *Melica violacea* var. *argentata* Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 15-2200 m.

Melica commersonii Nees ex Steud.

Sinónimos: *Melica commutata* Steud., *Melica violacea*

Cav. var. *pallida* E. Desv., *Melica violacea* Cav. var.

commersonii (Nees ex Steud.) Papp, *Melica violacea* Cav.

var. *commutata* (Steud.) Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 15-1900 m.

Melica longiflora Steud.

Sinónimos: *Melica flava* Nees ex Steud., *Melica*

laxiflora E. Desv., *Melica laxiflora* E. Desv. var. *hirsuta*

E. Desv., *Melica hirta* Phil., *Melica exaltata* Phil., *Melica*

berteroana Phil., *Melica berteroana* fma. *violacea* Papp,

Melica berteroana Phil. var. *exaltata* (Phil.) Papp, *Melica*

berteroana Phil. var. *pilosula* Papp, *Melica flava* Nees ex

Steud. var. *violacea* Papp, *Melica laxiflora* E. Desv. var.

glabra Papp, *Melica laxiflora* E. Desv. var. *hirta* Papp,

Melica laxiflora E. Desv. var. *pilosula* Papp, *Melica*

laxiflora fma. *hirta* (Phil.) Hempel

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 20-1300 m.

Melica mollis Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 340 m.

Melica paulsenii Phil.

Sinónimos: *Melica littoralis* Phil. var. *paulsenii* (Phil.)

Papp, *Melica littoralis* Phil. var. *werdermannii* Papp

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 50-700 m.

Melica poecilantha E. Desv.

Sinónimos: *Melica poecilantha* E. Desv. var. *umbrosa* E.

Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

Melica violacea Cav.

Sinónimos: *Melica alata* Nees ex Steud., *Melica filiculmis*

E. Desv., *Melica valdiviana* Phil., *Melica alata* Nees ex

Steud. var. *filiculmis* (E. Desv.) Papp, *Melica alata* Nees ex

Steud. var. *mollis* Papp, *Melica violacea* Cav. fma. *mollis*

(Papp) Hempel

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-2000 m.

Melinis

Melinis minutiflora P. Beauv.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Melinis repens (Willd.) Zizka

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Microchloa

Microchloa indica (L. f.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP.

Microchloa kunthii Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3220-3220 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Miscanthus

Miscanthus sinensis Andersson

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU.

Muhlenbergia

Muhlenbergia asperifolia (Nees & Meyen ex Trin.) Parodi
Sinónimos: *Vilfa asperifolia* Nees & Meyen ex Trin.,
Sporobolus copiapius Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 100-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Muhlenbergia fastigiata (J. Presl) Henrard

Sinónimos: *Sporobolus fastigiatus* J. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3300-4300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Muhlenbergia peruviana (P. Beauv.) Steud.

Sinónimos: *Clomena peruviana* P. Beauv.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, MAU.

Rango altitudinal: 2250-4040 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Munroa

Munroa andina Phil.

Sinónimos: *Hemimunroa andina* (Phil.) Parodi, *Munroa multiflora* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2700-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Munroa argentina Griseb.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2820-3800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Munroa decumbens Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, ANT.

Rango altitudinal: 2850-3660 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nassella

Nassella arcuata (R.E. Fr.) Torres

Sinónimos: *Stipa arcuata* R.E. Fr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 400-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nassella asplundii Hitchc.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3600-4000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nassella barbinodis (Phil.) Muñoz-Schick, Ciald. & Morrone

Sinónimos: *Stipa barbinodis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 60-280 m.

Nassella caespitosa Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4120-4120 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nassella chilensis (Trin.) E. Desv. var. *chilensis*

Sinónimos: *Urachne chilensis* Trin., *Piptatherum ligleyanum* Nees, *Urachne major* Trin. & Rupr., *Nassella major* (Trin. & Rupr.) E. Desv., *Nassella ramosa* E. Desv., *Nassella sadae* Phil., *Nassella landbeckii* Phil., *Nassella landbackii* Phil. var. *eremophila* Phil., *Nassella laxiflora* Phil., *Nassella planifolia* Phil., *Nassella floribunda* Phil., *Nassella obscura* fma. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2700-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón, Coironcillo, Nudillo.

Nassella chilensis (Trin.) E. Desv. var. *juncea* (Phil.)

Muñoz-Schick

Sinónimos: *Nassella juncea* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 20-925 m.

Nassella coquimbensis (Matthei) Peñail.

Sinónimos: *Stipa coquimbensis* Matthei

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 60-350 m.

Nassella duriuscula (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa duriuscula* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 15-1000 m.

Nassella elata (Speg.) Torres

Sinónimos: *Stipa caespitosa* (Griseb.) Speg. var. *elata* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nassella filiculmis (Delile) Barkworth

Sinónimos: *Stipa filiculmis* Delile, *Stipa leucogluma* Steud.,

Stipa trichocaulos Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nassella gibba (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Piptochaetium gibbum* Phil., *Nassella exserta*

Phil. var. *asperata* Parodi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 15-1000 m.

Nassella gigantea (Steud.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Urachne gigantea* Steud., *Nassella exserta*

Phil., *Nassella fuscescens* Phil., *Nassella melanocarpa* Phil.,

Nassella pugae Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 5-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nassella hirtifolia (Hitche.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa hirtifolia* Hitche.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 20-1650 m.

Nassella lachnophylla (Trin.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa lachnophylla* Trin., *Stipa cumingiana* var.

lachnophylla (Trin.) Trin. & Rupr., *Stipa cumingiana* Trin.,

Stipa laxa E. Desv., *Stipa leiocarpa* Nees ex Steud., *Stipa*

hirta Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Nassella laevissima (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Piptochaetium laevissimum* Phil., *Stipa*

laevissima (Phil.) Speg., *Nassella longearistata* Phil.,

Piptochaetium collinum Phil., *Stipa breviculmis* Hitche.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 5-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Nassella longiglumis (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa longiglumis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 60-700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nassella macrathera (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa macrathera* Phil., *Stipa fernandeziana*

Phil., hom. illeg. non Steud. 1854, *Stipa rudolphii* Speg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,

JFE.

Rango altitudinal: 2-2000 m.

Nassella manicata (E. Desv.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa manicata* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-2800 m.

Nassella meyeniana (Trin. & Rupr.) Parodi

Sinónimos: *Urachne meyeniana* Trin. & Rupr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nassella nardoides (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Danthonia nardoides* Phil., *Stipa nardoides*

(Phil.) Hack. ex Hitche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3000-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa neesiana* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana*

Trin. & Rupr. var. *chilensis* Trin. & Rupr., *Stipa neesiana*

Trin. & Rupr. var. *fernandeziana* Trin. & Rupr., *Stipa*

fernandeziana (Trin. & Rupr.) Steud., *Stipa longiflora*

Steud., *Stipa trachysperma* Phil., *Stipa contracta* Phil., *Stipa*

hispida Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 5-1100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: flechilla.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Nassella parodii (Matthei) Barkworth

Sinónimos: *Stipa parodii* Matthei
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 5-370 m.

Nassella pfisteri (Matthei) Barkworth

Sinónimos: *Stipa pfisteri* Matthei
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 60-350 m.

Nassella philippii (Steud.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa philippii* Steud., *Stipa lenta* Hitchc.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 65-450 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassella poeppigiana (Trin. & Rupr.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa poeppigiana* Trin. & Rupr., *Stipa amethystina* Steud., *Nassella amethystina* (Steud.) Barkworth, *Stipa pratensis* Phil., *Stipa collina* Phil., *Stipa curicoana* Phil., *Stipa julietii* Phil., *Stipa montana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quilmén, fechilla.

Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E. Desv.

Sinónimos: *Urachne pubiflora* Trin. & Rupr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2950-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Taj-taja.

Nassella pungens E. Desv.

Sinónimos: *Nassella humilis* Phil., *Nassella johnstonii* Parodi
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 5-1000 m.

Nassella rupestris (Phil.) Torres

Sinónimos: *Stipa rupestris* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nassella tenuis (Phil.) Barkworth

Sinónimos: *Stipa tenuis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.

Nicoraepoa

Nicoraepoa andina (Trin.) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Poa andina* Trin., *Deschampsia latifolia* Phil., *Poa aristata* Phil., *Poa acrochaeta* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 935-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicoraepoa chonotica (Phil.) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Poa chonotica* Phil., *Poa latifolia* Phil., *Poa robusta* Phil., *Poa borchersii* Phil., *Poa chubutensis* Speg., *Poa berningeri* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicoraepoa pugionifolia (Speg.) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Poa pugionifolia* Speg., *Poa acutissima* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 600-850 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicoraepoa robusta (Steud.) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Poa robusta* Steud., *Festuca arenaria* Lam., *Poa arenicola* St.-Ives
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-95 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicoraepoa subenervis (Hack.) Soreng & L.J. Gillespie

subsp. ***spgazziniana*** (Nicora) Soreng & L.J. Gillespie
Sinónimos: *Poa spgazziniana* Parodi, *Poa subenervis* Hack. var. *spgazziniana* Nicora
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 2390-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicoraepoa subenervis (Hack.) Soreng & L.J. Gillespie

subsp. ***subenervis***
Sinónimos: *Poa subenervis* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAG.
Rango altitudinal: 720-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ortachne

Ortachne breviseta Hitchc.

Sinónimos: *Stipa breviseta* (Hitchc.) Martic. & Quezada, nom. illeg., *Stipa yatesensis* Martic. & Quezada

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1200-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ortachne rariflora (Hook.f.) Hughes

Sinónimos: *Muhlenbergia rariflora* Hook.f., *Ortachne retorta* Nees ex Steud., *Stipa rariflora* (Hook.f.) Benth., *Stipa retorta* (Nees ex Steud.) Mez

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oryza

Oryza sativa L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Panicum

Panicum capillare L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Panicum dichotomiflorum Michx.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Panicum miliaceum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: NUB, BIO.

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

Sinónimos: *Monachne racemosa* P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI.

Países limítrofes: Argentina.

Panicum urvilleanum Kunth

Sinónimos: *Monachne urvilleana* (Kunth) Herter, *Panicum reversipilum* Steud., *Panicum urvillianum* Brongn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-140 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pappostipa

Pappostipa atacamensis (Parodi) Romasch.

Sinónimos: *Stipa atacamensis* Parodi, *Jarava atacamensis* (Parodi) Peñail.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 1900-4380 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pappostipa chrysophylla (E. Desv.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa chrysophylla* E. Desv., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *major* E. Desv., *Stipa humilis* Cav. fma. *chrysophylla* (E. Desv.) Kuntze, *Stipa speciosa* Trin. & Rupr. subsp. *chrysophylla* (E. Desv.) Dusén, *Jarava chrysophylla* (E. Desv.) Peñail., *Stipa chrysophylla* E. Desv. var. *minor* E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 470-4290 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pappostipa frigida (Phil.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa frigida* Phil., *Jarava frigida* (Phil.) F. Rojas

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 50-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: pasto vicuña.

Pappostipa humilis (Cav.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa humilis* Cav., *Jarava humilis* (Cav.) Peñail.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 15-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón, coirón amargo.

Pappostipa ibarii (Phil.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa ibarii* Phil., *Jarava ibarii* (Phil.) Peñail.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coirón enano.

Pappostipa nana (Speg.) Romasch.

Sinónimos: *Stipa nana* Speg., *Jarava nana* (Speg.) Peñail.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 400-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pappostipa speciosa (Trin. & Rupr.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa speciosa* Trin. & Rupr., *Stipa humilis* Cav. var. *speciosa* (Trin. & Rupr.) Kuntze, *Achnatherum speciosum* (Trin. & Rupr.) Barkworth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-4120 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pajonal.

Pappostipa vaginata (Phil.) Romasch.
Sinónimos: *Stipa vaginata* Phil., *Jarava vaginata* (Phil.) F. Rojas
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1100-4300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Parapholis

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO.

Parapholis strigosa (Dumort.) C.E. Hubb.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, ARA, LLA.

Paspalum

Paspalum chilense Catanzaro & G.H. Rua
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI.

Paspalum conjugatum P. J. Berg.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Paspalum dasypleurum Kuntze ex E. Desv.
Sinónimos: *Paspalum cumingii* Nees ex Steud., *Paspalum pachyrrhizum* Steud., *Paspalum paradisiacum* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 5-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chépica.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Paspalum dilatatum Poir. ex Lam.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.

Rango altitudinal: 30-1000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Chépica gigante.
Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

Paspalum distichum L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Paspalum forsterianum Flügge
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Herike hare (Rapa Nui).

Paspalum minus E. Fourn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI.
Rango altitudinal: 160-220 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Paspalum notatum Flügge var. *saurae* Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Paspalum orbiculare G. Forst.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 25-100 m.

Paspalum plicatum Michx.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1000-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Paspalum urvillei Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 10-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Paspalum vaginatum Sw.
Sinónimos: *Paspalum gayanum* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 20-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chépica.

Phalaris

Phalaris amethystina Trin.

Sinónimos: *Phalaris berteroniana* Steud., *Phalaris robinsoniana* Nees ex Steud., *Phalaris colchaguensis* Phil., *Phalaridanta robinsoniana* (Steud.) St.-Lég.

Hierba. Añual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 40-1000 m.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Phalaris angusta Nees ex Trin.

Sinónimos: *Phalaris chilensis* J. Presl.

Hierba. Añual. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 10-175 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Phalaris aquatica L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Phalaris arundinacea L.

Hierba. Añual. Introducida.

Distribución: LLA, MAG.

Phalaris canariensis L.

Hierba. Añual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

Phalaris caroliniana Walter

Hierba. Añual. Introducida.

Distribución: VAL.

Phalaris coerulescens Desf.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

Phalaris minor Retz.

Hierba. Añual. Introducida.

Distribución: COQ, BIO.

Phalaris paradoxa L.

Hierba. Añual. Introducida.

Distribución: LBO.

Phleum

Phleum alpinum L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Phleum pratense L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Phragmites

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Sinónimos: *Arundo australis* Cav., *Phragmites communis* Trin., *Phragmites phragmites* (L.) H. Karst., *Phragmites phragmites* (L.) Speg., *Phragmites dioicus* Hack. ex Hicken, *Phragmites dioica* Hack. ex Conert

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 5-2390 m.

Nombre vulgar: Carrizo.

Piptatherum

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAG.

Piptochaetium

Piptochaetium angolense Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-740 m.

Piptochaetium bicolor (Vahl) E. Desv.

Sinónimos: *Stipa bicolor* Vahl, *Stipa megalantha* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 10-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Piptochaetium depressum (Steud.) C. Peña

Sinónimos: *Urachne depressa* Steud., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochaetium granulatum* Phil., *Piptochaetium moelleri* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Piptochaetium fuscum (Nees ex Steud.) Barkworth, Cialdella & Gandhi

Sinónimos: *Urachne fusca* Steud., *Piptochaetium purpuratum* Phil., *Piptochaetium pallidum* Phil. ex Griseb., *Piptochaetium macrocarpum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-1100 m.

Piptochaetium hirtum Phil.

Sinónimos: *Piptochaetium brevifolium* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Países limítrofes: Argentina.

Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi

Sinónimos: *Caryochloa montevidensis* Spreng., *Piptochaetium tuberculatum* E. Desv., *Oryzopsis tuberculata* (E. Desv.) Speg., *Urachne depressa* Steud., *Piptochaetium verrucosum* Phil., *Oryzopsis verruculosa* (Phil.) Speg., *Oryzopsis verrucosa* (Phil.) Speg., *Piptochaetium humile* Phil., *Piptochetium moelleri* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-1500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Piptochaetium panicoides (Lam.) E. Desv.

Sinónimos: *Stipa panicoides* Lam., *Piptochaetium subnudum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 15-1400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack.

Sinónimos: *Urachne stipoides* Trin. & Rupr., *Piptochaetium cuspidatum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 10-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa

Poa acinaciphylla E. Desv.

Sinónimos: *Poa villaroellii* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2500-3700 m.

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. ***alopecurus***

Sinónimos: *Arundo alopecurus* Gaudich.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 20-1080 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. ***fuegiana*** (Hook.f.) D.M. Moore & Dagg.

Sinónimos: *Festuca fuegiana* Hook.f., *Poa fuegiana* (Hook.f.) Hack., *Festuca fuegiana* Hook.f. var. *vivipara* Hook., *Aira superbiens* Steud., *Poa superbiens* (Steud.) Hauman & Parodi, *Deyeuxia vivipara* Phil., *Festuca pogonantha* Franch., *Poa pogonantha* (Franch.) Parodi, *Poa fuegiana* (Hook.f.) Hack. var. *involuta* Hack., *Poa commersonii* Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa alopecurus (Gaudich. ex Mirb.) Kunth subsp. ***shuka*** (Speg.) Giussani & Soreng

Sinónimos: *Festuca shuka* Speg., *Poa shuka* (Speg.) Parodi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Poa androgyna Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3400-4156 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Poa annua L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Poa atropidiformis Hack.

Sinónimos: *Dissanthelium atropidiforme* (Hack.) Soreng

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 3-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa bonariensis (Lam.) Kunth

Sinónimos: *Festuca bonariensis* Lam., *Schenodorus bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 10-1400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Poa bulbosa L. subsp. *bulbosa*

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Poa bulbosa L. subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Poa compressa L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LLA, MAG.

Poa cumingii Trin.

Sinónimos: *Distichlis ammobia* Phil., *Distichlis volkmannii* Phil., *Poa conformis* Nees ex Steud., *Poa curva* Nees ex Steud., *Poa dialystostachya* Phil., *Poa phalaroides* Nees ex Steud., *Poa stachyodes* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 3-350 m.

Poa darwiniana Parodi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Poa denudata Steud.

Sinónimos: *Koeleria rigidula* Steud., *Trisetum rigidulum* (Steud.) Domin, *Poa vaginiflora* Steud., *Poa vaginifolia* Steud. ex Lechler, *Poa vaginiformis* Steud. ex fma. Phil., *Poa chiloensis* Phil., *Poa fonckii* Phil., *Poa araucana* Phil., *Poa eligulata* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1-2750 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa flabellata (Lam.) Raspail

Sinónimos: *Festuca flabellata* Lam., *Poa flabellata* Hook.f., *Parodiochloa flabellata* (Lam.) C.E. Hubb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Poa gayana E. Desv.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 470-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa glauca Vahl

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS, MAG.

Poa gymnantha Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4250-4720 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa hachadoensis Nicora var. *hachadoensis*

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1284-1430 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa hachadoensis Nicora var. *pilosa* Nicora

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO.

Países limítrofes: Argentina.

Poa holciformis J. Presl

Sinónimos: *Koeleria poaeoides* Nees ex Steud., *Festuca elliotii* Hack., *Poa chilensis* Trin., *Poa chilensis* Trin. var. *robustior* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1200-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa humillima Pilg.

Sinónimos: *Poa humillima* Pilg. var. *exserta* Hack. ex Buchtien

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT.

Rango altitudinal: 4500-4925 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa infirma Kunth

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME.

Poa kurtzii R.E. Fr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4000-4680 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa laetevirens R.E. Fr.

Sinónimos: *Poa nana* Phil., *Poa atacamensis* Parodi, *Puccinellia atacamensis* (Parodi) Soreng

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 4078-4550 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa lanuginosa Poir. var. *lanuginosa*

Sinónimos: *Poa magellanica* Phil. ex Macloskie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 10-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa lanuginosa Poir. var. *patagonica* (Phil.) Giussani & Soreng

Sinónimos: *Poa patagonica* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 110-110 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa lepidula (Nees & Meyen) Soreng & L.J. Gillespie

Sinónimos: *Anthochloa lepidula* Nees & Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa ligularis Nees ex Steud.

Sinónimos: *Poa denudata* Steud. var. *minor* Ball
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, AIS.
Rango altitudinal: 230-930 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa lilloi Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4250-4250 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa mendocina Nicora & F.A. Roig

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 3325-3325 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa nemoralis L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, ARA, AIS, MAG.

Poa obvallata Steud.

Sinónimos: *Deyeuxia vulcanica* Phil., *Poa julietii* Phil., *Poa pachypogon* Nees, *Poa subaristata* Phil., *Poa tristigmatica* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 210-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Poa palustris L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, MAG.

Poa paposana Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 30-820 m.

Poa parviceps Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4395-4395 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa pearsonii Reeder

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa perligulata Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 4340-4460 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa pfisteri Soreng

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Poa planifolia Kuntze

Sinónimos: *Colpodium planifolium* (Kuntze) K. Schum., *Poa chilensis* Trin. var. *planifolia* (Kuntze) Haumann
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2750-3230 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa pratensis L. subsp. *alpigena* (Lindm.) Hiitonen

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Poa pratensis L. subsp. *pratensis*

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Poa scaberula Hook.f.

Sinónimos: *Poa dactyliformis* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 95-4200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa schoenoides Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI.

Poa secunda J. Presl
Sinónimos: *Poa fulvescens* Trin., *Festuca patagonica* Phil.,
Festuca spianantha Phil., *Poa fallens* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa serpaiana Refulio
Sinónimos: *Dissanthelium peruvianum* (Nees & Meyen)
Pilg., *Phalaridium peruvianum* Nees & Meyen
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4450-4450 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Poa spiciformis (Steud.) Hauman & Parodi var. *ibarii*
(Phil.) Giussani
Sinónimos: *Poa ibari* var. *ibari* Phil., *Poa rigidifolia* Steud.
var. *ibarii* (Phil.) Giussani
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 5-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa spiciformis (Steud.) Hauman & Parodi var. *spiciformis*
Sinónimos: *Aira spiciformis* Steud., *Koeleria sterilis* Steud.,
Poa poecila Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Poa stenantha Trin.
Sinónimos: *Poa chorizantha* E. Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 670-2200 m.

Poa trachyantha Hack.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AIS.

Poa tricolor Nees ex Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Poa trivialis L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA,
MAG.

Poa yaganica Speg.
Sinónimos: *Poa breviculmis* Pilg., *Poa chrysantha* Lindm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 50-170 m.
Países limítrofes: Argentina.

Podagrostis

Podagrostis sesquiflora (E. Desv.) Nicora
Sinónimos: *Agrostis sesquiflora* E. Desv., *Deyeuxia*
sesquiflora (E. Desv.) Benth. & Hook.f. ex W.D. Jacks.,
Briza sesquiflora (E. Desv.) Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1000-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Podophorus

Podophorus bromoides Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nota: Extinta.

Polypogon

Polypogon australis Brongn.
Sinónimos: *Polypogon chonoticus* Hook.f., *Polypogon*
crinitus Trin., hom. illeg. non (Schreb.) Nutt. 1818, *Polypogon*
littoralis var. *crinitus* Kuntze, *Polypogon interruptus* var.
crinitus (Kuntze) Hack., *Polypogon radicans* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 10-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Polypogon cachinalensis Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 2600-3000 m.

Polypogon chilensis (Kunth) Pilg.
Sinónimos: *Chaetotropis chilensis* Kunth, *Chaetotropis*
latifolia Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, VAL, NUB, BIO, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 5-700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Polypogon elongatus Kunth var. *elongatus*

Sinónimos: *Polypogon affinis* Brongn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, VAL, RME, NUB, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 400-850 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Polypogon elongatus Kunth var. *strictus* E. Desv.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 5-200 m.

Polypogon exasperatus (Trin.) Renvoize var. *exasperatus*

Sinónimos: *Agrostis exasperata* Trin., *Chaetotropis exasperata* (Trin.) Björkman, *Agrostis asperigluma* Steud., *Chaetotropis asperigluma* (Steud.) Nicora, *Chaetotropis araucana* Phil., *Agrostis exasperata* Trin. var. *viridis* Kuntze, *Agrostis speeiana* Mez
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 5-2250 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Polypogon exasperatus (Trin.) Renvoize var. *kuntzei* (Mez) Finot

Sinónimos: *Agrostis kuntze* Mez, *Agrostis exasperata* Trin. var. *purpurascens* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 2000-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Polypogon imberbis (Phil.) Johow

Sinónimos: *Nowodworskya imberbis* Phil., *Chaetotropis imberbis* (Phil.) Björkman, *Polypogon imberbis* (Phil.) Johow fma. *aristata* Skottsb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 5-100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Polypogon interruptus Kunth

Sinónimos: *Polypogon interruptus* Kunth var. *breviaristatus* E. Desv., *Polypogon interruptus* Kunth var. *longearistata* E. Desv., *Polypogon microstachys* Phil., *Polypogon tarapacanus* Phil., *Polypogon brachyatherus* Phil., *Polypogon breviaristatus* Phil., *Polypogon purpurascens* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 10-3850 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Polypogon linearis Trin.

Sinónimos: *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., nom. nud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Steud., *Polypogon longiflorus* Nees ex Trin.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 20-740 m.

Polypogon magellanicus (Lam.) Finot

Sinónimos: *Agrostis magellanica* Lam., *Agrostis antarctica* Hook.f., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook.f.) Franch., *Agrostis magellanica* Lam. var. *antarctica* (Hook.f.) Pilg., *Agrostis cognata* Steud., *Agrostis magellanica* Lam. var. *cognata* (Steud.) Macloskie & Dusén, *Agrostis chonotica* Phil., *Agrostis araucana* Phil., *Agrostis macrathera* Phil., *Agrostis rinihuensis* Phil., *Vilfa magellanica* (Lam.) P. Beauv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Polypogon maritimus Willd.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, BIO.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA.

Puccinellia

Puccinellia argentinensis (Hack.) Parodi

Sinónimos: *Atropis argentinensis* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Puccinellia biflora (Steud.) Parodi

Sinónimos: *Festuca biflora* Steud., *Atropis biflora* (Steud.) St.-Yves & Camus
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-15 m.
Países limítrofes: Argentina.

Puccinellia frigida (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Catabrosa frigida* Phil., *Poa eremophila* Phil., *Poa oresigena* Phil., *Puccinellia oresigena* (Phil.) Hitchc., *Poa hypsophila* Phil., *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Espinosa, *Puccinellia hypsophila* (Phil.) Parodi ex Nicora, *Poa pumila* Phil., *Poa taltalensis* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2300-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Puccinellia glaucescens (Phil.) Parodi
Sinónimos: *Catabrosa glaucescens* Phil., *Puccinellia johnstonii* Muñoz
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Puccinellia magellanica (Hook.f.) Parodi
Sinónimos: *Catabrosa magellanica* Hook.f., *Atropis magellanica* (Hook.f.) E. Desv., *Glyceria magellanica* (Hook.f.) Benth., *Glyceria fuegiana* Speg., *Atropis laxa* Pilg., *Puccinellia laxa* (Pilg.) Parodi
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-90 m.
Países limítrofes: Argentina.

Puccinellia preslii (Hack.) Ponert
Sinónimos: *Catabrosa tenuifolia* J. Presl, *Aira tenuifolia* (J. Presl) Steud., *Glyceria tenuifolia* (J. Presl) Steud. nom. illeg., *Atropis preslii* (J. Presl) Hauman, *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Hauman nom. illeg., *Atropis tenuifolia* (J. Presl) Speg. nom. illeg., *Puccinellia tenuifolia* (J. Presl) Parodi, nom. illeg., *Puccinellia parodi* Nicora nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 4000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Puccinellia pusilla (Hack.) Parodi
Sinónimos: *Atropis preslii* Hack. subsp. *pusiilla* Hack.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 5-130 m.
Países limítrofes: Argentina.

Puccinellia skottsbergii (Pilg.) Parodi
Sinónimos: *Atropis skottsbergii* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Relchela

Relchela panicoides Steud.
Sinónimos: *Panicum oligostachyum* Steud., *Agrostis asperula* Phil., *Agrostis corralensis* Phil., *Agrostis limonias* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-1460 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rostraria

Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG, IPA.

Rostraria trachyantha (Phil.) Tzvelev ex Soreng
Sinónimos: *Koeleria trachyantha* Phil., *Raimundochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina, *Parodiochloa trachyantha* (Phil.) A.M. Molina
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 25-550 m.
Países limítrofes: Perú.

Rytidosperma

Rytidosperma lechleri Steud.
Sinónimos: *Danthonia glabra* Phil., *Rytidosperma glabrum* (Phil.) Nicora, *Notodanthonia lechleri* (Steud.) Veldkamp
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 800-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rytidosperma paschale (Pilg.) C.M. Baeza
Sinónimos: *Danthonia paschalis* Pilg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: IPA.
Rango altitudinal: 10-10 m.

Rytidosperma pictum (Nees & Meyen) Nicora var. ***bimucronata*** Nicora
Sinónimos: *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp var. *bimucronata* (Nicora) Veldkamp
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, AIS.
Países limítrofes: Argentina.

Rytidosperma pictum (Nees & Meyen) Nicora var. *pictum*
Sinónimos: *Danthonia picta* Nees & Meyen, *Notodanthonia picta* (Nees & Meyen) Veldkamp
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 170-3020 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rytidosperma quirihuense C.M. Baeza
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, NUB.
Rango altitudinal: 355-390 m.

Rytidosperma violaceum (E. Desv.) Nicora
Sinónimos: *Danthonia violacea* E. Desv., *Notodanthonia violacea* (E. Desv.) Veldkamp
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 150-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rytidosperma virescens (E. Desv.) Nicora
Sinónimos: *Danthonia virescens* E. Desv., *Danthonia andina* Phil., *Danthonia werdermanni* Pilg., *Notodanthonia virescens* (E. Desv.) Veldkamp var. *virescens*
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 20-2900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Saccharum

Saccharum officinarum L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Schismus

Schismus arabicus Nees
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL.

Schismus barbatus (L.) Thell.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Schizachyrium

Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, BIO.

Schyzachyrium

Schyzachyrium spicatum (Spreng.) Herter
Sinónimos: *Deyeuxia spicata* Spreng.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 750-750 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pasto escoba.

Setaria

Setaria palmifolia (Koenig) Stapf
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelén var. *brachytricha*
Pensiero
Sinónimos: *Panicum brachytrichum* Steud. ex Lechler, *Setaria brachytricha* (Steud. ex Lechler) Mez
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 10-130 m.
Países limítrofes: Argentina.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelén var. *parviflora*
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ATA, VAL, RME, MAU, BIO.

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb. ex M. B. Moss
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, BIO.

Sorghum

Sorghum bicolor (L.) Moench.
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

***Sorghum halepense* (L.) Pers.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG, IPA.

Nombre vulgar: Toroko (Rapa Nui).

Sporobolus

***Sporobolus densiflorus* (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela**

Sinónimos: *Chauvinia chilensis* Steud., *Spartina densiflora* Brongn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 5-150 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Sporobolus indicus* (L.) R. Br.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Here hoi (Rapa Nui).

***Sporobolus virginicus* (L.) Kunth**

Sinónimos: *Agrostis virginica* L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 50-340 m.

Stenotaphrum

***Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, BIO, LRI, LLA.

Taeniatherum

***Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU.

Trichoneura

***Trichoneura weberbaueri* Pilg.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2100-2276 m.

Países limítrofes: Perú.

Tripogon

***Tripogon nicorae* Rúgolo & A.S. Vega**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2950-3200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Tripogon spicatus* (Nees) Ekman**

Sinónimos: *Bromus spicatus* Nees

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2900-3100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Trisetum

***Trisetum ambiguum* Rúgolo & Nicora**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 350-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum barbinode* Trin.**

Sinónimos: *Trisetum hirtiflorum* Hack.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 550-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum caudulatum* Trin.**

Sinónimos: *Trisetum chromostachyum* E. Desv., *Trisetum heteronymum* Steud., *Trisetum variabile* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *flavescens* E. Desv., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *virescens* E. Desv., *Trisetum malacophyllum* Steud., *Trisetum splendidulum* Steud., *Trisetum chiloense* Phil., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *chiloense* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum monticola* Phil., *Trisetum ochrostachyum* Phil., *Trisetum vidalii* Phil., *Trisetum variabile* E. Desv. var. *vidalii* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum lechleri* (Steud.) Nicora, *Koeleria lechleri* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 1170-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Trisetum cernuum* Trin.**

Sinónimos: *Avena leptostachys* Hook.f., *Trisetum fraudulentum* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 150-1550 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Trisetum johnstonii (Louis-Marie) Finot subsp. ***johnstonii***
Sinónimos: *Trisetum oreophilum* Louis-Marie var. *johnstonii* Louis-Marie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 3000-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Trisetum johnstonii (Louis-Marie) Finot subsp. ***mattheii***
(Finot) Finot
Sinónimos: *Trisetum matthei* Finot
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4100-4100 m.

Trisetum longiglume Hack.
Sinónimos: *Trisetum andicola* Louis-Marie, *Deschampsia andicola* (Louis-Marie) Valencia
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Trisetum nancaguense Finot
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 45-2450 m.

Trisetum preslei (Kunth) E. Desv.
Sinónimos: *Avena preslei* Kunth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 1300-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Trisetum pyramidatum Louis-Marie ex Finot
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-540 m.
Países limítrofes: Argentina.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp. ***cumingii*** (Nees ex Steud.) Finot
Sinónimos: *Trisetum spicatum* (L.) K. Richt. var. *cumingii* (Nees ex Steud.) Finot, *Koeleria cumingii* Nees ex Steud., *Trisetum cumingii* (Nees ex Steud.) Nicora, *Trisetum malacophyllum* Phil., *Trisetum mollifolium* Louis-Marie
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 150-1460 m.
Países limítrofes: Argentina.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp. ***dianthemum***
(Louis-Marie) Finot

Sinónimos: *Trisetum dianthemum* (Louis-Marie) Finot, *Trisetum spicatum* var. *dianthemum* Louis-Marie, *Trisetum biflorum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 3-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp. ***phleoides*** (d'Urv.) Macloskie
Sinónimos: *Avena phleoides* d'Urv., *Trisetum hirsutum* Phil., *Trisetum spicatum* var. *hirsutum* (Phil.) Louis-Marie, *Trisetum phleoides*
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 80-1460 m.
Países limítrofes: Argentina.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp. ***spicatum***
Sinónimos: *Aira spicata* L., *Trisetum andinum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 5-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Triticum

Triticum aestivum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Vahlodea

Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fr. ex Hartm.
Sinónimos: *Aira atropurpurea* Wahlenb., *Deschampsia atropurpurea* (Wahlenb.) Schleele, *Aira magellanica* Hook.f., *Aira atropurpurea* Wahlenb. var. *magellanica* (Hook.f.) Skotts., *Vahlodea atropurpurea* (Wahlenb.) Fr. ex Hartm. subsp. *magellanica* (Hook.f.) Hyl., *Vahlodea magellanica* (Hook.f.) Tzvelev, *Deschampsia brachyphylla* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 150-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Vulpia

Vulpia antucensis Trin.
Sinónimos: *Festuca antucensis* (Trin.) Steud., *Festuca eriolepis* E. Desv., *Vulpia eriolepis* (E. Desv.) C.H. Blom
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 15-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: pasto sedilla.

Vulpia bromoides (L.) Gray
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Vulpia muralis (Kunth) Nees
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, JFE.

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. fma. ***megalura*** (Nutt.) Stace
& R. Cotton
Sinónimos: *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. var. *hirsuta*
Hack.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. fma. ***myuros***
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,
NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, IPA.

Vulpia octoflora (Walter) Rydb.
Sinónimos: *Festuca octoflora* Walter, *Vulpia antofagastensis*
Parodi
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 30-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: pasto sedilla.

Zea

Zea mays L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

PONTEDERIACEAE

Eichhornia

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton

Potamogeton ferrugineus Hagstr.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 100-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Potamogeton gayi A. Benn.
Sinónimos: *Potamogeton burkartii* Horn ex Tur
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Potamogeton illinoensis Morong
Sinónimos: *Potamogeton dunicola* Tur, *Potamogeton*
pedersenii Tur
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Potamogeton linguatus Hagstr.
Sinónimos: *Potamogeton badiovirens* Hagstr., *Potamogeton*
natans auct. non L., *Potamogeton montanus* C. Presl
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Potamogeton montevidensis A. Benn.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Potamogeton pusillus L.
Sinónimos: *Potamogeton berterioanus* Phil., *Potamogeton*
aschersonii A. Benn., *Potamogeton pusillus* L. var.
longepedunculatus Hicken, *Potamogeton tenuifolius* F.
Phil., *Potamogeton uruguayensis* A. Benn. & Graebn.,
Potamogeton pusillus L. var. *argentinus* A. Benn.
Hierba acuática. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Espiga de agua.

Potamogeton spirilliformis Hagstr.
Sinónimos: *Potamogeton reniacoensis* Sparre
Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Stuckenia

Stuckenia filiformis (Pers.) Boehm. subsp. *alpina* (Blytt) R.R. Haynes, Les & M. Král
Sinónimos: *Potamogeton strictus* Phil., *Potamogeton aulacophyllum* K. Schum., *Potamogeton strictus* Phil. var. *magellanicus* Hagstr., *Potamogeton juncifolius* A. Kern. ex C. Fritsch, *Potamogeton marinus* L. fma. *alpinus* Blytt
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, BIO, MAG.
Rango altitudinal: 200-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Stuckenia pectinata (L.) Börner
Sinónimos: *Potamogeton diffusus* (Hagstr.) Herter, *Potamogeton pectinatus* L. var. *diffusus* Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L., *Coleogeton pectinatus* (L.) Les & R.R. Haynes
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Stuckenia striata (Ruiz & Pav.) Holub
Sinónimos: *Potamogeton australis* F. Phil., *Potamogeton dissimilis* A. Benn., *Potamogeton pectinatus* L. var. *striatus* (Ruiz & Pav.) Hagstr., *Potamogeton pectinatus* L. var. *ungulatus* Hagstr., *Coleogeton striatus* (Ruiz & Pav.) Les & R.R. Haynes, *Potamogeton striatus* Ruiz & Pav.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LLA.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Nori.

Zannichellia

Zannichellia palustris L.
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 0-4400 m.

RESTIONACEAE

Apodasmia

Apodasmia chilensis (Gay) B.G. Briggs & L.A.S. Johnson
Sinónimos: *Leptocarpus chilensis* (Gay) Mast., *Schoenodum*

chilense Gay, *Calopsis chilensis* (Gay) Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Nombre vulgar: Canutillo.

Gaimardia

Gaimardia australis Gaudich.
Sinónimos: *Gaimardia pusilla* Gaudich.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pasto de turbal.

RUPPIACEAE

Ruppia

Ruppia filifolia (Phil.) Skottsbo.
Sinónimos: *Potamogeton filifolius* Phil., *Ruppia obtusa* Hagstr., *Ruppia obtusa* Hagstr. var. *repens* Hagstr., *Ruppia andina* Phil.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, MAG.
Rango altitudinal: 0-4400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pelo de marisma.

Ruppia maritima L.

Sinónimos: *Ruppia maritima* L. var. *rostrata* C. Agardh, *Ruppia maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch ex Rchb.) Asch. & Graebn., *Ruppia rostellata* Koch ex Rchb.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

TECOPHILAEACEAE

Conanthera

Conanthera bifolia Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Conanthera passeriflora* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *lilacina* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *nocticolor* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *coelestis* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *melananthera* Ravenna, *Conanthera passeriflora* Ravenna fma. *immaculata* Ravenna, *Sisyrinchium illmu* Molina
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Nombre vulgar: Flor de la viuda.

Conanthera campanulata Lindl.

Sinónimos: *Cummingia campanulata* D. Don, *Conanthera bifolia* auct. non Ruiz & Pav., *Conanthera simsii* Sweet, *Cummingia tenella* D. Don, *Conanthera variegata* Fenzl ex Reichardt, *Conanthera tenella* (Kunth) Ravenna, *Conanthera alba* Grau, *Conanthera sabulosa* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-3200 m.

Conanthera parvula (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Conanthera johowii* Espinosa, *Conanthera minima* Grau, *Cummingia parvula* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 100-500 m.

Conanthera trimaculata (D. Don) F. Meigen

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Conanthera urceolata Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Tecophilaea

Tecophilaea cyanocrocus Leyb.

Sinónimos: *Zephyra cyanocrocus* (Leyb.) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 700-900 m.

Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla fma. *polyantha*

Skottsbo.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Nota: Citada para Chile (Marticorena & Quezada, 1985) sin mencionar ejemplar de referencia.

Tecophilaea violiflora Bertero ex Colla fma. *violiflora*

Sinónimos: *Zephyra violiflora* (Bertero ex Colla) Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Violeta de la cordillera.

Zephyra

Zephyra compacta C. Ehrh.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Zephyra elegans D. Don

Sinónimos: *Zephyra amoena* D. Don, *Dicolus caerulescens* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Argentina.

TYPHACEAE

Typha

Typha angustifolia L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Typha domingensis Pers.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, VAL, NUB, BIO, ARA.

ZOSTERACEAE

Zostera

Zostera chilensis (J. Kuo) S.W.L. Jacobs & D.H. Les

Sinónimos: *Heterozostera chilensis* J. Kuo
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Seba de mar.

MAGNOLIOPSIDA

ACANTHACEAE

Dicliptera

Dicliptera paposana Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.

Stenandrium

Stenandrium dulce (Cav.) Nees

Sinónimos: *Gerardia dulcis* (Cav.) S.F. Blake, *Ruellia dulcis* Cav., *Nierembergia prunellifolia* Dunal

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

AEXTOXICACEAE

Aextoxicon

Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav.

Árbol. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Olivillo, palo muerto, tique, teque, aceitunillo.

AIZOACEAE

Carpobrotus

Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br.

Sinónimos: *Mesembryanthemum chilense* Molina, *Carpobrotus aequilaterus* auct. non (Haw.) N.E. Br.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Doca.

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, BIO, LRI.

Galenia

Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL.

Mesembryanthemum

Mesembryanthemum crystallinum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Mesembryanthemum nodiflorum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

Sesuvium

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP.

Tetragonia

Tetragonia angustifolia Barnéoud

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Tetragonia copiapina Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Tetragonia espinosae Muñoz

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Tetragonia macrocarpa Phil.

Sinónimos: *Tetragonia pusilla* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, IDE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Tetragonia maritima Barnéoud

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Tetragonia microcarpa Phil.

Sinónimos: *Tetragonia macrocarpa* Phil. var. *microcarpa* (Phil.) Reiche, *Tetragonia tenella* I.M. Johnst., *Tetragonia trigona* Phil., *Tetragonia kuntzei* J. Buchw. ex Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

Tetragonia ovata Phil.

Sinónimos: *Tetragonia robusta* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Tetragonia pedunculata Phil.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Perú.

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, LRI, LLA, JFE, IPA, IDE.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Taylor (1996) señala que es nativa en Australia, Nueva Zelanda, Japón, Argentina y Chile dispersada por corrientes oceánicas, mientras que Prescott (1984) señala que es nativa sólo de Australia y Nueva Zelanda.

Trianthema

Trianthema portulacastrum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

AMARANTHACEAE

Alternanthera

Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier

Sinónimos: *Achyranthes halimifolia* Lam.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Perú.

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze

Sinónimos: *Alternanthera junciflora* (J. Remy) I.M. Johnst., *Achyranthes porrigens* Jacq.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Amaranthus

Amaranthus albus L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, RME.

Amaranthus asplundii Thell.

Sinónimos: *Amaranthus affinis* Thell., *Amaranthus*

buchtienianus Thell.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 2400-3600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Amaranthus blitum L. subsp. ***emarginatus*** (Moq. ex Uline

et W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ANT.

Amaranthus deflexus L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Amaranthus hybridus L. subsp. ***cruentus*** (L.) Thell.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, MAU, BIO.

Amaranthus hybridus L. subsp. ***hybridus***

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Amaranthus loosei Suss.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 500 m.

Amaranthus retroflexus L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Amaranthus viridis L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, ARA.

Gomphrena

Gomphrena meyeniana Walp.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Gomphrena umbellata J. Remy

Sinónimos: *Xeraea umbellata* (J. Remy) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

ANACARDIACEAE

Haplorhus

Haplorhus peruviana Engl.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Carza.

Lithrea

Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. var. *pilosa* Engl., *Laurus caustica* Molina, *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. fma. *pilosa* (Engl.) Cabrera, *Persea caustica* (Molina) Spreng., *Lithrea venenosa* Miers, nom. nud., *Rhus caustica* Hook. & Arn., *Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn. var. *glabra* Engler

Árbol. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Nombre vulgar: Litre.

Schinus

Schinus areira L.

Sinónimos: *Schinus molle* L. var. *areira* (L.) DC., *Schinus huingan* Molina, *Schinus bituminoides* Salisb., *Schinus molle* L. var. *huingan* (Molina) Marchand

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Molle, pimiento, pimentero.

Schinus kauselii F.A. Barkley

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1400-1800 m.

Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl.

Sinónimos: *Litrea molle* auct. non L., *Duvaua latifolia* Gillies ex Lindl., *Schinus dependens* Ortega var. *latifolia* Marchand, *Schinus chilensis* Marchand var. *glabra* Marchand, *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *gamma* Hook., *Duvaua velutina* Turcz., *Schinus chilensis* Marchand, *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engler var. *tomentosus* Fenzl ex Engler, *Schinus velutinus* (Turcz.) I.M. Johnst.

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Molle.

Schinus marchandii F.A. Barkley

Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Schinus montanus (Phil.) Engl.

Sinónimos: *Lithraea montana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Schinus patagonicus (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var.

crenuloides (F.A. Barkley) F.A. Barkley

Sinónimos: *Schinus montanus* (Phil.) Engl. var. *crenuloides* F.A. Barkley

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Litrecillo.

Schinus patagonicus (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. *patagonicus*

Sinónimos: *Litrea patagonica* Phil., *Schinus crenatus* Engl., *Lithraea montana* Phil. var. *patagonica* Phil., *Duvaua patagonica* Phil., *Schinus montana* (Phil.) Engl. var. *patagonica* Reiche, *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *patagonica* Phil.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Laura, litrecillo.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera

Sinónimos: *Amyris polygama* Cav., *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *chilensis* F.A. Barkley, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera fma. *ovatus* (Lindl.) Cabrera, *Schinus dependens* Ortega var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus huingan* Kuntze, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *parviflorus* (Marchand) F.A. Barkley, *Duvaua crenata* Phil., *Litrea crenata* Phil., *Schinus dependens* Ortega var. *parviflorus* Marchand

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Huingán.

Nota: Especie muy polimorfa, con variaciones especialmente en las hojas, lo que ha motivado la creación de variedades, subespecies y formas. Han sido reunidas en una sola especie.

APIACEAE

Ammi

Ammi majus L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, LRI, LLA.

Ammi visnaga (L.) Lam.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, JFE.

Anethum

Anethum graveolens L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: JFE.

Anthriscus

Anthriscus caucalis M. Bieb.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: MAG.

Apium

Apium chilense Hook. & Arn.

Sinónimos: *Apium flexuosum* Phil., *Ligusticum dumetorum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Apium fernandezianum Johow

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.

Apium graveolens L.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: ANT, LRI, LLA.

Apium humile (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum humile* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Apium nodiflorum (L.) Lag.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.

Apium panul (Bertero ex DC.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum pansil* Bertero ex DC., *Ligusticum nemorosum* Phil., *Ligusticum landbeckii* Phil., *Ligusticum apioides* Phil., *Carum panul* (Bertero ex DC.) Griseb., *Apium andinum* Phil., *Apium apioides* (Phil.) Reiche, *Apium philippii* H. Wolff, *Apium angustilobum* (Phil.) Reiche, *Apium panul* (Bertero ex DC.) Reiche var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche var. *tenuifolium* (C. Presl ex DC.) H. Wolff, *Pimpinella araucana* Phil., *Ligusticum peucedanoides* C. Presl ex DC., *Pimpinella andina* Phil., *Ligusticum angustilobum* Phil., *Ligusticum cahuilense* Phil. ex sched., *Pimpinella macrophylla* Phil., *Pimpinella molleri* Phil., *Pimpinella navarri* Phil., *Pimpinella petersiana* Phil., *Pimpinella vidali* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Panul.

Apium pimpinellifolium (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Ligusticum pimpinellifolium* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.

Apium prostratum Labill.

Sinónimos: *Apium maclovianum* Gand., *Apium dunicola* Pontiroli, *Apium australe* Thouars var. *latisectum* H. Wolff, *Wydleria humilis* Phil., *Apium australe* Thouars
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME, MAU, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Rapa.

Asteriscium

Asteriscium aemocarpon Clos

Sinónimos: *Asteriscium ramosissimum* Phil., *Asteriscium verrucosum* Meyen, *Asteriscium haemocarpon* Clos var. *chlorocarpon* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2100-3500 m.

Asteriscium chilense Cham. & Schltdl.

Sinónimos: *Eryngium tricuspdatum* Dombey, *Asteriscium poeppigii* DC., *Asteriscium chilense* Cham. & Schltdl. var. *haenkei* DC., *Asteriscium pozoides* Clos
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 100-2500 m.
Nombre vulgar: Anicillo, huaralao, mucho, colecilla.

Asteriscium closii (Kuntze) Mathias & Constance
Sinónimos: *Dipterygia closii* Kuntze, *Bustillosia chilensis* Clos, *Asteriscium pungens* Drude, *Bustillosia chilensis* Clos var. *setacea* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Asteriscium vidali Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Azorella

Azorella acaulis (Cav.) Drude
Sinónimos: *Huanaca acaulis* Cav., *Lechleria palmata* Phil., *Huanaca bergii* Hieron., *Huanaca geraniifolia* DC., *Huanaca cavanillesii* DC., *Spananthe huanaca* (Spreng.) Lag., *Oenanthe huanaca* Spreng.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella albovaginata (Gillies & Hook.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas var. ***pauciflorum*** (Reiche) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sinónimos: *Mulinum albovaginatum* Gillies & Hook. var. *pauciflorum* (Reiche) J.C. Zech, *Mulinum pauciflorum* Reiche, *Azorellopsis trisecta* H. Wolff, *Mulinum reichei* H. Wolff
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Azorella ameghinoi Speng.
Sinónimos: *Azorella transverse-striata* Hauman
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretta.

Azorella andina (Phil.) Drude
Sinónimos: *Trisciadium andinum* Phil., *Huanaca andina* (Phil.) Phil., *Azorella trilobata* Dusén, *Schizeilema trilobatum* (Dusén) Domin
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 600-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella atacamensis G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sinónimos: *Mulinum crassifolium* Phil. non *Azorella* Pers.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3700-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella biloba (Schltdl.) Wedd.
Sinónimos: *Fragosa biloba* Schltdl., *Azorella lehmannii* Hieron.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2500-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Llaretta.

Azorella boelckei (Mathias & Constance) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sinónimos: *Huanaca boelckei* Mathias & Constance
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella burkartii (Mathias & Constance) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sinónimos: *Huanaca burkartii* Mathias & Constance
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, MAG.
Rango altitudinal: 800-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella compacta Phil.
Sinónimos: *Azorella columnaris* H. Wolff, *Azorella yareta* Hauman, *Azorella prismatoclada* Domin, *Laretia compacta* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3500-5200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Llaretta, yareta.

Azorella concolor Rendle
Sinónimos: *Mulinum valentini* Speng., *Mulinum lycopodiopsis* Speng.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 300-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella crassipes Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 1700-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretá.

Azorella cryptantha (Clos) Reiche

Sinónimos: *Mulinum integrifolium* Hieron., *Mulinum cryptanthum* Clos
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2500-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretá.

Azorella diversifolia Clos

Sinónimos: *Pozoa incisa* Griseb., *Azorella incisa* (Griseb.) Wedd. *Azorella diversifolia* Clos var. *antillanca* J.C. Zech
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella filamentosa Lam.

Sinónimos: *Chamitis integrifolia* Gaertn., *Azorella chamitis* Pers.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella fuegiana Speg.

Sinónimos: *Azorella mesetae* Skottsbo., *Azorella dusenii* H. Wolff
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella lycopodioides Gaudich.

Sinónimos: *Azorella nervosa* Phil., *Azorella laevigata* Phil., *Azorella clandestina* Phil., *Azorella vaginata* Phil., *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *compacta* Phil., *Azorella philippi* Gand., *Azorella concolor* auct. non Rendle
Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretá.

Azorella madreporica Clos

Sinónimos: *Azorella bolacina* Clos, *Azorella piligera* Phil.,

Azorella muscoides Phil., *Azorella obtusiloba* Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.
Rango altitudinal: 1800-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretá.

Azorella monantha Clos

Sinónimos: *Azorella cespitosa* auct. non Cav., *Azorella hookeriana* Clos, *Azorella apoda* A. Gray, *Azorella sessiliflora* Phil., *Azorella bryoides* Phil., *Azorella nucamentacea* (Phil.) Hauman, *Apleura nucamentacea* Phil., *Azorella glacialis* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretá.

Azorella monteroi S. Martínez & Constance

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1800 m.

Azorella nivalis Phil.

Sinónimos: *Mulinum leptacanthum* Phil., *Mulinum patagonicum* Speg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1400-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella patagonica Speg.

Sinónimos: *Azorella patagonica* Speg. var. *compacta* Speg., *Azorella plantaginea* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella prolifera (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas

Sinónimos: *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers., *Selinum spinosum* Cav., *Selinum proliferum* Cav., *Mulinum proliferum* (Cav.) Pers., *Mulinum laxum* Phil., *Mulinum leoninum* Lorentz, *Mulinum chillanense* Phil., *Mulinum ovalleanum* Phil., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *leoninum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *quinquepartitum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *trispinescens* Kuntze, *Mulinum gandogeri* M. Hiroe, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *longeinvolucrata* Hicken, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *proliferum* (Cav.) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *chillanense* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers.

var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Mulinum hirsutum* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Neneo, mata barrosa, dichillo, hierba de la
culebra, hierba negra, chila, espinillo, churquecillo.

Azorella ranunculus d'Urv.
Sinónimos: *Schizeilema ranunculus* (d'Urv.) Domin, *Pozoa*
ranunculus (d'Urv.) Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella ruizii G.M. Plunkett & A.N. Nicolas
Sinónimos: *Selinum acaule* Cav., *Mulinum acaule* (Cav.)
Pers., *Laretia acaulis* (Cav.) Gillies & Hook.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretá.

Azorella selago Hook.f.
Sinónimos: *Azorella selago* Hook.f. var. *compacta* Albov,
Azorella selago Hook.f. var. *pulvinaris* Albov, *Azorella*
antipoda Gand., *Azorella maquariensis* Orchard
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretá.

Azorella spinosa (Ruiz & Pav.) Pers.
Sinónimos: *Fragosa spinosa* Ruiz & Pav., *Mulinum*
cuneatum Hook. & Arn., *Azorella pectinata* Phil., *Mulinum*
clandestinum Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Azorella trifoliolata Clos
Sinónimos: *Azorella gayana* Phil., *Azorella depauperata*
Phil., *Azorella pinnatiloba* Gand.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers.
Sinónimos: *Chamitis trifurcata* Gaertn., *Azorella cespitosa*
Cav., *Bolax gilliesii* Hook., *Azorella gilliesii* (Hook.) Hook.
& Arn., *Azorella utriculata* Griseb., *Azorella rahmeri* Phil.,
Azorella albida Phil., *Azorella crassifolia* Pers., *Chamitis*
tricuspidata Gaertn.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Llaretá.

Azorella ulicina (Gillies & Hook.) G.M. Plunkett & A.N.
Nicolas
Sinónimos: *Mulinum ulicinum* Gillies & Hook.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4100-4700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Bolax

Bolax caespitosa Hombr. & Jacq. ex Decne.
Sinónimos: *Azorella bovei* Speg., *Azorella gummifera* Poir.,
Bolax bovei (Speg.) Dusén
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bolax gummifera (Lam.) Spreng.
Sinónimos: *Hydrocotyle gummifera* Lam., *Bolax columnifer*
Gand., *Bolax glebaria* Comm. ex Gaudich., *Azorella*
glebaria (Comm. ex Gaudich.) A. Gray, *Bolax complicatus*
Spreng.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bowlesia

Bowlesia incana Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Bowlesia geraniifolia* Cham. & Schtdl.,
Bowlesia nodiflora DC., *Bowlesia rotundifolia* Phil.,
Bowlesia tenera Spreng., *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. fma.
tenera Urb.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bowlesia lobata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Bowlesia acutiloba* H. Wolff, *Bowlesia acutangula* Benth., *Drusa acutangula* (Benth.) Drude
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 1300-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Bowlesia macrophysa Zoellner

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2900 m.

Bowlesia paposana I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Bowlesia sodiroana H. Wolff

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 200-500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook.

Sinónimos: *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *gayana* Domin, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *heterophylla* Speg., *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *patagonica* Speg., *Bowlesia cirrosa* Phil., *Bowlesia pulchella* Wedd., *Bowlesia flexilis* Meyen, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *cirrosa* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Barba de gato.

Bowlesia uncinata Colla

Sinónimos: *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *tripartita* Hook. & Arn., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos, *Bowlesia reichei* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *reichei* (Phil.) Reiche, *Bowlesia axilliflora* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *axilliflora* (Phil.) Reiche, *Bowlesia dumetorum* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *dumetorum* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *triloba* Reiche, *Bowlesia macrosperma* H. Wolff
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 700-2000 m.

Centella

Centella asiatica (L.) Urb.

Sinónimos: *Hydrocotyle asiatica* L., *Hydrocotyle triflora* Ruiz & Pav., *Centella triflora* (Ruiz & Pav.) Nannf.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 10-600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Conium

Conium maculatum L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Coriandrum

Coriandrum sativum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA, JFE.

Cyclospermum

Cyclospermum laciniatum (DC.) Constance

Sinónimos: *Helosciadium laciniatum* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *humile* Hook. & Arn., *Helosciadium gracile* Clos, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *gracile* (Clos) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *hispidulum* H. Wolff, *Helosciadium deserticum* Phil., *Apium laciniatum* (DC.) Urb. fma. *deserticum* H. Wolff, *Helosciadium biternatum* Phil., *Apium biternatum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Perú.

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague

Sinónimos: *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell., *Pimpinella leptophylla* Pers., *Helosciadium leptophyllum* (Pers.) DC., *Apium ammi* Urb., *Apium ranunculifolium* auct. non Kunth, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. fma. *elatius* (Hook. & Arn.) H. Wolff, *Apium ranunculifolium* (DC.) Reiche, comb. illeg., *Helosciadium ranunculifolium* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *elatius* Hook. & Arn., *Apium ammi* Urb. var. *genuinum* H. Wolff, *Apium ammi* Urb. fma. *filamentosum* (Kuntze) H. Wolff, *Apium ammi* Urb. var. *filamentosum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. fma. *nanum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. fma. *pedunculata* Chodat, *Apium ammi* Urb. var. *leptophyllum* (Pers.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, JFE, IPA.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Daucus

Daucus carota L.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA, IPA.

Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng.
Sinónimos: *Daucus toriloides* DC., *Daucus australis* Poepp.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, MAU, LLA, AIS, MAG,
JFE.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Daucus pusillus Michx.
Sinónimos: *Daucus scaber* Larrañaga, *Daucus montevidensis*
Link ex Spreng., *Daucus hispidifolius* Clos
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA,
AIS.
Rango altitudinal: 0-2300 m.

Diposis

Diposis bulbocastanum DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 500-2500 m.

Domeykoa

Domeykoa andina Saldivia & Faúndez
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2650-3120 m.

Domeykoa oppositifolia Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-1000 m.

Domeykoa perennis I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eremocharis

Eremocharis confinis I.M. Johnst.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3100-3200 m.
Países limítrofes: Perú.

Eremocharis fruticosa Phil.
Sinónimos: *Eremocharis flexuosa* Phil., *Dipterygia*
philippiana Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-1800 m.

Eryngium

Eryngium anomalum Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 100 m.

Eryngium bupleuroides Hook. & Arn.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 400-900 m.

Eryngium cardosii Clos
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 100-200 m.

Eryngium coquimbanum Phil. ex Urb.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Eryngium depressum Hook. & Arn.
Sinónimos: *Eryngium arvense* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LLA.
Rango altitudinal: 100-1000 m.
Nombre vulgar: Caucha.

Eryngium fernandezianum Skottsb.
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 300-500 m.
Nota: Probable híbrido entre *E. bupleuroides* y *E. inaccessum*.

Eryngium humifusum Clos
Sinónimos: *Eryngium pratense* Phil. var. *depressum* Phil.,
Eryngium pratense Phil., *Eryngium humifusum* Clos var.

pratense (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

Eryngium inaccessum Skottsbo.
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Eryngium macracanthum Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroché
Sinónimos: *Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroché var. *chilensis* DC.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 100-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo.

Eryngium polyrhizum Clos
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: NUB, BIO.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Eryngium pseudojunceum Clos
Sinónimos: *Eryngium fistulosum* Phil., *Eryngium crantzioides* Griseb., *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *crantzioides* (Griseb.) Reiche, *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *fistulosum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Eryngium pulchellum Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Eryngium rostratum Cav.
Sinónimos: *Eryngium rostratum* Cav. var. *diversifolium*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Caucha, cardilla.

Eryngium sarcophyllum Hook. & Arn.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nota: Extinta.

Foeniculum

Foeniculum vulgare Mill.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Gymnophyton

Gymnophyton flexuosum Clos
Sinónimos: *Dipterygia flexuosa* Kuntze, *Asteriscium flexuosum* Drude, *Gymnophyton kingii* Phil., *Dipterygia kingii* Kuntze, *Gymnophyton robustum* Clos var. *kingii* Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 800-2600 m.

Gymnophyton foliosum Phil.
Sinónimos: *Dipterygia foliosa* Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Gymnophyton isatidicarpum (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance
Sinónimos: *Mulinum isatidicarpum* C. Presl ex DC., *Dipterygia isatidicarpa* C. Presl ex DC., *Asteriscium isatidicarpum* Hook. & Arn., *Gymnophyton spinescens* Phil., *Dipterygia spinescens* Kuntze, *Asteriscium spinescens* Drude
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 800-3500 m.

Gymnophyton robustum Clos
Sinónimos: *Asteriscium robustum* Baill.
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 400-2500 m.
Nombre vulgar: Bíobio.

Gymnophyton spinosissimum Phil.
Sinónimos: *Dipterygia spinosissima* Kuntze, *Asteriscium spinosissimum* Drude
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2800-4500 m.

Homalocarpus

Homalocarpus bowlesiioides Hook. & Arn.

Sinónimos: *Bowlesia elegans* Clos, *Bowlesia elata* Clos, *Bowlesia cana* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 900-1900 m.

Homalocarpus dichotomus (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *albo-squamata* Phil., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *chrysocharpa* Phil., *Bowlesia multiradiata* Colla

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 400-3000 m.

Homalocarpus digitatus (Phil.) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *digitata* (Phil.) Domin, *Bowlesia digitata* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 800-1100 m.

Homalocarpus dissectus Mathias & Constance

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

Homalocarpus integerrimus (Turcz.) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia integerrima* Turcz., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *integerrima* Domin

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, LBO.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Homalocarpus nigripetalus (Clos) Mathias & Constance

Sinónimos: *Bowlesia nigripetala* Clos

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Hydrocotyle

Hydrocotyle bonariensis Lam.

Sinónimos: *Hydrocotyle umbellata* L. var. *bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult., *Hydrocotyle multiflora* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, BIO.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schldtl.

Sinónimos: *Hydrocotyle araucana* Phil., *Hydrocotyle araucana* Phil. var. *patagonica* Speg., *Hydrocotyle carrerae* Phil., *Hydrocotyle rahmeri* Phil., *Hydrocotyle valdiviana* Phil., *Hydrocotyle chamaemorus* Cham. & Schldtl. var. *valdiviana* Reiche, *Hydrocotyle skottsbergii* Gand.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Malva del monte.

Hydrocotyle cryptocarpa Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, LBO, NUB, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hydrocotyle indecora DC.

Sinónimos: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *chilensis* DC., *Hydrocotyle marchantioides* Clos

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hydrocotyle modesta Cham. & Schldtl.

Sinónimos: *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schldtl. var. *repens* Clos

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hydrocotyle poeppigii DC.

Sinónimos: *Hydrocotyle lechleri* Phil., *Hydrocotyle uliginosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Hydrocotyle ranunculoides L.f.

Sinónimos: *Hydrocotyle batrachoides* DC., *Hydrocotyle ranunculoides* L. var. *lobata* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. var. *inciso-crenata* Urb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Hierba de la plata, tangué.

***Hydrocotyle umbellata* L.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, VAL, BIO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Perú.

***Hydrocotyle verticillata* Thunb.**

Sinónimos: *Hydrocotyle volckmanni* Phil., *Hydrocotyle verticillata* Thunb. var. *pluriradiata* Urb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Levisticum

***Levisticum officinale* W.D.J. Koch**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA, MAG.

Lilaeopsis

***Lilaeopsis macloviana* (Gand.) A.W. Hill**

Sinónimos: *Crantzia macloviana* Gand., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill, *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *multivittata* A.W. Hill, *Lilaeopsis sinuata* A.W. Hill, *Crantzia lineata* (Michx.) Nutt. var. *subulata* Wedd., *Lilaeopsis lineata* Green
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Isru.

Oreomyrrhis

***Oreomyrrhis hookeri* Mathias & Constance**

Sinónimos: *Azorella daucooides* d'Urv., *Oreomyrrhis daucooides* auct. non Urb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Osmorhiza

***Osmorhiza chilensis* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Osmorhiza berteroi* DC., *Osmorhiza berteroi* DC. var. *gracilior* Phil., *Schudia chilensis* Molina ex Clos
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Asta de cabra.

***Osmorhiza depauperata* Phil.**

Sinónimos: *Osmorhiza obtusa* (J.M. Coult. & Rose) Fernald, *Washingtonia obtusa* J.M. Coult. & Rose
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Osmorhiza glabrata* Phil.**

Sinónimos: *Myrrhis renjifoana* Phil., *Uraspermum glabratum* (Phil.) Kuntze, *Elleimataenia renjifoana* (Phil.) Koso-Poliansky
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Pastinaca

***Pastinaca sativa* L.**

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: RME, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS.

Petroselinum

***Petroselinum crispum* (Mill.) A.W.Hill.**

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: VAL, JFE.

Pozoa

***Pozoa coriacea* Lag.**

Sinónimos: *Pozoa hydrocotylifolia* Bridges, *Azorella coriacea* (Lag.) Kuntze, *Azorella hydrocotylifolia* (Bridges) Macloskie, *Pozoa denticulata* Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Anislao.

***Pozoa volcanica* Mathias & Constance**

Sinónimos: *Azorella volcanica* M. Hiroe
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1200-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sanicula

Sanicula crassicaulis Poepp. ex DC.

Sinónimos: *Sanicula liberta* auct. non Cham. & Schldtl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pata de león.

Sanicula graveolens Poepp. ex DC.

Sinónimos: *Sanicula macrorhiza* Bertero ex Colla, *Sanicula macrorhiza* Bertero ex Colla var. *andina* Meigen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 1500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pata de león.

Scandix

Scandix pecten-veneris L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Seseli

Seseli libanotis (L.) Koch

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: BIO.

Sium

Sium latifolium L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL.

Torilis

Torilis arvensis (Huds.) Link

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO.

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, JFE.

APOCYNACEAE

Asclepias

Asclepias curassavica L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, IPA.

Catharanthus

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Diplolepis

Diplolepis biflora (Phil.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Diplolepis nummulariifolia* (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. *biflora* (Phil.) Hechem & C. Ezcurra, *Cynoctonum biflorum* Phil., *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn. var. *biflorum* (Phil.) Reiche, *Vincetoxicum biflorum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Diplolepis boerhaviifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sinónimos: *Cynanchum boerhaviifolium* Hook. & Arn., *Cynoctonum boerhaviifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Oxypetalum parvifolium* Phil., hom. illeg., *Schizostemma kingii* Phil., *Vincetoxicum biflorum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto trepador. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Pehuendum, pahueldum.

Diplolepis geminiflora (Decne.) Liede & Rapini

Sinónimos: *Astephanus geminiflorus* Decne.
Arbusto trepador. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Nombre vulgar: Azahar de quissco, azahar, cuerdecilla, cordelillo, lichilahuén, voquicillo.

Diplolepis hieronymi (Lorentz) Liede & Rapini

Sinónimos: *Astephanus hieronymi* (Lorentz) Malme, *Cynanchum fallax* Hicken, *Cynanchum hieronymi* (Lorentz) Hicken, *Astephanus fallax* (Hicken) T. Mey., *Grisebachiella hieronymi* Lorentz
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 600-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Diplolepis menziesii Schult.f.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-900 m.

Nombre vulgar: Voquicillo, voqui amarillo.

Diplolepis mucronata (Decne.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum chilense* (Phil.) Malme,

Holostemma chilense Phil., *Cynoctonum mucronatum*

Decne., *Cynanchum mucronatum* (Decne.) Reiche, comb.

illeg., *Vincetoxicum mucronatum* (Decne.) Kuntze

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 800-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Voqui.

Diplolepis myrtifolia (Hook. & Arn.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum myrtifolium* Hook. & Arn.,

Cynoctonum myrtifolium (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum*

nemorosum Phil., *Vincetoxicum nemorosum* (Phil.) Kuntze

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Hierba del tricao.

Diplolepis nummulariifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Sinónimos: *Cynanchum patagonicum* (Phil.) Malme,

Cynoctonum nummulariifolium (Hook. & Arn.) Decne.,

Cynoctonum undulatum Decne., *Cynanchum nanum* Skottsb.,

hom. illeg., *Cynoctonum patagonicum* Phil., *Vincetoxicum*

patagonicum (Phil.) Kuntze, *Cynanchum undulatum*

(Decne.) K. Schum., *Cynanchum nummulariifolium*

Hook. & Arn., *Vincetoxicum nummularifolium* (Hook. &

Arn.) Kuntze, *Vincetoxicum undulatum* (Decne.) Kuntze,

Cynanchum andinum Liede, *Cynanchum nanissimum* Liede,

nom. illeg., *Cynanchum nanellum* P.T. Li

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI.

Rango altitudinal: 700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Diplolepis pachyphylla (Decne.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum acutifolium* (Phil.) Reiche,

Cynanchum pachyphyllum (Decne.) K. Schum., *Cynoctonum*

acutifolium Phil., *Cynoctonum pachyphyllum* Decne.,

Cynoctonum chiloense Decne., *Cynanchum lancifolium*

Hook. & Arn., hom. illeg., *Vincetoxicum chiloense* (Decne.)

Kuntze, *Vincetoxicum pachyphyllum* (Decne.) Kuntze,

Cynanchum chiloense (Decne.) Malme

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pahueldin, pahueldum, pahueldun.

Diplolepis viridis (Phil.) Hechem & C. Ezcurra

Sinónimos: *Cynanchum deserticola* A.R. Flores & J.M.

Watson, *Cynoctonum viride* Phil., *Cynanchum viride* (Phil.)

Reiche, nom. illeg., *Cynanchum atacamense* Liede

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Elytropus

Elytropus chilensis (A. DC.) Müll. Arg.

Sinónimos: *Echites chilensis* A. DC., *Echites ptarmicus*

Poepp., *Echites heterophyllum* Miq., *Elytropus ptarmica*

(Poepp.) Miers, *Vinca sternutetoria* Poepp. ex Reiche.,

Elytropus heterophyllum Miers, *Elytropus pubescens* Miers

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Poroto del campo, quilmay, voqui.

Philibertia

Philibertia candolleana (Hook. & Arn.) Goyder

Sinónimos: *Brachylepis candolleana* Hook. & Arn.,

Astephanus cordifolius Phil., *Mitostigma cordifolium* (Phil.)

E. Fourn., *Aphanostelma candolleanum* (Hook. & Arn.)

Malme, *Melinia candolleana* (Hook. & Arn.) Decne.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Philibertia solanoides Kunth

Sinónimos: *Blepharodon rahmeri* Phil., *Philibertia rahmeri*

(Phil.) Malme

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Skytanthus

Skytanthus acutus Meyen

Sinónimos: *Scytanthus acutus* Walp., *Neriandra*

angustifolia DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Cuerno, cuerno de cabra, monte de burro,

cuernecillo.

Tweedia

Tweedia andina (Phil.) G.H. Rua

Sinónimos: *Tweedia hookeri* (Decne.) Malme, *Oxypetalum andinum* Phil., *Oxypetalum hookeri* Decne., *Oxypetalum mölleri* Phil.

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Voquicillo.

Tweedia birostrata (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Tweedia confertiflora* (Decne.) Malme, *Tweedia obliquifolia* (Colla) Malme, *Cynanchum birostratum* Hook. & Arn., *Gonolobus obliquifolius* Colla, *Gonolobus voquicillo* Colla, *Oxypetalum saxatile* Decne., *Oxypetalum confertiflorum* Decne., *Oxypetalum brevipes* Phil., *Gothofreda birostrata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda obliquifolia* (Colla) Kuntze, *Gothofreda confertiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda brevipes* (Phil.) Kuntze, *Oxypetalum angustifolium* Phil., *Tweedia brevipes* (Phil.) Malme

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nombre vulgar: Voquicillo.

Tweedia stipitata G.H. Rua & Liede

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Vinca

Vinca major L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

ARALIACEAE

Hedera

Hedera helix L.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Nombre vulgar: Hiedra.

Raukua

Raukua laetevirens (Gay) Frodin

Sinónimos: *Aralia laetevirens* Gay, *Aralia paniculata* Phil.,

Cheirodendron laetevirens (Gay) Seem., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Dusén, comb. illeg., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Franchet

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Sauco cimarrón, sauco del diablo.

Raukua valdiviensis (Gay) Frodin

Sinónimos: *Aralia valdiviensis* Gay, *Aralia valdiviensis* Gay, *Pseudopanax valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms, *Pseudopanax valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Curaco, traumén, voquinaranjillo, hueldahuca.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia

Aristolochia bridgesii (Klotzsch) Duch.

Sinónimos: *Aristolochia pearcei* Phil., *Howardia bridgesii* Klotzsch

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 900-1300 m.

Nombre vulgar: Oreja de zorro amarilla.

Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.

Sinónimos: *Aristolochia setigera* Klotzsch

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Oreja de zorro, hierba de la Virgen María, clon.

Lactoris

Lactoris fernandeziana Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 500 m.

ASTERACEAE

Abrotanella

Abrotanella emarginata (Gaudich.) Cass.

Sinónimos: *Oligosporus emarginatus* Gaudich.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Abrotanella linearifolia A. Gray

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Abrotanella purpurea Swenson

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Abrotanella submarginata A. Gray

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Abrotanella trichoachaenia Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 800-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Abrotanella trilobata Swenson

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 400-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Achillea

Achillea millefolium L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, MAG.

Achillea ptarmica L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

Achyrocline

Achyrocline tomentosa Rusby

Sinónimos: *Achyrocline polycephala* Rusby

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 700-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Acmella

Acmella glaberrima (Hassl.) R.K. Jansen

Sinónimos: *Spilanthes glaberrima* Hassl.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Acrisione

Acrisione cymosa (J. Remy) B. Nord.

Sinónimos: *Senecio cymosus* J. Remy, *Senecio lechleri* Sch.

Bip. nom. Nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Nombre vulgar: Matico, para ná.

Acrisione denticulata (Hook. & Arn.) B. Nord. var. ***denticulata***

Sinónimos: *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *yegua*,

Cacalia denticulata Hook. & Arn., *Danaa yegua* Colla,

Senecio denticulatus (Hook. & Arn.) DC., hom. illeg.,

Senecio ovalifolius Turcz., *Senecio rancaguensis* J. Remy,

Senecio yegua (Colla) Cabrera var. *depilis* (Phil.) Cabrera

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 700-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palpalen, palo de yegua.

Acrisione denticulata (Hook. & Arn.) B. Nord. var. ***pilota*** (Phil.) B. Nord.

Sinónimos: *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC. var.

pilotus Phil., *Senecio yegua* (Colla) Cabrera var. *pilotus*

(Phil.) Cabrera

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Adenocaulon

Adenocaulon chilense Less.

Sinónimos: *Adenocaulon lechleri* Sch. Bip., *Boerhavia*

nudicaulis Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ageratum

***Ageratum conyzoides* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Agoseris

***Agoseris chilensis* (Less.) Greene**

Sinónimos: *Macrorhynchus chilensis* Less., *Troximon chilense* (Less.) A. Gray
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Nombre vulgar: Yesquilla.

***Agoseris coronopifolia* (d'Urv.) K.L. Chambers ex D.M. Moore**

Sinónimos: *Agoseris australis* (Phil.) Macloskie, *Agoseris pumila* (Gaudich.) Macloskie, *Macrorhynchus australis* Phil., *Macrorhynchus elatus* Phil., *Macrorhynchus poeppigii* DC., *Macrorhynchus pumilum* (Gaudich.) DC., *Taraxacum coronopifolium* d'Urv., *Taraxacum pumilum* Gaudich., *Agoseris poeppigii* (DC.) Greene, *Troximon coronopifolius* (d'Urv.) Cabrera, *Troximon poeppigii* (DC.) De Wild., *Troximon pumilum* (Gaudich.) De Wild.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Aldama

***Aldama adenotricha* (S.F. Blake) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera adenotricha* S.F. Blake
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.

***Aldama atacamensis* (Phil.) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera atacamensis* Phil., *Viguiera linearis* Reiche, *Rhysolepis atacamensis* (Phil.) H. Rob. & A.J. Moore
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2800-2900 m.

***Aldama helianthoides* (Rich.) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera pazensis* Rusby, *Flourensia atacamensis* (Phil.) Reiche, *Helianthus atacamensis* Phil., *Sanvitalia helianthoides* Rich., *Rhysolepis helianthoides* (Rich.) H. Rob. & A.J. Moore
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Sorona.

***Aldama revoluta* (Meyen) E.E. Schill. & Panero**

Sinónimos: *Viguiera revoluta* (Meyen) S.F. Blake, *Flourensia corymbosa* DC., *Flourensia corymbosa* DC. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Helianthus araucanus* Phil., *Helianthus revolutus* Meyen, *Viguiera corymbosa* (DC.) Blake, *Viguiera poeppigii* A. Gray, nom. illeg., *Viguiera gayana* (Phil.) Cabrera ex Espinosa, nom. illeg., *Flourensia gayana* (Phil.) Reiche, *Helianthus gayanus* Phil.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Botón de oro del monte, china del campo, maravilla.

Amblyopappus

***Amblyopappus pusillus* Hook. & Arn. var. *pauciflorus* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Amblyopappus pauciflorus* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Nombre vulgar: Manzanilla.

Amblyopappus pusillus* Hook. & Arn. var. *pusillus

Sinónimos: *Aroma tenuifolia* Nutt., *Infantea chilensis* J. Remy
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, JFE.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Manzanilla.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Ambrosia

***Ambrosia arborescens* Mill.**

Arbusto. Introducido.
Distribución: COQ.

***Ambrosia artemisioides* Meyen & Walp. ex Meyen**

Sinónimos: *Franseria fruticosa* Phil., *Franseria meyeniana* Sch. Bip.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1700-4600 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tikara, pikara, cadillo, monte verde, tola negra, pegapega, lipelipe.

Ambrosia chamissonis (Less.) Greene

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Ambrosia elatior L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Ambrosia peruviana Willd.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR.

Ambrosia tenuifolia Spreng.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

Anaphalis

Anaphalis chilensis Reiche

Sinónimos: *Helichrysum chilense* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-800 m.

Antennaria

Antennaria chilensis J. Remy var. *chilensis*

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1600-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Antennaria chilensis J. Remy var. *magellanica* (Sch. Bip.)

Reiche

Sinónimos: *Antennaria magellanica* Sch. Bip.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Anthemis

Anthemis arvensis L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA.

Anthemis cotula L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Aphyllocladus

Aphyllocladus denticulatus (J. Remy) Cabrera var. *calvus* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Jobaphes virgatus* Phil. var. *calvus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2500-2800 m.

Aphyllocladus denticulatus (J. Remy) Cabrera var. *denticulatus*

Sinónimos: *Cyclolepis denticulata* J. Remy, *Jobaphes virgatus* Phil., *Plazia virgata* (Phil.) O. Hoffm.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 700-2700 m.

Nombre vulgar: Piyaya sureña, monte blanco.

Arctium

Arctium minus (Hill) Bernh.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA.

Arctotheca

Arctotheca calendula (L.) Levyns

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Argyranthemum

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.

Subarbusto. Introducido.

Distribución: COQ, RME.

Arnica

Arnica angustifolia Vahl

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA.

Artemisia

Artemisia absinthium L.

Subarbusto. Introducido.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Artemisia copa Phil. var. *copa*

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 3000-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Copa, kopa, salvia blanca.

Artemisia copa Phil. var. *trifida* Acevedo
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2400 m.

Artemisia magellanica Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Artemisia verlotorum Lamotte
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU.

Baccharis

Baccharis acaulis (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera
Sinónimos: *Heterothalamus acaulis* Wedd. ex R.E. Fr.,
Pseudobaccharis acaulis (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera,
Psila caespitosa Phil., *Baccharis acaulis* (Wedd. ex R.E.
Fr.) Malag., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3300-3700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Mamañika, qatari, anojarpsike, psike de
perro.

Baccharis alnifolia Meyen & Walp.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-3800 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Chilca blanca, pichana, monte.

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera
Sinónimos: *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cuatrec., comb.
illeg., *Heterothalamus boliviensis* Wedd., *Pseudobaccharis*
boliviensis (Wedd.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.)
Cabrera, *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Malag., comb. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1500-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tolilla, tolita, tola chica, monte de paloma,
tola amarilla, tola hembra.

Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers.
Sinónimos: *Molina caespitosa* Ruiz & Pav.
Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, LBO.
Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Baccharis calliprinos Griseb.
Sinónimos: *Pingraea scandens* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig,
Baccharis petiolata DC., *Baccharis petiolata* DC. var.
rotundifolia Phil., *Baccharis scandens* auct. non (Ruiz
& Pav.) Pers., *Molina scandens* Ruiz & Pav., *Baccharis*
salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *calliprinos* (Griseb.)
Joch.Müll., *Baccharis scandens* (Ruiz & Pav.) Pers.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1400-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Chilca, chillka, suncho, pichana, sangayo.

Baccharis concava (Ruiz & Pav.) Pers.
Sinónimos: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *intermedia*
Heering, *Molina concava* Ruiz & Pav.
Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Nombre vulgar: Vautro, gaultro, guauchu.

Baccharis cymosa Phil.
Sinónimos: *Pingraea cymosa* (Phil.) F.H. Hellwig
Arbusto. Endémico.
Distribución: LRI.
Rango altitudinal: 1000-1300 m.

Baccharis darwinii Hook. & Arn.
Sinónimos: *Neomolina darwinii* (Hook. & Arn.) F.H.
Hellwig, nom. illeg., *Baccharis angulata* Griseb. var.
gracilis Heering
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Baccharis elaeoides J. Remy
Arbusto. Nativo.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers.
Sinónimos: *Molina venosa* Ruiz & Pav., *Baccharis venosa*
(Ruiz & Pav.) Pers.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3900 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Baccharis glutinosa Pers.

Sinónimos: *Baccharis angustifolia* (Cass.) Desf., nom. illeg., *Baccharis pingraea* DC. var. *angustissima* DC., *Baccharis pingraea* DC. var. *pingraea*, *Baccharis pingraea* DC. fma. *latifolia* DC., *Baccharis serrulata* (Lam.) Pers. var. *pingraea* (DC.) Baker, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, comb. illeg., *Molina viscosa* Ruiz & Pav., *Pingraea viscosa* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Baccharis huydobriana* J. Remy p.p., *Baccharis litoralis* Phil., *Baccharis longipes* Kunze ex DC. var. *angustissima* Phil., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *angustissima* (DC.) Giuliano, *Baccharis pingraea* DC. var. *latifolia* DC., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chilca, chilquilla.

Baccharis intermedia DC.

Sinónimos: *Baccharis gayana* Phil., *Baccharis volckmannii* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Baccharis juncea (Cass.) Desf.

Sinónimos: *Arrhenachne juncea* Cass.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Suncho, pasto loco, totora, chukchuka, mutumutu.

Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *linearis*

Sinónimos: *Baccharis lingulata* Kunze ex Less., *Baccharis linifolia* Meyen, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn., *Molina linearis* Ruiz & Pav., *Baccharis montteana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Romerillo, romero, romero de la tierra.

Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *pycnocephala* F.H. Hellwig

Sinónimos: *Baccharis callistemoides* Walp., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *callistemoides* (Walp.) Heering ex Reiche, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subsiniata* DC., *Baccharis subandina* Phil., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subandina* (Phil.) Heering

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Baccharis lycioides J. Remy

Sinónimos: *Baccharis negerii* Heering, *Baccharis valdiviana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Romerillo.

Baccharis macraei Hook. & Arn.

Sinónimos: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *lucida* Heering

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Baccharis magellanica (Lam.) Pers.

Sinónimos: *Baccharis tricuneata* (L.f.) Pers. var. *magellanica* (Lam.) Cuatrec., *Conyza magellanica* Lam.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Baccharis mylodontis F.H. Hellwig

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Baccharis neaei DC.

Sinónimos: *Baccharis bezanilleana* J. Remy, *Baccharis bezanilleana* J. Remy var. *solisii* (Phil.) Reiche, *Baccharis rhetinodes* Meyen & Walp., *Baccharis solieri* J. Remy, *Baccharis solisii* Phil., *Baccharis talcareguensis* Heering ex Reiche, *Baccharis solieri* J. Remy var. *williamsii* (Phil.) Heering, *Baccharis williamsii* F. Phil. ex Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Romerillo del monte.

Baccharis nivalis (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.

Sinónimos: *Palenia delfinii* Phil., *Heterothalamus nivalis* Wedd., *Lucilia dioica* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Baccharis obovata Hook. & Arn.

Sinónimos: *Baccharis umbelliformis* DC., *Baccharis foliosa* Hook. & Arn., *Baccharis obovata* Hook. & Arn. subsp. *umbelliformis* (DC.) F.H. Hellwig, *Baccharis umbelliformis* DC. fma. *frigida* Heering, nom. illeg., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *typica* Heering, nom. illeg., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *vulgaris* Heering, *Baccharis umbelliformis* DC. var. β

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chilca, vautre.

Baccharis paniculata DC.

Sinónimos: *Baccharis philippii* Heering, *Neomolina paniculata* (DC.) F.H. Hellwig, nom. illeg., *Baccharis floribunda* Phil., hom. illeg., *Baccharis leptcephala* Phil., hom. illeg., *Nardophyllum paniculatum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Baccharis patagonica Hook. & Arn.

Sinónimos: *Baccharis cuneifolia* (Lam.) DC., hom. illeg., *Conyza cuneifolia* Lam.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Baccharis pilcensis F.H. Hellwig

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1600-2200 m.

Baccharis poeppigiana DC. subsp. *austropedicellata* F.H. Hellwig

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Baccharis poeppigiana DC. subsp. *ocellata* (Phil.) F.H. Hellwig

Sinónimos: *Baccharis ocellata* Phil., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *ocellata* (Phil.) Heering ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Baccharis poeppigiana DC. subsp. *poeppigiana*

Sinónimos: *Baccharis obovata* Hook. & Arn. var. *poeppigiana* (DC.) Cabrera, *Baccharis umbelliformis* DC. var. *poeppigiana* (DC.) Heering ex Reiche, *Baccharis pedicellata* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Nombre vulgar: Chilca cordillerana.

Baccharis pycnantha Phil.

Sinónimos: *Pingraea pycnantha* (Phil.) F.H. Hellwig

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC.

Sinónimos: *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Heering ex Reiche, comb. illeg., *Molina racemosa* Ruiz & Pav., *Neomolina racemosa* (Ruiz & Pav.) Hellwig, *Baccharis fastigiata* Phil. ex Reiche, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *angolensis* Kuntze, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Baccharis rigida* Hook. & Arn., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *typica* Heering, nom. illeg., *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var. β , *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn. var. *gama*, *Baccharis ovata* Hook. & Arn.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chilca.

Baccharis rhomboidalis J. Remy

Sinónimos: *Baccharis rhomboidalis* J. Remy subsp. *truncata* (Phil.) F.H. Hellwig, *Baccharis involucrata* Phil., *Baccharis nemorosa* Phil., *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *nemorosa* (Phil.) Heering ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Baccharis sagittalis (Less.) DC.

Sinónimos: *Molina sagittalis* Less., *Pingraea sagittalis* (Less.) F.H. Hellwig

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Verbena de tres esquinas.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.

Sinónimos: *Baccharis longipes* Kunze ex DC., *Baccharis marginalis* DC. var. *longipes* (Kunze ex DC.) Heering, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze, *Molina salicifolia* Ruiz & Pav., *Baccharis confertifolia* Bertero ex Colla, *Baccharis krausei* Heering ex Reiche, *Baccharis marginalis* DC., *Baccharis pallida* Heering ex Reiche, *Pingraea marginalis* (DC.) F.H. Hellwig, *Pingraea salicifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Baccharis chilquilla* DC., nom. illeg., *Baccharis araucana* Phil., *Baccharis cuervii* Phil., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *incisa* Heering, *Baccharis huydobriana* J. Remy, *Baccharis linifolia* Phil., hom. illeg., *Baccharis marginalis* DC. var. *araucana* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *linifolia* (Phil.) Heering, *Baccharis sphaerocephala* Hook. & Arn. var. *krausei* (Heering) Malag., comb. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chilca, chilquilla, chilquilla del río, suncho, culpío, radín.

Baccharis sessilifolia DC.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Baccharis spartioides (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy

Sinónimos: *Baccharis sarophora* Phil., *Heterothalamus spartioides* Hook. & Arn. ex DC., *Pseudobaccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera, *Psila spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Escoba, hierba de la escoba, pichana.

Baccharis sphaerocephala Hook. & Arn.

Sinónimos: *Pingraea sphaerocephala* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, *Baccharis radin* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Rari.

Baccharis taltalensis I.M. Johnst.

Sinónimos: *Neomolina taltalensis* (I.M. Johnst.) F.H.

Hellwig, nom. illeg.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 300-900 m.

Baccharis tola Phil. subsp. ***santelicis*** (Phil.) Joch. Müller var. ***chrysophylla*** (F.H. Hellwig) Joch. Müller

Sinónimos: *Baccharis santelicis* Phil. subsp. *chrysophylla* F.H. Hellwig
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3000-4600 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Baccharis tola Phil. subsp. ***santelicis*** (Phil.) Joch. Müller var. ***incarum*** (Wedd.) Joch. Müller

Sinónimos: *Baccharis santelicis* Phil., *Baccharis muicrophylla* Kunth var. *incarum* Wedd., *Baccharis incarum* Wedd.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1900-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Ñaka, lejía, tola lejía, ñakat'ula.

Baccharis tola Phil. subsp. ***tola*** var. ***tola***

Sinónimos: *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins var. *lejia* (Phil.) Cabrera, *Baccharis tola* Phil. var. *lejia* (Phil.) Reiche, *Baccharis lejia* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Lejía, tola, leña lejía, loire, ñaka.

Baccharis tola Phil. subsp. ***tola*** var. ***viscosissima*** (Kuntze) Joch. Müller

Sinónimos: *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *viscosissima* Kuntze, *Baccharis tola* Phil. subsp. *altiplanicola* F.H. Hellwig, *Baccharis tola* Phil. var. *viscosissima* (Kuntze) Joch.Müll.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3100-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Tolita, chachakoma de burro.

Baccharis vernalis F.H. Hellwig

Sinónimos: *Baccharis concava* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *floribunda* Heering
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Baccharis zoellneri F.H. Hellwig subsp. *minor* F.H. Hellwig
Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 800-1400 m.

Baccharis zoellneri F.H. Hellwig subsp. *zoellneri*
Arbusto. Nativo.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bahia

Bahia ambrosioides Lag.
Sinónimos: *Achyropappus maritimus* Poepp. ex DC., nom. nud., *Stylesia ambrosioides* (Lag.) Nutt., *Stylesia puberula* Nutt., *Eriophyllum ambrosioides* (Lag.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Chamicilla, manzanilla cimarrona, chamiza blanca.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Bellis

Bellis perennis L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Belloa

Belloa chilensis (Hook. & Arn.) J. Remy
Sinónimos: *Chevreulia nivea* Phil., *Gnaphalium andicola* Kuntze, hom. illeg., *Lucilia araucana* Phil., *Lucilia chilensis* Hook. & Arn., *Lucilia chilensis* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lucilia frigida* Reiche, nom. illeg., *Lucilia nivea* (Phil.) Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 900-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bidens

Bidens aurea (Aiton) Sherff
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, IPA.

Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Bidens pilosa L. var. *alausensis* (Kunth) Sherff
Sinónimos: *Bidens alausensis* Kunth, *Bidens valparadisiaca* Colla, *Bidens chilensis* DC.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, JFE.
Rango altitudinal: 0-2800 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Bidens pilosa L. var. *apiifolia* (DC.) Sherff
Sinónimos: *Bidens chilensis* DC. var. *apiifolia* DC.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Bidens pilosa L. var. *pilosa*
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA.

Bidens pseudocosmos Sherff
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 2900-3400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Amor seco.

Bidens subalternans DC.
Sinónimos: *Bidens quadrangularis* DC.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Bidens triplinervia Kunth var. *macrantha* (Wedd.) Sherff
Sinónimos: *Bidens macrantha* Griseb., *Bidens humilis* Wedd. var. *macrantha* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1000-3300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Flor amarilla.

Bidens triplinervia Kunth var. *triplinervia*
Sinónimos: *Bidens pedunculata* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Blennosperma

Blennosperma chilense Less.

Sinónimos: *Soliva radiata* Poepp. ex Less., *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Colla, *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Less., *Apalus anthemifolius* (Bertero ex Colla) DC.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Brachyclados

Brachyclados caespitosus (Phil.) Speg.

Sinónimos: *Brachyclados obtusifolius* Kuntze, *Brachyclados pygmaeus* Kuntze, *Lavidia caespitosa* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Brachyclados lycioides D. Don

Sinónimos: *Baucis lavandulifolia* Phil., *Brachyclados involutus* Kuntze, *Brachyclados macrocephalus* Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calendula

Calendula arvensis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO.

Calendula officinalis L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, JFE.

Calendula tripterocarpa Rupr.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ.

Calopappus

Calopappus acerosus Meyen

Sinónimos: *Nassauvia remyana* Wedd., *Calopappus acanthifolius* J. Remy, *Nassauvia acanthifolia* (J. Remy)

G.F. Grandjot, *Nassauvia acerosa* (Meyen) Wedd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2300-3200 m.

Calyptocarpus

Calyptocarpus vialis Less.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Carduus

Carduus nutans L.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, ARA.

Carduus pycnocephalus L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Carduus tenuiflorus Curtis

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL.

Carduus thoermeri Weinm.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, ARA, AIS, MAG.

Carthamus

Carthamus lanatus L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Carthamus tinctorius L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, BIO.

Centaurea

Centaurea atacamensis (Reiche) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Centaurea floccosa* Hook. & Arn. var. *atacamensis* Reiche, *Centaurea atacamensis* (Reiche) Ravenna, comb. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Centaurea benedicta (L.) L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Centaurea bulbosa Hook. & Arn.

Sinónimos: *Centaurea dianthoides* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Centaurea cachinalensis Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2800 m.

Centaurea calcitrapa L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA.

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. *breviloba* DC.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. *chilensis*

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1500-3500 m.
Nombre vulgar: Hierba o flor del minero.

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. *stenolepis* Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Centaurea cyanus L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, AIS.

Centaurea floccosa Hook. & Arn.

Sinónimos: *Centaurea illapelina* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-2900 m.

Centaurea gayana J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.

Centaurea jacea L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA.

Centaurea melitensis L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

Centaurea monocephala J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.

Centaurea nigra L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA.

Centaurea solstitialis L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Centaurodendron

Centaurodendron dracaenoides Johow

Sinónimos: *Plectocephalus dracaenoides* (Johow) F.H. Hellwig
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Centaurodendron palmiforme Skottsb.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Centipeda

Centipeda elatinoides (Less.) Benth. & Hook.f. ex O. Hoffm.

Sinónimos: *Myriogyne elatinoides* Less.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
LLA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pedorilla, peorrilla.

Chaetanthera

Chaetanthera albiflora (Phil.) A.M.R. Davies

Sinónimos: *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less. var. *taltalensis* I.M. Johnst., *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *albiflora* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *albiflora* Phil., *Chaetanthera albiflora* Phil., nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1600-1800 m.

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. *chilensis*

Sinónimos: *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *argentea* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera chilensis* (Willd.) DC. var. *involuta* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p. *Chaetanthera argentea* Phil., hom. illeg., *Chaetanthera collina* Phil., *Chaetanthera eryngioides* D. Don, *Chaetanthera grandiflora* Steud., *Chaetanthera nana* Phil., *Chaetanthera sericea* Lag., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *argentea* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera*

serrata Ruiz & Pav. var. *nana* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera sublignosa* Kuntze, *Perdicium chilense* Willd., *Chaetanthera involucrata* Phil., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don var. *eryngioides* (D. Don) Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. ***tenuifolia*** (D. Don) Cabrera

Sinónimos: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.

Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera ciliata Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Chaetanthera depauperata (Hook. & Arn.) A.M.R. Davies

Sinónimos: *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less. var. *depauperata* (Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera leptcephala* Cabrera, *Chaetanthera microphylla* (Cass.) Hook. & Arn. var. *depauperata* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 700-2900 m.

Chaetanthera elegans Phil. var. ***elegans***

Sinónimos: *Chaetanthera elata* Phil., *Chaetanthera brachylepis* Phil., *Chaetanthera valdiviana* Phil., *Chaetanthera humilis* Phil., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera volckmanni* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: China.

Chaetanthera elegans Phil. var. ***pratensis*** (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Chaetanthera andina* Phil., *Chaetanthera andina* Phil. var. *pratensis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera araucana* Phil., *Chaetanthera comata* Phil., *Chaetanthera elegans* Phil. var. *andina* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera foliosa* Phil., *Chaetanthera montana* Phil., *Chaetanthera pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera elegans Phil. var. ***pulchra*** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera euphrasioides (DC.) F. Meigen

Sinónimos: *Chaetanthera debilis* Meyen & Walp., *Elachia euphrasioides* DC., *Chaetanthera euphrasioides* Reiche var. *spinulosa* (Phil.) Reiche, *Elachia spinulosa* Phil., *Chaetanthera euphrasioides* Reiche, hom. illeg., *Tylloma euphrasioides* (DC.) Wedd.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1200-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera flabellata D. Don

Sinónimos: *Chaetanthera multicaulis* DC. var. *prostata* DC., *Chaetanthera prostrata* D. Don, *Elachia euphrasioides* Deless. non DC., hom. illeg., *Chaetanthera flabellata* D. Don var. *prostrata* (D. Don) Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1600-2600 m.

Chaetanthera flabellifolia Cabrera

Sinónimos: *Pachylaena elegans* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Chaetanthera frayjorgensis A.M.R. Davies

Sinónimos: *Tylloma brachylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *microphyllum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Chaetanthera glabrata (DC.) F. Meigen

Sinónimos: *Tylloma glabratum* DC., *Tylloma glabratum* DC. var. *rotundifolium* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *stolpi* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *strictum* (Phil.) Reiche, *Tylloma rotundifolium* Phil., *Tylloma stolpi* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Chaetanthera glandulosa J. Remy var. ***glandulosa***

Sinónimos: *Tiltilia pungens* Phil. ex Reiche, nom. nud.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Chaetanthera glandulosa J. Remy var. *gracilis* A.M.R. Davies
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Chaetanthera incana Poepp. ex Less.
Sinónimos: *Chaetanthera incana* Poepp. ex Less. var. *spathulata* DC., *Chaetanthera obtusata* Phil., *Chaetanthera scariosa* D. Don, *Chaetanthera spathulata* Poepp. ex Less., *Chaetanthera chilensis* Hook. & Arn., hom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Chaetanthera kalinae A.M.R. Davies
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2300-3100 m.

Chaetanthera lanata (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Chaetanthera philippii* B.L. Rob., *Chondrochilus grandiflorus* Phil., *Chondrochilus involucratum* Phil., *Chondrochilus lanatus* Phil., *Tylloma lanatum* Phil., *Tylloma involucratum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2600-3900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera limbata (D. Don) Less.
Sinónimos: *Chaetanthera schroederi* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Tylloma ciliatum* Phil., *Tylloma eurylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma limbatum* D. Don, *Tylloma strictum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera linearis Poepp. ex Less.
Sinónimos: *Chaetanthera kunthiana* Less. p.p., *Chaetanthera linearifolia* Poepp. ex Steud., nom. nud.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Chaetanthera microphylla (Cass.) Hook. & Arn.
Sinónimos: *Chaetanthera linifolia* Bertero ex Less., *Chaetanthera salsoloides* (D. Don) Kuntze, *Cherina microphylla* Cass., *Onoseris linifolia* Bertero, nom. nud., *Euthrixia salsoloides* D. Don, *Chaetanthera delicatula* Phil., *Chaetanthera pentapetala* Phil., *Euthrixia affinis* D. Don

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera moenchioides Less.
Sinónimos: *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *pauciflora* F. Meigen, *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *sulphurea* F. Meigen, *Chaetanthera tenuifolia* Deless., hom. illeg., *Chaetanthera albicans* Bertero, nom. nud.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera multicaulis DC.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Chaetanthera perpuzilla (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire
Sinónimos: *Chaetanthera aymarae* Martic. & Quezada, *Luciliopsis perpuzilla* Wedd.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2200-3300 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Pasto de lluvia.

Chaetanthera peruviana A. Gray
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2700-3900 m.
Países limítrofes: Perú.

Chaetanthera pubescens A.M.R. Davies
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 600-3500 m.

Chaetanthera ramosissima D. Don
Sinónimos: *Chaetanthera tenella* Less. var. *tenella*, *Chaetanthera berteriana* Colla, hom. illeg., *Minythodes umbellata* Phil., *Chaetanthera kunthiana* Less. p.p.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Chaetanthera renifolia (J. Remy) Cabrera
Sinónimos: *Chaetanthera crenata* (Phil.) F. Meigen, comb. illeg., *Chondrochilus crenatus* Phil., *Elachia renifolia* J. Remy, *Tylloma renifolium* (J. Remy) Wedd.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Chaetanthera serrata Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Chaetanthera spinulosa* Cass., *Proselia serrata* (Ruiz & Pav.) D. Don
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Chaetanthera spathulifolia Cabrera
Sinónimos: *Carmelita spathulata* Phil., *Chaetanthera spathulata* (Phil.) Hauman, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2700-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera splendens (J. Remy) B.L. Rob.
Sinónimos: *Elachia splendens* J. Remy, *Tylloma splendens* (J. Remy) Wedd.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaetanthera taltalensis (Cabrera) A.M.R. Davies
Sinónimos: *Chaetanthera tenella* Less. var. *taltalensis* Cabrera
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Chaetanthera villosa D. Don
Sinónimos: *Carmelita formosa* Gay ex DC.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chaptalia

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker var. *chilensis* (DC.) Burkart
Sinónimos: *Gerbera chilensis* (DC.) Sch. Bip., *Thyrsanthema chilensis* (DC.) Kuntze, *Loxodon chilensis* DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Chersodoma

Chersodoma arequipensis (Cuatrec.) Cuatrec.
Sinónimos: *Senecio arequipensis* Cuatrec., *Chersodoma longipedicellata* Ricardi & Martic.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-3700 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Chachakoma blanca, coquilla.

Chersodoma candida Phil.
Sinónimos: *Senecio chersodomus* Reiche, nom. nud., *Senecio oxyodon* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3600-4200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio jodopappus* Sch. Bip. ex Wedd., nom. illeg., *Senecio jodopappus* Sch. Bip.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chachakoma blanca, poq'ot'ula, coquilla.

Chevreulia

Chevreulia diemii Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chevreulia lycopodioides (d'Urv.) DC.
Sinónimos: *Gnaphalium lycopodioides* d'Urv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chevreulia pusilla DC.
Sinónimos: *Chevreulia lanceolata* J. Remy
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chevreulia sarmentosa (Pers.) S.F. Blake
Sinónimos: *Chevreulia stolonifera* Cass., nom. illeg., *Chevreulia thouarsii* J. Remy, nom. illeg., *Tussilago sarmentosa* Pers., *Chaptalia sarmentosa* (Pers.) S.F. Blake

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pasto dulce.

Chiliotrichum

Chiliotrichum diffusum (G. Forst.) Kuntze
Sinónimos: *Amellus diffusus* G. Forst., *Aster magellanicus* Spreng., hom. illeg., *Chiliotrichum rosmarinifolium* Less., *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg., *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *lanceolatum* Nees, *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *rosmarinifolium* (Less.) Nees, *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *angustifolium* Speg., *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *media* Speg., *Chiliotrichum longifolium* Phil., *Chiliotrichum virgatum* Phil., *Chiliotrichum feliciae* Hombr. & Jacq., *Chiliotrichum angustifolium* Phil., *Chiliotrichum tenue* Phil., *Tropidolepis diffusa* (G. Forst.) Tausch, *Chiliotrichum amelloideum* Cass., nom. illeg. var. *diffusum* (G. Forst.) Nees, *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze fma. *typica* Speg., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Fascine, romerillo.

Chiliotrichum fuegianum (O. Hoffm.) Bonifacino
Sinónimos: *Chiliophyllum fuegianum* O. Hoffm.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chrysanthemoides

Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.
Arbusto. Introducido.
Distribución: VAL, RME.

Chrysanthemum

Chrysanthemum coronarium L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, BIO, JFE.

Chrysanthemum segetum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA.

Chuquiraga

Chuquiraga atacamensis Kuntze
Sinónimos: *Chuquiraga glabra* Phil., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Tajtará, quebraolla, azafrán, lengua de gallo, rezongón.

Chuquiraga kuschelii Acevedo
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2900-3900 m.

Chuquiraga oppositifolia D. Don
Sinónimos: *Barnadesia flavescens* Meyen, *Chuquiraga alpina* Poepp. ex Less., *Chuquiraga chrysantha* Field & Gardner, *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *angustifolia* Ces., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrantha* J. Remy
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba blanca.

Chuquiraga spinosa Less. subsp. *australis* C. Ezcurra
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Ch'ana, chinchillawa macho.

Chuquiraga spinosa Less. subsp. *rotundifolia* (Wedd.) C. Ezcurra
Sinónimos: *Chuquiraga rotundifolia* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. *acicularis* (D. Don) C. Ezcurra
Sinónimos: *Chuquiraga acicularis* D. Don, *Chuquiraga revoluta* Fielding & Gardner
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1200 m.

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. *ulicina*
Sinónimos: *Chuquiraga incana* D. Don, *Chuquiraga*

ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. var. *incana* (Phil.) I.M. Johnst., *Barnadesia ulicina* Hook. & Arn., *Chuquiraga incana* Phil., nom. illeg.
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Nombre vulgar: Hierba de la yesca, araña de la ballena.

Cichorium

Cichorium intybus L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

Cirsium

Cirsium arvense (L.) Scop.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Cladanthus

Cladanthus mixtus (L.) Chevall.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, BIO.

Coleostephus

Coleostephus myconis (L.) Cass.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, ARA, AIS.

Conyza

Conyza andina J. Remy

Sinónimos: *Conyza dumetorum* Phil., *Conyza hirtella* (DC.) Martic., nom. illeg., *Conyza arvensis* Phil., *Erigeron hirtellus* DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Conyza arabidifolia J. Remy

Sinónimos: *Conyza paulsenii* Phil., *Conyza asperula* Phil., *Conyza coxi* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. *angustifolia* (Cabrera) Cabrera

Sinónimos: *Conyza linearis* DC., *Erigeron bonariensis* L. var. *angustifolius* Cabrera
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. *bonariensis*

Sinónimos: *Conyza hispida* Kunth, *Conyza plebeja* Phil., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron bonariensis* L. fma. *grisea* Chodat, *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Puringa hiva (Rapa Nui).
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández y en la Isla de Pascua.

Conyza bustillosiana J. Remy

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME.

Conyza copiapina Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200-1500 m.

Conyza depilis Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Conyza deserticola Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-4400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Maransela, anojatjinchu, oreja de perro.

Conyza foliosa Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.

Conyza gayana Phil.

Sinónimos: *Conyza consanguinea* Phil., *Erigeron consanguineus* (Phil.) Cabrera, *Conyza araucana* Phil., *Conyza canescens* Phil., *Conyza monticola* Phil., *Conyza vulgaris* Phil., hom. illeg., *Erigeron stenophyllus* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Conyza glabrata Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1000 m.

Conyza larrainiana J. Remy

Sinónimos: *Conyza conglomerata* Phil., *Conyza pratensis* Phil., *Erigeron larrainianus* (J. Remy) Cabrera
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Conyza lateralis Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 500-600 m.

Conyza lechleri (Sch. Bip.) Cabrera

Sinónimos: *Erigeron lechleri* Sch. Bip.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 500-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Conyza pencana Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.

Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. & Lourteig

Sinónimos: *Conyza chilensis* Spreng., *Conyza scabiosaefolia* J. Remy, *Conyza yungasensis* Rusby, *Erigeron chilensis* (Spreng.) D. Don ex G. Don, *Conyza myosotifolia* Kunth, *Inula primulifolia* Lam., *Marsea chilensis* (Spreng.) Kuntze, *Marsea chilensis* (Spreng.) V.M. Badillo, nom. illeg., *Conyza chilensis* Spreng. var. *integrifolia* Phil.
Hierba. Bienal. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Conyza spiculosa (Hook. & Arn.) Zardini

Sinónimos: *Conyza colinensis* Phil., *Conyza patens* Phil., *Erigeron colinensis* Phil., *Erigeron spiculosus* Hook. & Arn., *Erigeron spinulosum* Hook. & Arn. var. *umbrosa* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, MAU.
Nombre vulgar: Huilmo.

Conyza stenophylla Phil.

Sinónimos: *Conyza armeriifolia* Phil., *Conyza linifolia* Phil., hom. illeg., *Erigeron flagellifolius* Cabrera
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-1000 m.

Conyza suffruticosa Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Países limítrofes: Bolivia.

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. ***leiotheca*** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho

Sinónimos: *Conyza bilbaoana* J. Remy, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *leiotheca* (S.F. Blake) Cuatrec., *Conyza elata* Kunth & Bouché, *Conyza myriocephala* J. Remy, *Erigeron bilbaoanus* (J. Remy) Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. var. *floribundum* (Kunth) Cuatrec., *Erigeron bonariensis* L. var. *leiothecus* S.F. Blake, *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch. Bip., *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo var. *leiotheca* (S.F. Blake) V.M. Badillo, *Conyza floribunda* Kunth, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) J.B. Marshall
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Conyza tenera Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.

Conyza thermarum Phil.

Sinónimos: *Erigeron thermarum* (Phil.) Cabrera
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Conyza valdiviana Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.

Coreopsis

Coreopsis suaveolens Sherff

Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3400-3800 m.
Nombre vulgar: Flor amarilla, chirichiri, chilile.

Cotula

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA, IDE.

Cotula coronopifolia L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Cotula mexicana (DC.) Cabrera

Sinónimos: *Cotula minuta* (L.f.) Schinz, nom. illeg., *Hippia minuta* L.f., *Lancisia minuta* (L.f.) Rydb., *Soliva mexicana* DC., *Soliva minuta* (L.f.) Sweet

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pichipichi, champa, t'champa.

Crepis

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Crepis pulchra L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Crepis setosa Haller f.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ARA.

Crepis vesicaria L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: BIO, ARA.

Cuatrecasasiella

Cuatrecasasiella argentina (Cabrera) H. Rob.

Sinónimos: *Luciliopsis argentina* Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2500-4300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Cynara

Cynara cardunculus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.

Dasyphyllum

Dasyphyllum diacanthoides (Less.) Cabrera

Sinónimos: *Chuquiraga leucoxylon* Poepp. ex Less., *Flotovia diacanthoides* Less., *Piptocarpha diacanthoides* Hook. & Arn.

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palo blanco, palo santo, tayu, trevo, tallu.

Dasyphyllum excelsum (D. Don) Cabrera

Sinónimos: *Chuquiraga excelsa* D. Don, *Flotovia excelsa* (D. Don) DC., *Piptocarpha excelsa* (D. Don) Hook. & Arn.

Árbol. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Palo santo.

Delairea

Delairea odorata Lem.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, NUB, BIO, LRI, JFE.

Dendroseris

Dendroseris berteriana (Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *insignis* (Bertero) Johow, *Phoenicoseris berteriana* (Decne.) Skottsb., *Rea berteriana* Decne., *Rea pinnata* Bertero ex Decne. var. *insignis* Bertero

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris gigantea Johow

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris litoralis Skottsb.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris macrantha (Bertero ex Decne.) Skotts.

Sinónimos: *Rea macrantha* Bertero ex Decne.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris macrophylla D. Don

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris marginata (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Dendroseris macrophylla* D. Don var. *marginata* (Bertero ex Decne.) Johow, *Rea marginata* Bertero ex Decne.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris micrantha (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Rea micrantha* Bertero ex Decne., *Rea longifolia* Phil. ex Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris nerifolia (Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Rea leucantha* Bertero, *Rea nerifolia* Decne.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris pinnata (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Phoenicoseris pinnata* (Bertero ex Decne.)

Skotts., *Rea pinnata* Bertero ex Decne.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris pruinata (Johow) Skotts.

Sinónimos: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *pruinata* Johow, *Rea pruinata* (Johow) Skotts.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Dendroseris regia Skotts.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Colecillo, col.

Diplostephium

Diplostephium cinereum Cuatrec.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3800-4400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Koa, koba, koya, hembra.

Diplostephium meyenii Wedd.

Sinónimos: *Aster trachyticus* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Tola, tola del alma, leña quebrolla, manzanillón.

Diplostephium tacorense Hieron.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Dittrichia

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL.

Doniophyton

Doniophyton anomalum (D. Don) Kurtz

Sinónimos: *Chuquiraga anomala* D. Don, *Chuquiraga patagonica* Phil., *Doniophyton andicolum* Wedd., *Doniophyton patagonicum* (Phil.) Hieron.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, ARA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Doniophyton weddellii Katinas & Stuessy

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 1900-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Eclipta

Eclipta prostrata (L.) L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, MAU.

Encelia

Encelia canescens Lam. var. *canescens*
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Encelia canescens Lam. var. *oblongifolia* (DC.) S.F. Blake
Sinónimos: *Encelia oblongifolia* DC.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Nombre vulgar: Coronilla del fraile, incienso.

Encelia canescens Lam. var. *parvifolia* (Kunth) Ball
Sinónimos: *Encelia canescens* Lam. var. *lanuginosa* I.M. Johnst., *Encelia canescens* Lam. var. *tomentosa* (Walp.) Ball, *Encelia parvifolia* Kunth, *Encelia tomentosa* Walp.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Coronilla del fraile, incienso, hormiguero.

Erechtites

Erechtites leptanthus (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio leptanthus* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Eriachaenium

Eriachaenium magellanicum Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron

Erigeron andicola DC.
Sinónimos: *Erigeron araucanus* Phil., *Erigeron ciliaris* Phil., *Erigeron andinus* Phil., *Erigeron biflorus* Phil., *Aster bellidiastrum* Nees ex Walp., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron campanensis Valdeb., Lowrey & Stuessy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Erigeron cinereus Hook. & Arn.
Sinónimos: *Erigeron poeppigii* DC.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron fasciculatus Colla
Sinónimos: *Haplopappus hispidulus* DC., *Aster breviflorus* Phil., *Aster litoralis* Phil., *Erigeron berterianus* DC., *Erigeron subandinus* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Escabiosa.

Erigeron fernandezius (Colla) Harling
Sinónimos: *Erigeron fernandezianus* (Colla) Solbrig, nom. illeg., *Erigeron fruticosum* DC., *Terranea fernandezia* Colla
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Erigeron gilliesii (Hook. & Arn.) Cabrera
Sinónimos: *Aster albertii* Phil., *Aster gayanus* DC., *Aster gilliesii* Hook. & Arn., *Astradelphus chilensis* J. Remy, *Erigeron pratensis* Phil., *Erigeron remyanus* Wedd., *Gusmania chilensis* J. Remy
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 800-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron illapelinus Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2400-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron ingae Skottsbo.
Sinónimos: *Erigeron ingae* Skottsbo. var. *innocentium* Skottsbo., *Erigeron turricola* Skottsbo.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.

Erigeron karvinskianus DC.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, BIO, LRI.

Erigeron leptopetalus Phil.
Sinónimos: *Erigeron brevicaulis* Phil., *Erigeron nubigenus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, RME, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron luteoviridis Skottsbo.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Erigeron luxurians (Skottsbo.) Solbrig
Sinónimos: *Erigeron litoralis* (Phil.) Skottsbo. var. *luxurians* Skottsbo.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Erigeron myosotis Pers.
Sinónimos: *Erigeron fernandezii* Phil., *Erigeron ibari* Phil., *Erigeron lacarensis* Phil., *Erigeron myosotis* Pers. var. *elongatum* Sch. Bip., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *polymorphoides* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *pseudomagellanicus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. fma. *spithameus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *densehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *sparsehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. fma. *tragopogonoides* Skottsbo. ex Vierh., *Erigeron platylepis* Vierh., *Erigeron sullivanii* Hook.f. var. *magellanicum* Sch. Bip., *Erigeron angustifolius* Phil., *Erigeron polyphyllum* Phil., *Erigeron glabratus* Reiche, hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron othonnifolius Hook. & Arn.
Sinónimos: *Aster prostratus* Phil., *Erigeron vidali* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Erigeron patagonicus Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron pulcher Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2700-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Erigeron rosulatus Wedd.
Sinónimos: *Erigeron brittonianus* Rusby, *Erigeron pulvinatus* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Erigeron rupicola Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Erigeron stuessyi Valdeb.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 900-950 m.

Eupatorium

Eupatorium glechonophyllum Less.
Sinónimos: *Ageratina glechonophylla* (Less.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium remyanum* Phil., *Ageratina remyana* (Phil.) R.M. King & H. Rob.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Barba de viejo, barbón.

Eupatorium salvium Colla
Sinónimos: *Aristeguietia salvia* (Colla) R.M. King & H. Rob.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Pegajosa, salvia macho, pega.

Facelis

Facelis plumosa (Wedd.) Sch. Bip.

Sinónimos: *Lucilia plumosa* Wedd.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2800-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip.

Sinónimos: *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *patula* Beauverd, *Facelis apiculata* Cass., nom. illeg., *Gnaphalium retusum* Lam., *Leptalea apiculata* (Cass.) D. Don ex Hook. & Arn., *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *andicola* (Nees) Beauverd, *Helichrysum retusum* Spreng., *Pteropogon chilense* Fisch. & Meyer, nom. nud., *Pteropogon andicola* Ness, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *gigantea* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. var. *candelabrum* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *laxa* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *congesta* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *planifolia* Beauverd, *Facelis retusa* (Lam.) Sch. Bip. fma. *nana* Beauverd

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Flaveria

Flaveria bidentis (L.) Kuntze

Sinónimos: *Ethulia bidentis* L., *Eupatorium chilense* Molina, *Flaveria capitata* Juss. ex Sm., *Flaveria chilensis* (Molina) J.F. Gmel., *Flaveria contrayerba* (Cav.) Pers., *Milleria chiloensis* Juss., nom. nud., *Milleria contrayerba* Cav., *Flaveria bidentis* (L.) B.L. Rob., comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Contrahierba, dasdaqui, daudá, mata gusanos, sinapaya, monte colorado.

Flaveria haumanii Dimitri & Orfila

Sinónimos: *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Flourensia

Flourensia thurifera (Molina) DC.

Sinónimos: *Helianthus thurifera* Molina, *Diomedea thurifera* (Molina) Bertero ex Colla, *Helianthus glutinosus* Hook. & Arn., *Flourensia besseriana* Hook. & Arn., *Helianthus besserianus* (Meyen & Walp.) Benth. & Hook., *Flourensia thurifera* (Molina) DC. var. *lanceolata* J. Remy

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

Nombre vulgar: Incienso, maravilla del campo.

Gaillardia

Gaillardia aristata Pursh

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

Galinsoga

Galinsoga parviflora Cav.

Sinónimos: *Galinsoga quinqueradiata* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Wiborgia parviflora* (Cav.) Kunth

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pacoyuyo, miri vaihi (Rapa Nui).

Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

Gamochaeta

Gamochaeta aliena (Hook. & Arn.) Cabrera

Sinónimos: *Gnaphalium alienum* Hook. & Arn., *Gnaphalium stachydidifolium* Lam. var. *alienum* (Hook. & Arn.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Gamochaeta alpina (Poepp. & Endl.) S.E. Freire & Anderb.

Sinónimos: *Gamochaetopsis alpina* (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire, *Laennecia alpina* Poepp., *Lucilia alpina* (Poepp.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1200-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.

Sinónimos: *Gnaphalium americanum* Mill., *Gnaphalium purpureum* L. var. *americanum* (Mill.) Klatt, *Gnaphalium spicatum* Mill. var. *chonticum* Hook.f.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
Rango altitudinal: 0-3200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernández y en
la Isla de Pascua.

Gamochaeta andina (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium andinum* Phil., *Gnaphalium
petraeum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2400-2700 m.

Gamochaeta axillaris (J. Remy) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium axillare* J. Remy, *Gnaphalium
stachydifolium* Lam. var. *axillare* (J. Remy) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1700-2000 m.

Gamochaeta chamissonis (DC.) Cabrera
Sinónimos: *Gamochaeta polybotrya* (Phil.) Cabrera,
Gamochaeta julietii (Phil.) Anderb., *Gamochaeta serranoi*
(Phil.) Cabrera, *Gnaphalium chamissonis* DC., *Gnaphalium
fernandezianum* Phil., *Gnaphalium julietii* Phil.,
Gnaphalium polybotryum Phil., *Gnaphalium purpureum*
L. var. *chamissonis* (DC.) Klatt, *Gnaphalium purpureum*
L. var. *julietii* (Phil.) Reiche, *Gnaphalium serranoi* Phil.,
Gamochaeta fernandeziana (Phil.) Anderb., *Gnaphalium
suffruticosum* Phil., *Gamochaeta suffruticosa* (Phil.) Anderb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 1000-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta depilata (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium depilatum* Phil., *Gnaphalium
obscurum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta deserticola Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, BIO, ARA,
MAG.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 950-1940 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta filaginea (DC.) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium filaginea* DC., *Gamochaeta
berteriana* (DC.) Cabrera, *Gnaphalium berterianum* DC.,
Gnaphalium stachydifolium Lam. var. *berterianum* (DC.)
Klatt, *Gnaphalium bellidifolium* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Gamochaeta humilis Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Gamochaeta neuquensis Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta nivalis Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium nivale* Phil., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA,
AIS, MAG.
Rango altitudinal: 800-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta oligantha (Phil.) L.E. Navas
Sinónimos: *Gnaphalium oliganthum* Phil., *Gamochaeta
monticola* (Phil. ex Reiche) Cabrera, *Gnaphalium monticola*
Phil. ex Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta procumbens (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium procumbens* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB, MAG.
Rango altitudinal: 900-1500 m.

Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: IPA.

Gamochaeta ramosa S.E. Freire, N. Bayón & C.M. Baeza
Sinónimos: *Gnaphalium ramosum* Phil., nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-3000 m.

Gamochaeta serpyllifolia Wedd.
Sinónimos: *Gamochaeta munnozii* Cabrera, nom. illeg.,
Gnaphalium serpyllifolium J. Remy, hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta simplicicaulis (Willd. ex Spreng.) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium purpureum* L. var. *simplicicaule*
(Willd. ex Spreng.) Klatt, *Gnaphalium simplicicaule* Willd.
ex Spreng.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta spiciformis (Sch. Bip.) Cabrera
Sinónimos: *Gamochaeta foliosa* (Phil.) Anderb.,
Gnaphalium foliosum Phil., *Gamochaeta peteroana* (Phil.)
Anderb., *Gnaphalium mucronatum* Phil., nom. illeg.,
Gnaphalium peteroanum Phil., *Gnaphalium purpureum* L.
var. *mucronatum* (Phil.) Skottsbo., *Gnaphalium spiciforme*
Sch. Bip., *Gamochaeta chilensis* Deble
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta stachydifolia (Lam.) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium purpureum* L. var. *stachydifolium*
(Lam.) Baker, *Gnaphalium stachydifolium* Lam.,
Gnaphalium agreste Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, BIO, LRI, JFE.
Rango altitudinal: 400-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium subfalcatum* Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamochaeta valparadisea (Phil.) Anderb.
Sinónimos: *Gnaphalium valparadiseum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, MAU.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Gamochaeta villaroelii (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Gnaphalium villaroelii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.

Gochnatia

Gochnatia foliolosa (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var.
fascicularis (D. Don) Cabrera
Sinónimos: *Gochnatia fascicularis* (D. Don) D. Don ex
Hook. & Arn., *Gochnatia multiflora* F. Phil., *Pentaphragus*
fascicularis D. Don
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Nombre vulgar: Mira.

Gochnatia foliolosa (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var.
foliolosa
Sinónimos: *Gochnatia australis* Phil., *Gochnatia*
berteroana Phil., *Gochnatia cuspidata* Phil., *Gochnatia*
integerrima Phil., *Gochnatia laxiflora* Phil., *Gochnatia*
litoralis Phil., *Gochnatia pyrifolia* (D. Don) D. Don ex
Hook. & Arn., *Gochnatia racemosa* Phil., *Gochnatia rigida*
D. Don ex Hook. & Arn., *Pentaphragus foliolosus* D. Don,
Pentaphragus pyrifolius D. Don
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Nombre vulgar: Mira, mira-mira.

Grindelia

Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera
Sinónimos: *Grindelia foliosa* D. Don ex Hook. & Arn.,
Haplopappus hoorebekia DC., nom. illeg., *Hoorebekia*
chiloense Cornel.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LLA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Grindelia glutinosa (Cav.) Mart.
Sinónimos: *Aster glutinosus* Cav., *Grindelia glutinosa*
(Cav.) Dunal, nom. illeg., *Grindelia montana* Phil.
Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 500 m.
Países limítrofes: Perú.

Grindelia tarapacana Phil.

Sinónimos: *Grindelia obovata* Rusby
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2500 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Chiñechinchillawa, keñakeña, bailahuén.

Gutierrezia

Gutierrezia baccharoides Sch. Bip.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gutierrezia espinosae Acevedo

Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Gutierrezia gayana (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Brachyris gayana* (J. Remy) J. Remy,
Odontocarpa gayana J. Remy
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Nombre vulgar: Monte amarillo.

Gutierrezia neaeana (DC.) Sch. Bip. ex S.F. Blake

Sinónimos: *Brachyris neaeana* DC.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Gutierrezia resinosa (Hook. & Arn.) S.F. Blake

Sinónimos: *Brachyris floribunda* Phil., *Brachyris paniculata* DC., *Galinsoga resinosa* Hook. & Arn., *Gutierrezia compacta* Phil., *Gutierrezia laricifolia* D. Don, *Odontocarpa poeppigii* DC.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Nombre vulgar: Delgadilla, monte amarillo, pichanilla, pichana.

Gutierrezia taltalensis Phil.

Sinónimos: *Gutierrezia copiapina* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Guynesomia

Guynesomia scoparia (Phil.) Bonifacino & Sancho

Sinónimos: *Hinterhubera scoparia* (Phil.) Cabrera,
Nardophyllum scoparium Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1400-3000 m.

Gypothamnium

Gypothamnium pinifolium Phil.

Sinónimos: *Plazia pinnifolia* (Phil.) O. Hoffm.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Palo de yote.

Haplopappus

Haplopappus angustifolius (DC.) Reiche subsp. *angustifolius*

Sinónimos: *Haplopappus durus* Reiche, *Pyrrocoma angustifolia* DC., *Pyrrocoma rigida* Phil., *Aster atenes* Kuntze, *Aster sternbergii* Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Bailahuen.

Haplopappus angustifolius (DC.) Reiche subsp. *saxatilis* (J. Remy) Klingeb.

Sinónimos: *Haplopappus saxatilis* (Remy) Reiche, *Haplopappus sphacelatus* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma saxatilis* J. Remy, *Aster saxatilis* (J. Remy) Kuntze, *Haplodiscus sphacelatus* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, RME, MAU.
Rango altitudinal: 400-1700 m.

Haplopappus anthylloides Meyen & Walp.

Sinónimos: *Haplopappus radicans* J. Remy, *Aster anthylloides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Aster radicans* (J. Remy) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 700-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus arbutoides J. Remy

Sinónimos: *Aster arbutoides* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus obovatus* Phil., *Haplopappus baccharidifolius* Phil., *Haplopappus zanartui* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus zanartui* Phil.
Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 700-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus baylahuen J. Remy subsp. ***baylahuen***

Sinónimos: *Haplopappus lastarrianus* J. Remy, *Haplopappus medicinalis* Phil., *Aster baylahuen* (J. Remy) Kuntze, *Aster lastarrianus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus domeykoi* Phil., *Haplopappus fluehmannii* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2700-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Bailahuen.

Haplopappus baylahuen J. Remy subsp. ***fluehmannii*** (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus fluehmannii* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2400-3700 m.

Nombre vulgar: Bailahuen.

Haplopappus bezanillanus (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Pyrrocoma bezanillana* J. Remy, *Aster bezanillanus* Kuntze

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-2800 m.

Haplopappus bustillosianus J. Remy

Sinónimos: *Aster bustillosianus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus australis* Phil., *Haplopappus patagonicus* Phil., *Haplopappus subandinus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus cerberoanus (J. Remy) Reiche subsp. ***cerberoanus***

Sinónimos: *Pyrrocoma cerberoana* J. Remy, *Aster cerberoanus* (J. Remy) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

Haplopappus cerberoanus (J. Remy) Reiche subsp. ***elquianus*** Klingenb.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 800-2000 m.

Haplopappus chrysanthemifolius (Less.) DC.

Sinónimos: *Haplopappus berteri* DC., *Haplopappus leucanthemifolius* Phil., *Grindelia glutinosa* Bertero, *Andromachia alternifolia* Kuntze, *Diplopappus chrysanthemifolius* Less.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Haplopappus coquimbensis (Hook. & Arn.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus acanthodon* Phil., *Haplopappus hirsutus* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *hirsutus* (Phil.) Reiche, *Diplopappus coquimbensis* Hook. & Arn., *Haplopappus hirtellus* Phil., *Aster hirtellus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus limarensis* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *limarensis* Reiche, *Haplopappus vidalii* Phil., *Haplodiscus elatus* Phil., *Haplopappus elatus* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 10-1000 m.

Haplopappus decurrens J. Remy

Sinónimos: *Aster remyanus* Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Haplopappus deserticolus Phil.

Sinónimos: *Haplopappus involucratus* Phil., *Haplopappus rengifoanus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Haplopappus diplopappus J. Remy subsp. ***diplopappus***

Sinónimos: *Aster diplopappus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus pallidus* Phil., *Haplopappus heterophysus* Phil., *Haplopappus marginalis* Phil. var. *heterophysus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus petersianus* Phil., *Haplopappus reticulatus* Phil., *Aster venosus* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 800-3540 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Blanquillo.

Haplopappus diplopappus J. Remy subsp. ***villosus*** (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus villosus* Phil., *Aster villiger* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus donianus (Hook. & Arn.) Reiche
Sinónimos: *Diplopappus donianus* Hook. & Arn.,
Haplodiscus tenuifolius Phil., *Haplodiscus exserens* Phil.,
Haplopappus canescens (Phil.) Reiche var. *exserens* Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Haplopappus foliosus (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Sinónimos: *Aster polyphyllus* (Phil.) Kuntze, *Aster foliosus* (DC.) Kuntze, *Diplopappus foliosus* Hook. & Arn., *Haplopappus foliosus* DC., *Haplodiscus polyphyllus* Phil., *Haplopappus phyllophorus* Reiche, *Haplodiscus densifolius* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-750 m.
Nombre vulgar: Cuerno de cabra, palo negro.

Haplopappus glabratus Phil.
Sinónimos: *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glabratus* (Phil.) Reiche, *Aster glabratus* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1600-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus glutinosus Cass.
Sinónimos: *Aster senebierifolius* Kuntze, nom. illeg.,
Diplopappus coronopifolius Less., nom. illeg., *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 10-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Buchú.

Haplopappus grindelioides (Less.) DC.
Sinónimos: *Aster marginalis* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus marginalis* Phil., *Haplopappus corniculatus* Phil., *Haplopappus heterocomus* Phil., *Haplopappus reflexus* Phil., *Diplopappus grindelioides* Less., *Aster reversus* Kuntze, *Aster grindelioides* (Less.) Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 600-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus humilis (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Haplodiscus humilis* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 160-1100 m.

Haplopappus integerrimus (Hook. & Arn.) H.M. Hall
Sinónimos: *Haplopappus acerosus* (Bertero) Phil.,
Haplopappus pulchellus DC. var. *elongaus* J. Remy,
Grindelia acerosa Bertero ex Phil., nom. nud., *Diplopappus integerrimus* Hook. & Arn., *Steriphe acerosa* (Bertero ex Phil.) Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 500-2000 m.

Haplopappus linifolius (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Pyrrhocoma linifolia* Phil., *Aster linoides* Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

Haplopappus litoralis Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Haplopappus macrocephalus (Poepp. ex Less.) DC.
Sinónimos: *Haplopappus caespitosus* Nutt., *Diplopappus macrocephalus* Poepp. ex Less., *Aster macrocephalus* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Haplopappus scaposus* J. Remy, *Haplopappus spinulosus* Phil., *Haplopappus serrulatus* Reiche, *Aster spinuliger* Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 100-2000 m.

Haplopappus maulinus Klingenb.
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, BIO.
Rango altitudinal: 400-2300 m.

Haplopappus meyenii Walp.
Sinónimos: *Haplopappus foliosus* DC. subsp. *meyenii* (Walp.) Klingenb., *Aster meyenii* (Walp.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Haplopappus mucronatus (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
Sinónimos: *Baccharis mucronata* Hook. & Arn., hom. illeg.,
Haplopappus fonckii Phil., *Haplopappus hookerianus* DC.,
Haplopappus ilicifolius J. Remy, *Diplopappus mucronatus* Hook. & Arn., *Baccharis hookeriana* DC., *Aster ilicifolius* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus axilliflorus* Phil., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy var. *platylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus platylepis* Phil., *Haplopappus macraenus* (Remy) Reiche, *Pyrrhocoma macraena* Remy,

Aster macraenus (Remy) Kuntze, *Aplopappus macraenus* Gray, comb. inval.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-900 m.

Haplopappus multifolius Phil. ex Reiche subsp. ***baccharidiformis*** Klingeb.
Arbusto. Endémico.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1800 m.

Haplopappus multifolius Phil. ex Reiche subsp. ***multifolius***
Sinónimos: *Haplopappus rotundifolius* H.M. Hall, *Pyrrocoma foliosa* Phil., *Aster multifolius* (Phil. ex Reiche) Kuntze, *Diplopappus foliolosus* Hook. & Arn., *Diplopappus ilicifolius* Hook. & Arn.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 700-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus multifolius Phil. ex Reiche subsp. ***ovalifolius*** Klingeb.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1300-3200 m.

Haplopappus nahuelbutae Klingeb.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 100-1460 m.

Haplopappus ochagavianus Phil.
Sinónimos: *Haplopappus tiltiensis* (Phil.) Reiche, *Aster ochayaviensis* Kuntze, *Haplopappus reicheanus* H.M. Hall, *Haplopappus vernicosus* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 100-2200 m.

Haplopappus parvifolius (DC.) Gay
Sinónimos: *Pyrrocoma parvifolia* DC., *Aster parvifolius* (DC.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Nombre vulgar: Crespilla.

Haplopappus paucidentatus Phil.
Sinónimos: *Aster oligodontus* Kuntze, *Haplopappus glutinosus* (Less.) DC., hom. illeg., *Diplopappus glutinosus* Less., *Aster glutinosus* (Less.) Kuntze, *Haplopappus prostratus* Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 950-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus philippii (Kuntze) H.M. Hall
Sinónimos: *Haplopappus paniculatus* Phil., *Aster philippii* Kuntze, *Haplopappus brevibradiatus* Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Haplopappus pinea (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Pyrrocoma pinea* Phil., *Aster pineus* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2000-2400 m.

Haplopappus pinnatifidus Nutt.
Sinónimos: *Haplopappus setigerus* (Phil.) Meigen, *Pyrrocoma nuttalli* J. Remy, nom. illeg., *Aster andinus* Kuntze, *Diplopappus setiger* Hook. & Arn., *Pyrrocoma setigera* Phil., *Aster setiger* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 550-1200 m.

Haplopappus poeppigianus (Hook. & Arn.) A. Gray
Sinónimos: *Diplopappus poeppigianus* Hook. & Arn., *Haplodiscus polycladus* Phil., *Haplopappus argenteus* Steud., *Haplodiscus polycladus* Phil., *Haplopappus canescens* (Phil.) Reiche, *Grindelia canescens* Bertero, *Pyrrocoma canescens* Phil., *Aster griseus* Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Haplopappus pulchellus DC.
Sinónimos: *Aster valparaisanus* Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 300-1600 m.

Haplopappus punctatus (Willd.) H.M. Hall
Sinónimos: *Haplopappus chamissonis* (Less.) DC., *Conyza punctata* Willd., *Diplopappus chamissonis* Less., *Diplopappus punctatus* Less. ex DC., *Aster adalbertii* Kuntze, *Haplopappus corymbosus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus rosmarinifolius* Reiche, *Steriphe corymbosa* Phil., *Aster pedunculatus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus pedunculatus* J. Remy, *Haplopappus integerrimus* (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. *punctatus* (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark

Arbusto. Endémico.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 100-1600 m.

Haplopappus pusillus Klingenb.

Sinónimos: *Diplopappus bellidifolius* Hook. & Arn.,
Haplopappus cuneifolius Nutt., *Aster cuneifolius* (Nutt.)
Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus racemiger Klingenb.

Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 30-560 m.

Haplopappus remyanus Wedd.

Sinónimos: *Haplopappus prinophyllus* Phil., *Pyrrcoma*
ilicifolia J. Remy, *Aster remyanus* (Wedd.) Kuntze,
Haplodiscus vernicosus Phil., *Haplopappus latifolius*
(Phil.) Reiche, *Haplodiscus latifolius* Phil., *Haplodiscus*
vernicosus Phil., *Haplodiscus vernicosus* Phil. var. *geissei*
Phil., *Haplodiscus kingii* Phil., *Haplopappus kingii* (Phil.)
Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 300-2500 m.
Nombre vulgar: Bailahuen.

Haplopappus rengifoanus J. Remy

Sinónimos: *Aster rengifoanus* (J. Remy) Kuntze,
Haplodiscus pachyphyllus Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-700 m.

Haplopappus retinervius (Kuntze) Klingenb.

Sinónimos: *Aster retinervius* Kuntze, *Pyrrhocomma*
reticulata Phil., *Haplopappus reticulatus* (Phil.) Reiche nom. illeg.,
Haplopappus ischnos (Phil.) Reiche, *Haplodiscus ischnos*
Phil., *Haplodiscus landbecki* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 500-1800 m.

Haplopappus rigidus Phil.

Sinónimos: *Haplopappus villanuevae* Phil., *Aster*
atacamensis Kuntze, nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Bailahuen, gualavina, chajchajra.

Haplopappus rosulatus H.M. Hall

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Haplopappus schumannii (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark

Sinónimos: *Haplopappus armerioides* Phil., *Haplopappus*
poeppigianus (Hook. & Arn.) A. Gray var. *radiatus* A. Gray,
Haplopappus sericeus Phil., *Aster schumannii* Kuntze,
Steriphe navarri Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1400-3000 m.

Haplopappus scrobiculatus (Nees) DC.

Sinónimos: *Aster densifolius* (J. Remy) Kuntze, *Aster*
scrobiculatus (Nees) Kuntze, *Diplopappus cuneatus* Hook.
& Arn., *Diplopappus scrobiculatus* Nees, *Haplopappus*
densifolius J. Remy, *Perezia spathulata* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA.
Rango altitudinal: 2600-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus setulosus Klingenb.

Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB.
Rango altitudinal: 250 m.

Haplopappus stelliger J. Remy

Sinónimos: *Aster stelliger* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus*
denticulatus (Phil.) Reiche, *Pyrrhocomma denticulata* Phil.,
Aster denticulatus (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.

Haplopappus stolpii Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 50-700 m.

Haplopappus taeda Reiche

Sinónimos: *Haplodiscus peteroanus* Phil., *Haplopappus*
graveolens (Phil.) Reiche, *Haplodiscus graveolens* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 300-2000 m.

Haplopappus uncinatus Phil.

Sinónimos: *Haplopappus candolei* Phil., *Haplopappus*
uncinatus Phil. var. *candolei* (Phil.) Reiche, *Diplopappus*
canescens Hook. & Arn., *Aster uncinatus* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2500 m.

Haplopappus undulatus Klingenb.

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Haplopappus valparadisiacus Klingenb.

Sinónimos: *Diplopappus inuloides* Hook. & Arn., *Haplopappus berteroi* var. *lanceolatus* DC., *Haplopappus formosus* Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 10-60 m.

Haplopappus velutinus J. Remy subsp. *illinitus* (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplopappus illinitus* Phil., *Aster illinitus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus glutinosus* Cass. var. *illinitus* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 800 m.

Haplopappus velutinus J. Remy subsp. *longipes* (Phil.) Klingenb.

Sinónimos: *Haplodiscus longiscapus* Phil., *Haplopappus longipes* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma longipes* Phil., *Aster longipes* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 800-2300 m.

Haplopappus velutinus J. Remy subsp. *velutinus*

Sinónimos: *Haplopappus virgatus* Phil., *Haplopappus longiscapus* Phil., *Haplopappus stenophyllus* Phil., *Haplopappus fallax* (Phil.) Reiche, *Haplodiscus fallax* Phil., *Aster gayanus* Kuntze, *Aster scopiformis* Phil., *Diplopappus glutinosus* Hook. & Arn., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1300-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Haplopappus vicuniensis Klingenb.

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.

Hedypnois

Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.
Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, MAU, BIO, ARA.

Helenium

Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey

Sinónimos: *Cephalophora aromatica* (Hook.) Schrad., *Cephalophora collina* Phil., *Cephalophora lanceolata* Phil., *Cephalophora tenera* Cass., *Graemia aromatica* Hook., *Helenium collinum* (Phil.) F. Meigen, *Gaillardia aromatica* (Hook.) Baill.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Manzanilla del campo.

Helenium atacamense Cabrera

Sinónimos: *Cephalophora litoralis* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Helenium glaucum (Cav.) Stuntz

Sinónimos: *Cephalophora berteriana* Phil., *Cephalophora borchersii* Phil., *Cephalophora foliosa* Phil., *Cephalophora glauca* Cav., *Cephalophora gracilis* Phil., *Cephalophora plantaginea* DC., *Cephalophora plantaginea* DC. var. *spathulata* (F. Phil.) Reiche, *Cephalophora punctata* Klatt, *Cephalophora rigida* Phil., *Cephalophora spathulata* F. Phil., *Cephalophora stolpii* Phil., *Heleniastrum glaucum* (Cav.) Kuntze, *Gaillardia glauca* (Cav.) Baill., *Helenium borchersii* (Phil.) Cabrera, *Helenium foliosum* (Phil.) Cabrera, *Helenium gracile* (Phil.) Cabrera, *Hymenopappus glaucus* (Cav.) Spreng., *Helenium plantagineum* (DC.) J.F. Macbr.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Nombre vulgar: Poquil.

Helenium insulare (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Actinea insularis* (Phil.) Kuntze, *Cephalophora insularis* Phil.
Hierba. Bienal o perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Helenium ovallense Bierner
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 200-400 m.

Helenium urmenetae (Phil.) Cabrera var. ***leguiffei*** (Phil.)
Bierner
Sinónimos: *Cephalophora leguiffei* Phil., *Cephalophora*
peraltae Phil., *Helenium leguiffei* (Phil.) J.F. Macbr.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-1300 m.

Helenium urmenetae (Phil.) Cabrera var. ***urmenetae***
Sinónimos: *Cephalophora setigera* Phil., *Cephalophora*
urmenatae Phil., *Helenium longiaristatum* (Phil.) Cabrera
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Helenium vallenariense (Phil.) Bierner
Sinónimos: *Cephalophora vallenariense* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 400-1200 m.

Helianthus

Helianthus tuberosus L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LLA.

Helminthotheca

Helminthotheca echioides (L.) Holub
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,
BIO, ARA, LLA.

Helogyne

Helogyne apaloidea Nutt.
Sinónimos: *Brachyandra tenuifolia* (Phil.) Reiche, *Leto*
tenuifolia Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 700-3200 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Chilisaya, tola.

Helogyne macrogyne (Phil.) B.L. Rob.
Sinónimos: *Brachyandra macrogyne* Phil.
Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-3800 m.
Nombre vulgar: Tíkara.

Heterosperma

Heterosperma nanum (Nutt.) Sherff
Sinónimos: *Bidens involucrata* Phil., *Heterosperma*
involucratum (Phil.) Reiche, *Microdonta nana* Nutt.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Heterosperma ovatifolium Cav.
Sinónimos: *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *ovatifolium*
(Cav.) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Hieracium

Hieracium antarcticum d'Urv.
Sinónimos: *Hieracium antarcticum* d'Urv. var.
myosotidifolium (Sch. Bip.) Sleumer, *Hieracium andinum*
Phil., *Hieracium gracile* Hook. subsp. *andinum* (Phil.)
Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *antarcticum* (d'Urv.)
Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *myosotidifolium*
(Sch. Bip.) Zahn, *Hieracium magellanicum* Sch. Bip.,
Hieracium myosotidifolium Sch. Bip., *Hieracium philippii*
Albov, *Hieracium triste* Macloskie, hom. illeg., *Pilosella*
magellanica (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella*
myosotidifolia (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hieracium aurantiacum L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA, MAG.

Hieracium chilense Less.
Sinónimos: *Hieracium gayanum* Arv.-Touv., *Hieracium*
orthotrichum R.E. Fr., *Pilosella chilensis* (Less.) F.W.
Schultz & Sch. Bip., *Pilosella orthotricha* (R.E. Fr.) F.W.
Schultz & Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA,
AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Hieracium glaucifolium Poepp. ex Froel.

Sinónimos: *Hieracium chilense* Ball, *Pilosella glaucifolia* (Poepp. ex Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Hieracium chilense* Skottsbl., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hieracium patagonicum Hook.f.

Sinónimos: *Hieracium chilense* Less. var. *navarinum* Zahn, *Hieracium poeppigianum* Zahn, *Pilosella patagonica* (Hook.f.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hieracium pilosella L. subsp. *euronotum* Nägeli & Peter

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Hypochaeris

Hypochaeris acaulis (J. Remy) Britton

Sinónimos: *Achyrophorus acaulis* J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris apargioides Hook. & Arn.

Sinónimos: *Hypochaeris berteri* Colla, *Achyrophorus apargioides* (Hook. & Arn.) DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Nombre vulgar: Escorzonera.

Hypochaeris arenaria Gaudich.

Sinónimos: *Achyrophorus andinus* DC., *Achyrophorus arenarius* (Gaudich.) DC., *Achyrophorus humilis* Phil., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *andina* (DC.) Cabrera, *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris humilis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris pygmaea* Phil., *Leontodon arenarius* (Gaudich.) Albov, *Hypochaeris psychrophila* (Wedd.) Reiche, *Seriola andina* DC., nom. illeg., *Achyrophorus psychrophilus* Wedd., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *laciniata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris chondrilloides (A. Gray) Cabrera

Sinónimos: *Achyrophorus chondrilloides* A. Gray, *Achyrophorus deserticola* Phil., *Achyrophorus glaucus* Phil., *Oreophila chondrilloides* D. Don ex A. Gray, nom. illeg., *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Oreophila chondrilloides* Hook. & Arn., nom. nud., *Hypochaeris glabrata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Lokoche, romaza.

Hypochaeris clarionoides (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Achyrophorus clarionoides* J. Remy, *Achyrophorus microphyllus* J. Remy, *Hypochaeris clarionoides* (J. Remy) Reiche var. *microphylla* (J. Remy) Cabrera, *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *clarionoides* (J. Remy) Bortiri, *Hypochaeris microphylla* (J. Remy) Reiche, *Hypochaeris nana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAG.

Rango altitudinal: 2500-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris cupressorum F. Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Hypochaeris deserticola Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Hypochaeris eremophila Cabrera

Sinónimos: *Distoecha taraxacoides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2800-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hypochaeris foliosa (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Achyrophorus foliosus* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Hypochaeris gayana (DC.) Cabrera

Sinónimos: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *gayanus* DC.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris glabra* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA,
MAG, JFE, IPA.

***Hypochaeris grandidentata* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus grandidentatus* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 200-2500 m.
Nombre vulgar: Cerrajilla, renca.

***Hypochaeris hispidula* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *incana

Sinónimos: *Achyrophorus incanus* (Hook. & Arn.) Sch.
Bip., *Seriola incana* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *integrifolia* (Sch. Bip.) Cabrera**

Sinónimos: *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip.,
Hypochaeris arenaria Gaudich. var. *coronopifolia*
(Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris ibari* Phil., *Leontodon*
coronopifolium (Sch. Bip.) Comm. ex Albov, *Hypochaeris*
coronopifolia (Sch. Bip.) Franch.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris laciniosa* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Hypochaeris lessingii* (Sch. Bip.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus lessingii* Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

***Hypochaeris melanolepis* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Benth. & Hook.f. ex Griseb.**

Sinónimos: *Oreophila meyeniana* Walp., *Achyrophorus*
meyenianus (Walp.) Walp.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3300-3900 m.
Países limítrofes: Perú.

***Hypochaeris montana* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus montanus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1800-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris nahuelvutae* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

***Hypochaeris palustris* (Phil.) De Wild.**

Sinónimos: *Achyrophorus palustris* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Hypochaeris pilosa* Reiche**

Sinónimos: *Hypochaeris hirta* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Hypochaeris radicata* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Hypochaeris scorzonerae* (DC.) F. Muell. var. *glabrata* (DC.) Reiche**

Sinónimos: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *glabrata*
DC., *Hypochaeris chrysantha* Poepp. ex DC., *Oreophila*
taraxacoides Don, *Seriola taraxacoides* (Don) Hook. &
Arn., *Achyrophorus chrysanthus* DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F. Muell. var. ***ramosa*** (DC.) Reiche

Sinónimos: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *ramosa* DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F. Muell. var. ***scorzonerae***

Sinónimos: *Hypochaeris sonchoides* Kunth, *Achyrophorus scorzonerae* DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Escorzonera.

Hypochaeris spathulata (J. Remy) Reiche var. ***chiloensis*** (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy var. *chiloensis* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Hypochaeris spathulata (J. Remy) Reiche var. ***spathulata***

Sinónimos: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Hypochaeris taraxacoides Ball

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2600-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Psiñe de burro, jap'epsike, waripsike.

Hypochaeris tenerifolia (J. Remy) Dusén

Sinónimos: *Achyrophorus tenerifolius* J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. ***eurylepis*** (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Achyrophorus araucanus* Phil., *Achyrophorus odoratus* (Poepp. & Endl.) Walp., *Oreophila odorata* Poepp. & Endl., *Hypochaeris eurylepis* Phil., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. ***linearifolia*** (DC.) Bortiri

Sinónimos: *Achyrophorus graminifolius* Phil., nom. nud., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *linearifolius* DC., *Hypochaeris graminifolia* Phil., *Achyrophorus angustissimus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. ***tenuifolia***

Sinónimos: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC., *Seriola tenuifolia* Hook. & Arn., *Hypochaeris spinuligera* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris volckmannii* (Phil.) Phil., *Oreophila tenuifolia* D. Don ex Hook. & Arn., nom. illeg., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *neaeanus* DC., *Achyrophorus spinuliger* Phil., *Achyrophorus volckmannii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1300-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Escorzonera.

Hypochaeris thermanum Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2500-3400 m.

Hypochaeris thrincioides (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Achyrophorus brevicaulis* Phil., *Achyrophorus philippi* Sch. Bip. ex Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Hypochaeris toltensis Reiche

Sinónimos: *Hypochaeris grandiflora* F. Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Jungia

Jungia polita Griseb.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nota: No hay registros en herbarios nacionales. Duplicados en GH, NY, US, recolectados por Shepard en la Provincia de Tarapacá (TAR). Ver Harling, 1995. Acta Regiae Soc. Litt. Gothob., Bot. 4:5-133.

Kieslingia

Kieslingia chilensis Faúndez, Saldivia & A.E. Martic.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1600-2500 m.

Lactuca

Lactuca sativa L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, RME.

Lactuca serriola L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Lactuca virosa L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Laennecia

Laennecia artemisioides (Meyen & Walp.) G.L. Nesom

Sinónimos: *Conyza artemisioides* Meyen & Walp., *Conyza andicola* Phil., *Erigeron artemisioides* (Meyen & Walp.)

Sch. Bip., *Marsea artemisiaefolia* (Meyen & Walp.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.

Rango altitudinal: 3500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Lagenophora

Lagenophora hariotii Franch.

Sinónimos: *Lagenifera hariotii* (Franch.) T.R. Dudley, comb. illeg., *Lagenophora hirsuta* auct. non Less.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lagenophora hirsuta Poepp. ex Less.

Sinónimos: *Lagenophora commersonii* Cass. var. *hirsuta* (Poepp. ex Less.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lagenophora nudicaulis (Comm. ex Lam.) Dusén

Sinónimos: *Aster nudicaulis* Comm. ex Lam., *Bellis magellanica* DC., *Calendula magellanica* Willd., *Lagenifera nudicaulis* (Comm. ex Lam.) T.R. Dudley, *Lagenophora commersonii* Cass., *Lagenophora purpurascens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lapsana

Lapsana communis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Lasthenia

Lasthenia kunthii (Less.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Hymenatherum kunthii* Less., *Lasthenia bridgesii* (Poepp. & Endl.) Steud., *Lasthenia chilensis* Steud., nom. nud., *Lasthenia obtusifolia* Cass., *Lasthenia obtusifolia* Cass. var. *bridgesii* (Poepp. & Endl.) DC., *Rancagua bridgesii* Poepp. & Endl., *Rancagua feuillei* (Bertero ex Colla) Poepp. & Endl., *Tagetes feuillei* Bertero ex Colla

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Rancagua.

Leontodon

Leontodon autumnalis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAG.

Leontodon hirtus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, NUB, BIO, LRI, LLA.

Leontodon saxatilis Lam.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Lepidophyllum

Lepidophyllum cupressiforme (Lam.) Cass.

Sinónimos: *Baccharis cupressiformis* (Lam.) Pers., *Conyza cupressiformis* Lam., *Gutierrezia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip., *Athanasia cupressiformis* (Lam.) Comm. ex Cass., *Brachyridium cupressiforme* (Lam.) Meisn., nom. illeg., *Grindelia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip. ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leptinella

Leptinella scariosa Cass.

Sinónimos: *Cotula acaenoides* (Hook. & Arn.) Alb., *Cotula hombroni* Franch., *Cotula scariosa* (Cass.) Franch., *Leptinella acaenoides* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leptocarpha

Leptocarpha rivularis DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Palo negro.

Leucanthemum

Leucanthemum vulgare Lam.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,

LLA, MAG.

Leucheria

Leucheria achillaeifolia Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chabraea fragans* Phil., *Lasiorrhiza anthemidifolia* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza fragans* (Phil.) Kuntze, *Lasiorrhiza achillaeifolia* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorrhiza ibari* (Phil.) Macloskie, *Leuceria anthemidifolia* Phil., *Leuceria ibari* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria amoena Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria apiifolia Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 2500 m.

Leucheria bridgesii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chabraea pulchella* Phil., *Lasiorrhiza pulchella* (Phil.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria microcephala* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-3300 m.

Leucheria candidissima D. Don

Sinónimos: *Chabraea candidissima* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza candidissima* (D. Don) Macloskie, *Leuceria candidissima* D. Don fma. *subintegra* Skottsb., *Leuceria laciniata* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 2000-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria cerberoana J. Remy

Sinónimos: *Leuceria glabrata* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Leucheria coerulescens J. Remy

Sinónimos: *Leucheria aurita* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria congesta D. Don

Sinónimos: *Chabraea canescens* Phil., *Lasiorrhiza glomerulata* Kuntze, *Leuceria canescens* (Phil.) Reiche, *Leuceria glomerulata* (Kuntze) K. Schum., *Leuceria sonchoides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria cumingii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chabraea modesta* Phil., *Leuceria debilis* Phil., *Leuceria modesta* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Leucheria daucifolia (D. Don) Crisci
Sinónimos: *Ptilurus daucifolius* D. Don, *Chabraea daucifolia* (D. Don) Wedd., *Chabraea laciniata* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2600-4800 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Leucheria floribunda DC.
Sinónimos: *Eizaguirrea candollei* J. Remy, nom. illeg., *Eizaguirrea cirsioides* Phil., *Eizaguirrea sonchifolia* Turcz., *Lasiorrhiza floribunda* (DC.) Kuntze, *Leuceria racemosa* Phil., *Leuceria sonchifolia* (Turcz.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria garciana J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2500 m.

Leucheria gayana (J. Remy) Reiche
Sinónimos: *Chabraea gayana* J. Remy, *Leuceria nudicaulis* Phil., *Leuceria popetana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1800-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria gilliesii Hook. & Arn.
Sinónimos: *Leuceria hieracioides* D. Don, hom. illeg., *Leuceria nivea* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 1900-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria glabriuscula (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Chabraea glabriuscula* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1000 m.

Leucheria glacialis (Poepp. ex Less.) Reiche
Sinónimos: *Chabraea glacialis* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorrhiza glacialis* Poepp. ex Less., *Leuceria araucana* Phil., *Leuceria discolor* Phil., *Leuceria glacialis* (Poepp. ex Less.) Reiche var. *longifolia* (Phil.) Cabrera, *Leuceria longifolia* Phil., *Leuceria pauciflora* Phil., *Leuceria thermanum* (Phil.) Reiche var. *araucana* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria glandulosa D. Don
Sinónimos: *Chabraea elongata* Bertero ex Colla, *Chabraea glandulosa* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza glandulosa* (D. Don) DC., *Leuceria peduncularis* J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.
Rango altitudinal: 600-2000 m.

Leucheria graui Katinas, M.C. Tellería & Crisci
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2200-2400 m.

Leucheria hahnii Franch.
Sinónimos: *Chabraea integrifolia* Phil., hom. illeg., *Lasiorrhiza hahnii* (Franch.) Macloskie, *Leuceria fuegina* Phil., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn. var. *integrifolia* Sch. Bip., *Leucheria gossypina* Hook. & Arn. var. *pinnatifida* Sch. Bip., *Lasiorrhiza fueguiana* (Phil.) Kuntze, *Leucheria integrifolia* (Phil.) Reiche ex B.L. Rob., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *pinnatifida* Sch. Bip., nom. nud., *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC. var. *integrifolia* Sch. Bip., nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria hieracioides Cass.
Sinónimos: *Lasiorrhiza acanthoides* (D. Don) Kuntze, *Lasiorrhiza hieracioides* (Cass.) Kuntze, *Leuceria acanthoides* D. Don, *Leuceria divaricata* D. Don, *Chabraea prenanthoides* Bertero
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2200 m.

Leucheria leontopodioides (Kuntze) K. Schum.
Sinónimos: *Lasiorrhiza leontopodioides* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria lithospermifolia (Less.) Reiche subsp. *integrifolia* (Phil.) Grau & Zinnecker
Sinónimos: *Leucheria integrifolia* (Phil.) Crisci, *Chabraea integrifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Leucheria lithospermifolia (Poepp. ex Less.) Reiche subsp. *lithospermifolia*

Sinónimos: *Chabraea lithospermifolia* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorrhiza lithospermifolia* Poepp. ex Less., *Leuchaeria volcanica* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria magna Phil.

Sinónimos: *Lasiorrhiza stricta* (Phil.) Macloskie, *Leuceria stricta* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria meladensis Katinas, Crisci & A.E. Martic.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1000-1100 m.

Leucheria menana J. Remy

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Leucheria millefolium Dusén & Skottsbo.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria multiflora Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Leucheria nutans (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Chabraea nutans* J. Remy, *Chabraea poeppigii* Phil., *Clybatis volkmanii* Phil., *Lasiorrhiza nutans* (J. Remy) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria oligocephala J. Remy

Sinónimos: *Trixis senecioides* Hook.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Leucheria paniculata Poepp. ex Less.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria papillosa Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria polyclados (J. Remy) Reiche

Sinónimos: *Chabraea polyclados* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3100 m.

Leucheria pteropogon (Griseb.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio pteropogon* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3500-0 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria purpurea (Vahl) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chabraea purpurea* (Vahl) DC., *Perdicium purpureum* Vahl, *Lasiorrhiza purpurea* (Vahl) Less., *Leuceria purpurea* (Vahl) S. Moore ex Rendle

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria rosea Poepp. ex Less.

Sinónimos: *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *albiflora* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less. var. *andryaloides* (DC.) Kuntze, comb. illeg., *Leuceria andryaloides* DC., nom. illeg., *Leucheria lepida* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Leucheria runcinata D. Don

Sinónimos: *Leucheria landbeckii* (Phil.) Reiche, *Chabraea barrasiana* J. Remy, *Chabraea concinna* Phil., *Chabraea coquimbana* Phil., *Chabraea landbeckii* Phil., *Chabraea oligocephala* Phil., *Chabraea runcinata* (D. Don) Hook., *Chabraea tenerifolia* Phil., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche, comb. illeg., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche var. *tenerifolia* (Phil.) Reiche, *Leuceria coquimbana* (Phil.) Reiche, *Leuceria meyeniana* Walp., *Leuceria paucicapitata* Reiche, *Leucheria tenerifolia* (Phil.) Phil., *Leuceria*

concinna (Phil.) Reiche, *Leuceria barrasiana* (J. Remy) F. Meigen, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 3000-0 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Blanquillo.

Leucheria salina (J. Remy) Hieron. subsp. *salina*
Sinónimos: *Chabraea salina* J. Remy, *Chabraea salinasi* Phil. var. *bipinnatifida* Phil., *Lasiorrhiza salina* (J. Remy) Kuntze, *Leuceria salina* (J. Remy) Dusén, comb. illeg., *Leuceria salina* (J. Remy) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria salina (J. Remy) Hieron. subsp. *zöllneri* Crisci
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO.
Rango altitudinal: 3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria scrobiculata D. Don
Sinónimos: *Chabraea glabra* DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC. var. *pentacephala* Phil., *Lasiorrhiza glabra* (DC.) Kuntze, *Lasiorrhiza scrobiculata* (D. Don) Kuntze, *Leuceria scrobiculata* D. Don var. *glabra* (DC.) Hauman, *Mimela pedicularifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1900-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria senecioides Hook. & Arn.
Sinónimos: *Lasiorrhiza cinerea* (D. Don) Less., *Chabraea abbreviata* Bertero ex Colla, *Chabraea cinerea* (D. Don) DC., *Lasiorrhiza senecioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Leuceria abbreviata* (Bertero) Steud., *Leuceria cinerea* D. Don, *Leuceria senecioides* Hook. & Arn. var. *purpurescens* DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Leucheria tenuis Less.
Sinónimos: *Chabraea berteroniana* Steud., *Chabraea tenuior* Bertero ex Colla
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA.
Rango altitudinal: 900-2000 m.

Leucheria thermarum (Phil.) Phil.
Sinónimos: *Chabraea thermarum* Phil., *Leuceria thermarum* (Phil.) Reiche, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leucheria tomentosa (Less.) Crisci
Sinónimos: *Chabraea tomentosa* (Less.) DC., *Lasiorrhiza pulchella* (D. Don) Steud., *Lasiorrhiza tomentosa* Less., *Leuceria eriochlaena* J. Remy, *Leuceria pulchella* D. Don
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Leucheria viscida (Bertero ex Colla) Crisci
Sinónimos: *Chabraea rosea* DC., *Chabraea viscida* Bertero ex Colla, *Chabraea viscosa* Bertero ex DC., nom. nud., *Lasiorrhiza philippiana* Kuntze, *Lasiorrhiza rosea* Less., *Leuceria chillanensis* Reiche, *Leuceria glandulosa* Phil., nom. illeg., *Leuceria leucomalla* Phil., *Leuceria neaei* DC., *Leuceria rosea* (Less.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Leunisia

Leunisia laeta Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Logfia

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Lophopappus

Lophopappus cuneatus R.E. Fr.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2800-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Lophopappus foliosus Rusby
Sinónimos: *Proustia foliosa* (Rusby) Ferreyra
Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Lophopappus tarapacanus (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Gochnatia tarapacana* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2200-4700 m.
Nombre vulgar: Tajana, tagtaga, chari, moñe, leñadura.

Lucilia

Lucilia eriophora J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Lycapsus

Lycapsus tenuifolius Phil.
Sinónimos: *Alomia tenuifolia* (Phil.) Benth. & Hook.f. ex Reiche
Subarbusto. Endémico.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Macrachaenium

Macrachaenium gracile Hook.f.
Sinónimos: *Macrachaenium foliosum* Albov
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Madia

Madia chilensis (Nutt.) Reiche
Sinónimos: *Madariopsis chilensis* Nutt.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 10-2500 m.
Nombre vulgar: Madia, madi, melosa.

Madia sativa Molina
Sinónimos: *Madia viscosa* Cav.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Madi, melosa.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Malacothrix

Malacothrix clevelandii A. Gray
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 10-1000 m.

Malacothrix coulteri A. Gray
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ.

Marticoenia

Marticoenia foliosa (Phil.) Crisci
Sinónimos: *Leuceria foliosa* Phil., *Lasiorrhiza foliosa* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2700-3300 m.

Matricaria

Matricaria chamomilla L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Matricaria discoidea DC.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Micropsis

Micropsis nana DC.
Sinónimos: *Lasiophyton pusillum* Hook. & Arn.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.
Rango altitudinal: 300-2500 m.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Microseris

Microseris pygmaea D. Don
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA.

Mikania

Mikania mendocina Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Mniodes

Mniodes coarctata Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4600 m.
Países limítrofes: Perú.

Mniodes piptolepis (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sinónimos: *Belloa piptolepis* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium piptolepis* (Wedd.) Griseb., *Lucilia piptolepis* Wedd., *Merope piptolepis* Wedd., *Lucilicline piptolepis* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Mniodes schultzii (Wedd.) S.E. Freire, Chemisquy, Anderb. & Urtubey

Sinónimos: *Belloa schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Lucilia schultzii* (Wedd.) A. Gray, *Merope schultzii* Wedd., *Lucilicline schultzii* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3900-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Yaretilla.

Moscharia

Moscharia pinnatifida Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Almizcle.

Moscharia solbrigii Crisci

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 300-500 m.

Mutisia

Mutisia acerosa Less.

Sinónimos: *Mutisia parviflora* J. Remy, *Mutisia ulicina* D. Don
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 1200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Romerillo de cordillera.

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var. *hirsuta* (Meyen) Cabrera

Sinónimos: *Mutisia viciaefolia* Cav. var. *hirsuta* (Meyen) Wedd., *Mutisia hirsuta* Meyen
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Mutisia araucana Phil.

Subarbusto trepador. Endémico.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 800-1400 m.

Mutisia brachyantha Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1200 m.

Mutisia cana Poepp.

Sinónimos: *Mutisia glauca* J. Remy, *Mutisia polyphylla* Phil., *Mutisia reticulata* Phil., *Mutisia volckmanni* Phil., *Mutisia glauca* Phil.
Arbusto trepador. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Nombre vulgar: Granadilla.

Mutisia decurrens Cav. var. *decurrens*

Sinónimos: *Aplophyllum decurrens* (Cav.) Cass., *Mutisia decurrens* Cav. var. *andina* Phil.
Subarbusto trepador. Nativo.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Mutisia decurrens Cav. var. *patagonica* (Phil.) S.F. Blake

Sinónimos: *Mutisia patagonica* Phil.
Subarbusto trepador. Nativo.
Distribución: NUB.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Mutisia hamata Reiche

Sinónimos: *Mutisia microphylla* Phil., hom. illeg.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Mutisia ilicifolia Hook. var. ***decandolleana*** (Phil. ex Reiche) Cabrera

Sinónimos: *Mutisia candolleana* Phil., *Mutisia decandolleana* Phil.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Mutisia ilicifolia Hook. var. ***ilicifolia***

Sinónimos: *Aplophyllum ilicifolium* (Cav.) Cass., *Mutisia breviflora* Phil., *Mutisia consobrina* Phil., *Mutisia eriocephala* Phil., *Mutisia grossedentata* Phil., *Mutisia ilicifolia* Hook., *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *cavanillesii* DC., *Mutisia involucrata* Phil. var. *consobrina* Phil.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 1000-1800 m.

Nombre vulgar: Clavel del campo, grasilla, flor de granada, hierba del jote, flor de la canela.

Mutisia involucrata Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-1700 m.

Mutisia lanigera Wedd.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chirchirkuma, chinkachinka, wichakaña.

Mutisia latifolia D. Don fma. ***bracteata*** (J. Remy) Cabrera

Sinónimos: *Mutisia bracteata* J. Remy

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Mutisia latifolia D. Don fma. ***latifolia***

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Mutisia ledifolia Decne. ex Wedd.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Quinchamale, chinchirkoma, tola negra, kaputula, tola romero.

Mutisia linearifolia Cav.

Sinónimos: *Aplophyllum linearifolium* (Cav.) Cass.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mutisia macrophylla Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Mutisia oligodon Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Mutisia gayana* J. Remy, *Mutisia meyeniana* J. Remy ex Phil.

Subarbusto trepador. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mutisia rosea Poepp. ex Less.

Sinónimos: *Mutisia alba* Phil., *Mutisia berteriana* Endl. ex Poepp., *Mutisia berterii* DC., *Mutisia landbeckii* Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *rosea* (Less.) Ruiz & Pav.

Subarbusto trepador. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Mutisia sinuata Cav.

Sinónimos: *Guariruma sinuatum* (Cav.) Cass., *Mutisia dentata* Phil., *Mutisia popetana* Phil., *Mutisia sanguinea* Meyen, *Mutisia sinuata* Cav. var. *brachycephala* Phil., *Mutisia sinuata* Cav. var. *taraxacifolia* (Less.) Kuntze, *Mutisia taraxacifolia* Less., *Mutisia taraxacifolia* Less. var. *integerrima* Phil.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1700-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mutisia spectabilis Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1300-2800 m.

Nombre vulgar: Clavel del aire.

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var. ***pulchella*** (Speg.) Cabrera

Sinónimos: *Mutisia bridgesii* Endl. ex Poepp. & Endl., *Mutisia pulchella* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy, *Mutisia retusa* J. Remy var. *pulchella* (Speg.) Skotts.

Subarbusto trepador. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Clavel del campo, flor de la estrella.

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var. *spinosa*
Sinónimos: *Mutisia auriculata* Poepp. ex Less., *Mutisia hastata* Bertero ex DC., nom. nud., *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *truncata* (D. Don) DC., *Mutisia retusa* J. Remy var. *glaberrima* Phil., *Mutisia truncata* D. Don
Subarbusto trepador. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Clavel del campo, flor de la estrella.

Mutisia splendens Renjifo
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.

Mutisia subspinosa Cav.
Sinónimos: *Guariruma subspinosa* (Cav.) Cass.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, NUB.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Mutisia subulata Ruiz & Pav. fma. *rosmarinifolia* (Poepp. & Endl.) Cabrera
Sinónimos: *Mutisia linearifolia* Hook., hom. illeg., *Mutisia gracilis* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen, *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *major* Hook. & Arn., *Mutisia hookeri* Meyen var. *rosmarinifolia* Poepp. & Endl., *Mutisia elegans* Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Meyen) Walp., *Mutisia linearifolia* Cav. var. *hookeri* (Meyen) Reiche
Subarbusto trepador. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1700-3000 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Mutisia subulata Ruiz & Pav. fma. *subulata*
Sinónimos: *Guariruma inflexum* (Cav.) Cass., *Mutisia hookeri* Meyen var. *scandens* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav., *Mutisia inflexa* Cav. var. *imberbis* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav. var. *melanopoga* Poepp. & Endl., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *cavanillesii* Hook. & Arn., *Mutisia versicolor* Phil.
Subarbusto trepador. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Mutisia tridens Poepp. ex Less.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO.

Nardophyllum

Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera
Sinónimos: *Anactinia hookeri* J. Remy, nom. illeg., *Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn., *Baccharis bryoides* (Lam.) Pers., *Chiliotrichum darwinii* Hook.f., *Chiliotrichum humile* Hook.f., *Chiliotrichum kingii* Hook.f., *Conyza bryoides* Lam., *Microchaete humilis* (Hook.f.) Sch. Bip., *Nardophyllum darwinii* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum humile* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum kingii* (Hook.f.) A. Gray, *Nardophyllum parvifolium* Phil., *Dolichogyne parvifolia* Phil. ex Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nardophyllum chiliotrichioides (J. Remy) A. Gray
Sinónimos: *Dolichogyne chiliotrichioides* J. Remy
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nardophyllum genistoides (Phil.) A. Gray
Sinónimos: *Dolichogyne genistoides* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.

Nardophyllum lanatum (Meyen) Cabrera
Sinónimos: *Barnadesia lanata* Meyen, *Dolichogyne candollei* J. Remy, nom. illeg., *Dolichogyne gnaphalioides* DC., *Gochnatia revoluta* D. Don ex Hook. & Arn., *Nardophyllum candollei* (J. Remy) F. Meigen, comb. illeg., *Nardophyllum revolutum* (D. Don ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1200-3200 m.
Nombre vulgar: Macabeo.

Nassauvia

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. *aculeata*
Sinónimos: *Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *spinosa* (D. Don) Cabrera, *Nassauvia diazii* (Phil.) Reiche, *Nassauvia latifolia* (Phil.) F. Meigen, *Nassauvia spinosa* (D. Don) Reiche, comb. illeg., *Panargyrum diazii* Phil., *Panargyrum latifolium* Phil., *Panargyrum pectinatum* Phil., *Panargyrum spinosum* D. Don, *Penthanthus aculeatus* Less.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. ***azorelloides*** (Speg.) Cabrera

Sinónimos: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén, *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *azorelloides* Speg., *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *subspinosa* (Phil.) Macloskie, *Nassauvia subspinosa* (Phil.) Albov, *Panargyrum abbreviatum* Hook. & Arn., *Panargyrum subspinosum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. ***robusta*** (Cabrera) Cabrera

Sinónimos: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *robusta* Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia argentea Phil.

Sinónimos: *Nassauvia revoluta* D. Don var. *argentea* (Phil.) Hosseus
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia axillaris (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sinónimos: *Acanthophyllum axillare* (Lag. ex Lindl.) Hook. & Arn., *Strongyloma axillare* (Lag. ex Lindl.) DC., *Triptilion axillare* Lag. ex Lindl.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nassauvia coronipappa M.T.K. Arroyo & Martic.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 800-1100 m.

Nassauvia cumingii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Nassauvia glabrata* Phil., *Nassauvia macracantha* DC., *Nassauvia macracantha* DC. var. *glabrata* (Phil.) Reiche, *Nassauvia macracantha* DC. var.

spicata (J. Remy) Hauman, *Nassauvia spicata* J. Remy, *Nassauvia spinosa* Phil., *Nassauvia suaveolens* D. Don, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2700-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia darwinii (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén

Sinónimos: *Nassauvia candollei* Macloskie, *Nassauvia darwinii* (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén var. *laxa* (Phil.) Skotts., *Nassauvia lagascae* (DC.) Reiche, hom. illeg., *Nassauvia laxa* (Phil.) Speg., *Panargyrum darwinii* Hook. & Arn., *Panargyrum lagascae* DC., *Panargyrum laxum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia dentata Griseb.

Sinónimos: *Nassauvia cespitosa* Wedd., *Nassauvia patula* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1200-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia digitata Wedd.

Sinónimos: *Nassauvia lycopodioides* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia dusenii O. Hoffm.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia glomerata (D. Don) Wedd.

Sinónimos: *Panargyrum densifolium* Phil., *Panargyrum glomeratum* D. Don
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don

Sinónimos: *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don fma. *struthionum* (Phil.) Skotts., *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg., *Strongyloma glomerulosum* (Lag. ex Lindl.) DC., *Strongyloma struthionum* Phil., *Triptilion glomerulosum* Lag. ex Lindl., *Nassauvia maeviae* Cabrera

Arbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. *globosa* Skotts.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. *lagascae*
Sinónimos: *Caloptilium lagascae* (D. Don) Hook. & Arn.,
Nassauvia lanata Reiche, *Portalesia procumbens* Meyen,
Sphaerocephalus lagascae D. Don
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI,
MAG.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. *lanata* (Phil.)
Skotts.
Sinónimos: *Caloptilium lagascae* (D. Don) Hook. & Arn.
var. *lanata* Phil., *Nassauvia humilis* Phil., *Nassauvia lanata*
Reiche var. *lanigera* (Phil.) Reiche, *Nassauvia lanigera*
Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia latissima Skotts.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia looseri Cabrera
Sinónimos: *Panargyrum heterophyllum* Phil., *Panargyrum*
acerosum Phil., *Nassauvia heterophylla* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Nassauvia magellanica J.F. Gmel.
Sinónimos: *Nassauvia suaveolens* Willd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pinnigera D. Don
Sinónimos: *Nassauvia multiflora* Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pulcherrima Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LRI.
Rango altitudinal: 1800-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook.f. var. *intermedia* (Phil.)
Cabrera
Sinónimos: *Nassauvia intermedia* Phil., *Nassauvia pumila*
Poepp. & Endl., *Nassauvia pumila* Poepp. & Endl. var.
intermedia (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook.f. var. *pygmaea*
Sinónimos: *Nassauvia nordenskjoldii* O. Hoffm. ex Dusén,
Nassauvia pumila Poepp. & Endl. var. *nordenskjoldii* (O.
Hoffm. ex Dusén) Reiche, *Triachne pygmaea* Cass.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia pyramidalis Meyen
Sinónimos: *Nassauvia macracantha* DC. var. *pungens*
(Phil.) Hauman, *Nassauvia pungens* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nassauvia ramosissima DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 600-2000 m.

Nassauvia revoluta D. Don
Sinónimos: *Nassauvia brevifolia* Phil., *Nassauvia nivalis*
Poepp. ex Less., *Nassauvia nivalis* Poepp. & Endl. var.
brevifolia (Phil.) Reiche, *Nassauvia nivalis* Poepp. & Endl.
var. *sericea* Phil., *Nassauvia revoluta* D. Don var. *nivalis*
(Poepp. ex Less.) Hosseus, *Nassauvia sericea* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cadislao, calahuala.

***Nassauvia sprengelioides* DC.**

Sinónimos: *Nassauvia araucana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba de la culebra.

***Nassauvia uniflora* (D. Don) Hauman**

Sinónimos: *Nassauvia oligocephala* (DC.) Wedd.,
Panargyrum oligocephalum DC., *Panargyrum uniflorum*
D. Don
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2800-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Noticastrum

***Noticastrum adscendens* DC.**

Sinónimos: *Noticastrum pradense* (Phil.) Phil., *Aster adscendens* (DC.) Reiche, *Aster pradensis* Phil., *Diplopappus sericeus* Less. var. *glandulosa* Hook. & Arn., *Noticastrum glandulosum* Phil., *Noticastrum sanfurgii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Noticastrum antucense* Phil.**

Sinónimos: *Aster antucensis* (Phil.) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze var. *antucensis* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 100-300 m.

***Noticastrum erectum* J. Remy**

Sinónimos: *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-1000 m.

***Noticastrum eriophorum* J. Remy**

Sinónimos: *Aster eriophorus* (J. Remy) Kuntze, *Aster eriophorus* (J. Remy) Reiche, *Aster leucopappus* (Phil.) Reiche, *Leucopsis harveyi* Baker, *Leucopsis sericea* (Less.) Baker var. *eriphora* (J. Remy) Baker, *Noticastrum leucopappum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

***Noticastrum sericeum* (Less.) Less. ex Phil.**

Sinónimos: *Aster albus* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Aster albus* (Phil.) Kuntze, *Aster haplopappus* (J. Remy) Kuntze, comb. illeg., *Aster haplopappus* (J. Remy) Reiche, *Aster marginatus* Kunth var. *tomentosus* Wedd., *Aster nitens* Kuntze, *Aster notosericeus* Griseb., *Aster sericeus* (Less.) Nees, *Diplopappus sericeus* Less., *Noticastrum philippii* Sch. Bip., nom. nud., *Haplopappus sericeus* (Less.) DC., *Leucopsis sericea* (Less.) Baker, *Noticastrum album* Phil., *Noticastrum haplopappus* J. Remy, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Notopappus

***Notopappus andinus* (Phil.) Klingenb.**

Sinónimos: *Grindelia andina* (Phil.) Phil., *Chrysophthalmum andinum* Phil., *Helianthus australis* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU.

Notopappus chryseus* (Kuntze) Klingenb. var. *discooides

Tortosa & A. Bartoli
Sinónimos: *Aster chryseus* Kuntze, *Haplopappus chrysocephalus* Reiche, *Haplopappus chryseus* (Kuntze) Cabrera, *Pyrocoma aurea* Phil., *Grindelia prunelloides* (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. *discooides* Tortosa & A. Bartoli
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2300-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Notopappus pectinatus* (Phil.) Klingenb.**

Sinónimos: *Aster anethifolius* (Phil.) Kuntze, *Grindelia anethifolia* (Phil.) A. Bartoli & Tortosa, *Aster pectinatus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus pinnatifidus* Hook. & Arn., hom. illeg., *Haplopappus anethifolius* Phil., *Haplopappus moyanoi* Speng., *Haplopappus pectinatus* Phil. var. *anethifolius* (Phil.) Reiche, *Haplopappus pectinatus* Phil., *Haplopappus araucanus* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Notopappus prunelloides (Poepp. ex Less.) Klingenb.
Sinónimos: *Aster prunelloides* (Poepp. ex Less.) Kuntze,
Haplopappus prunelloides (Poepp. ex Less.) DC.,
Diplopappus prunelloides Poepp. ex Less., *Haplopappus*
prunelloides (Poepp. ex Less.) DC. var. *sphaerocephalus*
Reiche, *Grindelia prunelloides* (Poepp. ex Less.) A. Bartoli
& Tortosa, *Haplopappus bellidifolius* Phil. var. *brachylepis*
(Phil.) Reiche, *Haplopappus brachylepis* Phil.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 500-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ocyroe

Ocyroe armata (Wedd.) Bonifacino
Sinónimos: *Dolichogyne armata* Wedd., *Ocyroe spinosa*
Phil., *Nardophyllum armatum* (Wedd.) Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2800-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Onopordum

Onopordum acanthium L.
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: RME, ARA.

Ophryosporus

Ophryosporus anomalus R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Piqueria cumingii* B.L. Rob., hom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Perú.

Ophryosporus floribundus (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Piqueria floribunda* DC.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Países limítrofes: Perú.

Ophryosporus heptanthus (Sch.Bip. ex Wedd.) R.M. King
& H. Rob.
Sinónimos: *Eupatorium heptanthus* (Sch. Bip. ex Baker)
R.M. King & H. Rob., *Ophryosporus organoides* (Meyen
& Walp.) Hieron., *Eupatorium organoides* Meyen & Walp.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2800-3320 m.
Países limítrofes: Bolivia, Perú.

Ophryosporus hoppii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Trychionolepis hoppii* B.L. Rob.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 300-3200 m.
Países limítrofes: Perú.

Ophryosporus johnstonii B.L. Rob.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1200-1300 m.

Ophryosporus paradoxus (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.
ex B.D. Jacks.
Sinónimos: *Eupatorium paradoxus* Hook. & Arn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Ophryosporus pinifolius (Phil.) R.M. King & H. Rob.
Sinónimos: *Stevia pinifolia* Phil., *Piqueria pinifolia* (Phil.)
Hieron. ex B.L. Rob.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-3500 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Sapama.

Ophryosporus triangularis Meyen
Sinónimos: *Eupatorium foliolosum* DC., *Ophryosporus*
foliolosum (DC.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-3400 m.
Nombre vulgar: Rabo de zorro.

Oriastrum

Oriastrum acerosum (J. Remy) Phil. var. ***acerosum***
Sinónimos: *Chaetanthera acerosa* (J. Remy) Benth. &
Hook.f. ex Griseb. var. *acerosa*, *Chaetanthera pallida*
(Phil.) Hauman, *Egania acerosa* J. Remy, *Egania pallida*
Phil., *Oriastrum incanum* Phil., *Oriastrum parviflorum*
Phil., *Oriastrum uncinatum* Phil., *Oriastrum pallidum*
(Phil.) Phil., *Oriastrum pusillum* Poepp. & Endl. var.
uncinatum (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2800-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum acerosum (J. Remy) Phil. var. ***dasycarpum***
Cabrera
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 3600-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum achenohirsutum (Tombesi) A.M.R. Davies
Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acheno-hirsutum* Tombesi, *Chaetanthera acheno-hirsuta* (Tombesi) M.T.K. Arroyo, A.M.R. Davies & Till-Bottraud
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 3900-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum apiculatum (J. Remy) A.M.R. Davies
Sinónimos: *Chaetanthera apiculata* (J. Remy) F. Meigen, *Chaetanthera lanigera* Phil., *Eganía apiculata* J. Remy, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *albicaule*, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *nivale* (Phil.) Reiche, *Oriastrum nivale* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 3000-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum chilense (J. Remy) Wedd.
Sinónimos: *Aldunantea chilensis* J. Remy, *Chaetanthera pusilla* (D. Don) Hook. & Arn., *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg. var. *uncinatum* Reiche, *Tylloma pusillum* D. Don, *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 2100-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum dioicum (J. Remy) Phil.
Sinónimos: *Chaetanthera dioica* (J. Remy) B.L. Rob., *Eganía dioica* J. Remy
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, RME.
Rango altitudinal: 3000-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum gnaphalioides (J. Remy) Wedd.
Sinónimos: *Aldunantea gnaphalioides* J. Remy, *Chaetanthera gnaphalioides* (J. Remy) I.M. Johnst., *Chondrochilus parvifolius* Phil., *Oriastrum albiflorum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum leucocephalum* Phil., *Tylloma albiflorum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum lycopodioides (J. Remy) Wedd.
Sinónimos: *Aldunantea lycopodioides* J. Remy, *Chaetanthera lycopodioides* (J. Remy) Cabrera, *Oriastrum gayi* Phil., *Oriastrum glabriusculum* Phil., *Oriastrum lycopodioides* (J. Remy) Wedd. var. *glabriusculum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 3000-3900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum minutum (Phil.) Nicola, S.E. Freire & Ariza
Sinónimos: *Chaetanthera minuta* (Phil.) Cabrera, *Oriastrum gossypinum* Phil., *Tylloma minutum* Phil., *Tylloma gnaphalioides* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum pulvinatum Phil. var. ***polymallum*** (Phil.) Hicken
Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *polymalla* (Phil.) Hicken, *Chaetanthera acerosa* auct. non (J. Remy) Bonpl. & Humb., *Oriastrum polymallum* Phil., *Oriastrum tontalensis* A.M.R. Davies
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, COQ.
Rango altitudinal: 3000-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum pulvinatum Phil. var. ***pulvinatum***
Sinónimos: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *pulvinata*
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2800-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oriastrum pusillum Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Chaetanthera planiseta* Cabrera
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2300-3400 m.

Oriastrum revolutum (Phil.) A.M.R. Davies
Sinónimos: *Chaetanthera revoluta* (Phil.) Cabrera, *Eganía appressa* Phil., *Eganía revoluta* Phil., *Oriastrum dioicum* (J. Remy) Phil. var. *revolutum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3500-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Keúche, tieuchi, comida de perdiz.

Oriastrum sphaeroidale Reiche

Sinónimos: *Chaetanthera sphaeroidalis* (Reiche) Hicken, *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acuminatibracteata* Hauman
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3200-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Flor de la puna.

Oriastrum tarapacensis A.M.R. Davies

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 4100-4600 m.

Oriastrum werdermannii A.M.R. Davies

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxyphyllum

Oxyphyllum ulicinum Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.

Pachylaena

Pachylaena atriplicifolia D. Don ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chionopectera gayophyta* DC., *Pachylaena gayophyta* (DC.) Hieron., *Pachylaena rosea* I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1400-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Oreja de chancho, hierba santa.

Parastrephia

Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera

Sinónimos: *Parastrephia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera, *Dolichogyne lepidophylla* Wedd., *Lepidophyllum tola* Cabrera, nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tola vaca, tola, sipu, chijarwaya, pulika, tola amarga, qiroqiro.

Parastrephia lucida (Meyen) Cabrera

Sinónimos: *Baccharis lucida* Meyen, *Dolichogyne glabra* Phil., *Polycladus abietinus* Phil., *Lepidophyllum abietinum* (Phil.) Reiche, *Lepidophyllum lucidum* (Meyen) Cabrera

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2900-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tola del río, tola de agua, umatola, tola amarga, unutulola.

Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera

Sinónimos: *Baccharis quadrangularis* Meyen, *Polycladus cupressinus* Phil., *Lepidophyllum cupressinum* (Phil.) Kuntze, *Lepidophyllum meyenii* A. Gray, nom. illeg., *Lepidophyllum quadrangulare* (Meyen) Benth. & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chacha, coba, pulika, tola amarilla.

Parastrephia teretiuscula (Kuntze) Cabrera

Sinónimos: *Lepidophyllum teretiusculum* Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4200 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Chacha, coba, pulika, tola amarilla, kobatola.

Pascalía

Pascalía glauca Ortega

Sinónimos: *Wedelia glauca* (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken, *Helianthus copiapius* Phil., *Wedelia copiapina* (Phil.) Reiche, *Wedelia glauca* (Ortega) S.F. Blake, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Sunchillo, huilmo, huilmo copiapino.

Perezia

Perezia atacamensis (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Clarionea atacamensis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Marancel, aycha-aycha.

Perezia calophylla (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Homoeanthus calophyllus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia capito (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Homoeanthus capito* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1500-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia carthamoides (D. Don) Hook. & Arn.
Sinónimos: *Clarionea carthamoides* D. Don var. *crispa* (Meyen) Phil., *Clarionea multicapitata* J. Remy, *Clarionea spectabilis* Phil., *Clarionea carthamoides* D. Don, *Perezia diversifolia* Meyen, *Perezia diversifolia* Meyen var. *crispa* Meyen, *Perezia multicapitata* (J. Remy) Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1800-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Clarionea ciliosa* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Maransel hembra.

Perezia delicata Vuilleum.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 1550 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia fonkii (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Clarionea affinis* Phil., *Clarionea fonkii* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia lactuoides (Vahl) Less.
Sinónimos: *Perezia lactuoides* (Vahl) Less. subsp. *palustris* (Phil.) Vuilleum., *Aster magellanicus* Lam., *Chaetanthera magellanica* (Lam.) Spreng., *Clarionea lactuoides* (Vahl) D. Don, *Perdicium lactuoides* Vahl, *Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC., *Homoianthus palustris* Phil., *Perezia palustris* (Phil.) Reiche, *Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC. var. *lactuoides* (Vahl) Hook., *Perdicium laevigatum* Banks & Sol. ex Hook.f., nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia linearis Less.
Sinónimos: *Homoeanthus rigidus* Phil., *Homoianthus linearis* (Less.) DC.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 600-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia lyrata (J. Remy) Wedd.
Sinónimos: *Clarionea pinnata* Phil., *Homoianthus gayanus* J. Remy, *Homoianthus lyratus* J. Remy, *Perezia pinnata* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Perezia magellanica (L.f.) Lag.
Sinónimos: *Clarionea elegans* Phil., *Clarionea magellanica* (L.f.) Lag. ex DC., *Perdicium magellanicum* L.f., *Perezia lagascae* Cass., nom. illeg., *Perezia magellanica* (L.f.) Less., comb. illeg., *Perezia elegans* (Phil.) Albov, *Perdicium sinuatum* Banks & Sol. ex Hook.f., nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia megalantha Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1200-0 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less.
Sinónimos: *Chaetanthera multiflora* Humb. & Bonpl., *Homanthis multiflorus* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Homoianthus multiflorus* (Humb. & Bonpl.) DC.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 1100-4900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Perezia nutans Less.
Sinónimos: *Perezia gayana* DC., *Perezia perfoliata* J. Remy, *Calorezia nutans* (Less.) Panero, *Perdicium nutans* Poepp. ex Less., nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Perezia pedicularidifolia Less.

Sinónimos: *Clarionea comosa* Phil., *Clarionea laciniata* Phil., *Clarionea parvifolia* Phil., *Clarionea variabilis* Phil., *Clarionea volkmanii* Phil., *Clarionea humilis* Phil., *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche, *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche var. *comosa* (Phil.) Reiche, *Homoeanthus variabilis* Phil., *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Perezia variabilis* (Phil.) Reiche, *Perdicium pedicularidifolium* Poepp. ex Less., nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Perezia pilifera (D. Don) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Clarionea lechleri* Sch. Bip., *Clarionea pilifera* D. Don, *Homoeanthus humilis* Phil., *Perezia linearis* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia lechleri* (Sch. Bip.) De Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1500-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Perezia pinnatifida (Humb. & Bonpl.) Wedd.

Sinónimos: *Chaetanthera pinnatifida* Humb. & Bonpl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3300-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Perezia poeppigii Less.

Sinónimos: *Clarionea caulescens* Phil., *Clarionea nana* Phil., *Clarionia virens* D. Don, *Clarionema virens* (D. Don) Phil. var. *humilis* Phil., *Homoeanthus remyanus* Phil., *Homoeanthus brevicaulis* Phil., *Homoianthus pristiphyllus* J. Remy, *Perezia pristiphylla* (J. Remy) Wedd., *Perezia virens* (D. Don) Hook. & Arn., *Homoianthus brevicaulis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1200-2900 m.

Perezia prenanthoides Less.

Sinónimos: *Perezia brachylepis* Phil., *Calorezia prenanthoides* (Less.) Panero

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1200-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Estrella de los Andes.

Perezia pungens (Humb. & Bonpl.) Less.

Sinónimos: *Perezia ciliaris* D. Don ex Hook. & Arn., *Clarionea ciliaris* (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., *Chaetanthera pungens* Humb. & Bonpl., *Homoeanthus pungens* (Humb. & Bonpl.) Spreng., *Homanthis pungens* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Clarionia pungens* (Humb. & Bonpl.) D. Don

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Maransel, waji.

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. *beckii* (Hook. & Arn.) Cabrera

Sinónimos: *Perezia beckii* Hook. & Arn., *Homoeanthus pectinatus* Phil., *Perezia pectinata* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. *recurvata*

Sinónimos: *Chaetanthera recurvata* (Vahl) Spreng., *Clarionea recurvata* (Vahl) D. Don, *Perdicium recurvatum* Vahl, *Perezia doniana* Less., *Homoianthus donianus* (Less.) J. Remy, *Homoianthus inermis* Meyen & Walp., nom. illeg., *Perezia reflexa* Meyen, *Clarionia recurvata* (Vahl) D. Don, *Clarionea reflexa* (Meyen) Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. *triceps* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Homoeanthus triceps* Phil., *Perezia triceps* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Perezia spathulata (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Clarionea spathulata* Lag. ex D. Don, *Perezia viscosa* Poepp. ex Less., *Homoianthus viscosus* (Poepp. ex Less.) DC., *Perdicium viscosum* Poepp. ex Less., nom. nud., *Homoianthus germaini* Phil. ex Reiche, nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 100-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Perityle

Perityle emoryi Torr.

Sinónimos: *Closia cotula* J. Remy var. *elata* (Phil.) Reiche, *Closia discoidea* Phil., *Closia elata* Phil., *Laphamia emoryi* (Torr.) Benth. & Hook.f. ex Jacks., *Perityle discoidea* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *elata* (Phil.) I.M. Johnst., *Closia anthemoides* Phil., *Closia brachypetala* Phil., *Closia chilensis* Regel & Körn., *Closia cotula* J. Remy, *Closia digitata* Phil., *Closia elata* Phil. var. *nana* Phil., *Closia foliosa* Phil., *Closia pusilla* Phil., *Closia viridis* Phil., *Closia villosa* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Países limítrofes: Perú.

Picradeniopsis

Picradeniopsis multiflora (Hook. & Arn.) B.G. Baldwin

Sinónimos: *Bahia gilliesii* A. Gray, *Rothia intermedia* Kuntze, *Rothia pusilla* (Wedd.) Kuntze, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Soiko de cabra, pasto de campo, manzanillón.

Picris

Picris echioides L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA.

Picrosia

Picrosia longifolia D. Don

Sinónimos: *Picrosia australis* Decne., *Psilopogon albiflorus* Phil., *Tragopogon fritillarioides* Less.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Plazia

Plazia cheiranthifolia (J. Remy) Wedd.

Sinónimos: *Aglaodendron cheiranthifolium* J. Remy

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2600-2800 m.

Plazia daphnoides Wedd.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 2600-4400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chinchirkuma, koya macho, chajilla.

Pleocarphus

Pleocarphus revolutus D. Don

Sinónimos: *Jungia dentata* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche var. *dentata* (Phil.) Reiche, *Pleocarphus dentatus* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Nombre vulgar: Cola de ratón.

Pluchea

Pluchea chingoyo (Kunth) DC.

Sinónimos: *Conyza chingoyo* Kunth

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chilca, chingoyo.

Podanthus

Podanthus mitiqui Lindl.

Sinónimos: *Euxenia mitiqui* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Mitique, mitriu.

Podanthus ovatifolius Lag.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Mitique, palo negro.

Polyachyrus

Polyachyrus annuus I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Perú.

Polyachyrus carduoides Phil.

Sinónimos: *Polyachyrus foliosus* Phil., *Polyachyrus glabratus* Phil., *Polyachyrus latifolius* Phil., *Polyachyrus rigidus* I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

Nombre vulgar: Renguilla, borlón de alforja, hediondilla, sokasoka.

Polyachyrus cinereus Ricardi & Weldt

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Polyachyrus fuscus (Meyen) Walp.

Sinónimos: *Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp. var. *roseus* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus roseus* Phil., *Diaphoranthus fuscus* Meyen

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Perú.

Polyachyrus gayi J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex Less. subsp. ***multifidus*** (D. Don) Ricardi & Weldt

Sinónimos: *Polyachyrus multifidus* D. Don, *Polyachyrus sanromani* Phil., *Polyachyrus selinoides* Reiche

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex Less. subsp. ***poeppigii***

Sinónimos: *Polyachyrus calderensis* Phil., *Polyachyrus decurrens* Lag. ex DC., *Polyachyrus litoralis* Phil., *Polyachyrus macrotis* Phil., *Polyachyrus poeppigii* Kuntze ex Less. var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus tenuifolius* Phil., *Polyachyrus virgatus* I.M. Johnst.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Polyachyrus sphaerocephalus D. Don

Sinónimos: *Polyachyrus bridgesii* Poepp. & Endl., *Polyachyrus tarapacanus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Sokasoka.

Porophyllum

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

Sinónimos: *Cacalia glandulosa* Salisb., nom. illeg., *Cacalia porophyllum* L., *Cacalia ruderale* (Jacq.) Sw., *Kleinia porophyllum* (L.) Willd., *Kleinia ruderale* Jacq., *Porophyllum ellipticum* Cass., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *genuinum* Urb., nom. illeg., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *intermedium* DC., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *ruderale* (Jacq.) Urb., *Porophyllum latifolium* Benth., *Porophyllum macrolepidium* Malme, *Porophyllum porophyllum* (L.) Kuntze, comb. illeg., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *angustifolium* Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *ellipticum* (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *glandulosum* Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *macrolepidium* (Malme) Chodat & Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. fma. *suffruticosum* Chodat & Hassl., *Tagetes integrifolia* Muschl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Proustia

Proustia cuneifolia D. Don subsp. ***cinerea*** (Phil.) Luebert

Sinónimos: *Proustia cinerea* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *cinerea* (Phil.) Fabris

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 300-1200 m.

Proustia cuneifolia D. Don subsp. ***cuneifolia***

Sinónimos: *Proustia pungens* Poepp. ex Less., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *heterophylla* Kuntze, *Proustia cuneifolia* D. Don var. *integrifolia* Hook. & Arn., *Proustia cuneifolia* D. Don var. *spinulosa* Hook. & Arn., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *cuneifolia* (D. Don) Wedd., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *cuneifolia*

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Huañil, pucana, tipia, palo de yegua.

Proustia cuneifolia D. Don subsp. ***tipia*** (Phil.) Luebert

Sinónimos: *Proustia tipia* Phil., *Proustia cuneifolia* D. Don fma. *tipia* (Phil.) Fabris

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Tipia.

***Proustia pyrifolia* DC.**

Sinónimos: *Proustia pyrifolia* DC. var. *canescens* DC., *Proustia oblongifolia* D. Don, *Proustia glandulosa* DC., *Proustia pyrifolia* DC. fma. *glandulosa* (DC.) Fabris
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 200-1200 m.
Nombre vulgar: Parrila blanca, tola blanca, voqui blanco.

Pseudognaphalium

***Pseudognaphalium aldunateoides* (J. Remy) C. Monti, Bayón & S.E. Freire**

Sinónimos: *Gnaphalium aldunateoides* J. Remy, *Gnaphalium diminutivum* Phil., *Gnaphalium perpusillum* Phil., *Gnaphalium phaeolepis* Phil., *Pseudognaphalium perpusillum* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire, *Gnaphalium insulare* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 500-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Pseudognaphalium cabreræ* (S.E. Freire) S.E. Freire, Bayón, Baeza, Giuliano & C. Monti**

Sinónimos: *Gnaphalium philippii* Cabrera, hom. illeg., *Gnaphalium fastigiatum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire, nom. illeg., *Pseudognaphalium cabreræ* (S.E. Freire) Deble, nom. illeg., *Pseudognaphalium fastigiatum* Bayón, nom. illeg., *Gnaphalium cabreræ* S.E. Freire
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, RME, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Pseudognaphalium cheiranthifolium* (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt**

Sinónimos: *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam., *Gnaphalium acutifolium* Phil., *Gnaphalium araucanum* Phil., *Gnaphalium citrinum* Hook. & Arn., *Gnaphalium paniculatum* Bertero ex Colla, *Gnaphalium valdivianum* Phil., *Gnaphalium cheiranthifolium* Lam. var. *paniculatum* (Bertero ex Colla) Skottsbo.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Té de burro.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Pseudognaphalium cymatoides* (Kunze ex DC.) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium moelleri* Phil., *Gnaphalium canum* Phil., hom. illeg., *Pseudognaphalium moelleri* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium ulophyllum* Hook. & Arn., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC. var. *glabrum* Walp., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC., *Gnaphalium cheiranthifolium* Bertero, hom. illeg.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Hierba de San Juan.

***Pseudognaphalium gayanum* (J. Remy) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium heterophyllum* Phil., *Gnaphalium heterotrichum* Phil., *Gnaphalium leucocephalum* Phil., nom. illeg., *Gnaphalium pseudohelichrysum* Reiche, *Gnaphalium gayanum* J. Remy, *Gnaphalium robustum* Phil., *Pseudognaphalium heterotrichum* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium robustum* (Phil.) Anderb., *Hypelichrysum heterotrichum* (Phil.) Kirp.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.

***Pseudognaphalium lacteum* (Meyen & Walp.) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium lacteum* Meyen & Walp., *Gnaphalium argyrolepis* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, BIO.
Rango altitudinal: 2500-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Viravira, viravira blanca.

***Pseudognaphalium landbeckii* (Phil.) Anderb.**

Sinónimos: *Gnaphalium landbeckii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Pseudognaphalium munoziæ* Bayón C. Monti & S.E. Freire**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3500-4200 m.

Pseudognaphalium psilophyllum (Meyen & Walp.) Anderb.

Sinónimos: *Gnaphalium glandulosum* Klatt, *Gnaphalium psilophyllum* Meyen & Walp., *Pseudognaphalium glandulosum* (Klatt) Anderb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA.

Rango altitudinal: 800-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Viravira, chuncho viravira.

Pseudognaphalium remyanum (Phil.) Anderb.

Sinónimos: *Gnaphalium remyanum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Pseudognaphalium tarapacanum (Phil.) Anderb.

Sinónimos: *Gnaphalium tarapacanum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 3000-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb.

Sinónimos: *Gnaphalium andicola* Phil., *Gnaphalium pratense* Phil., *Gnaphalium longifolium* Phil., *Gnaphalium subnudum* Phil., *Pseudognaphalium pratense* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium coquimbense* Phil., *Gnaphalium illapelinum* Phil. var. *illapelinum*, *Gnaphalium viravira* Molina, *Pseudognaphalium coquimbense* (Phil.) Anderb., *Pseudognaphalium illapelinum* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium viravira* Less., hom. illeg., *Pseudognaphalium andicola* (Phil.) C. Monti, Bayón & S.E. Freire

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba de la diuca, hierba de la vida, viravira.

Psilocarphus

Psilocarphus brevissimus Nutt.

Sinónimos: *Psilocarphus globiferus* Nutt.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Psilocarphus tenellus Nutt. var. ***globiferus*** (Bertero ex DC.) Morefield

Sinónimos: *Benzanilla chilensis* J. Remy, *Micropus globiferus* Bertero ex DC., *Psilocarphus chilensis* (J. Remy) A. Gray, *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg., comb. illeg., *Psilocarphus berteri* I.M. Johnst., *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg. var. *minimus* Cabrera

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Schkuhria

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.

Sinónimos: *Amblyopappus mendocina* Phil., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera, *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *octoaristata* (DC.) Cabrera, *Pectis pinnata* Lam., *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *pallida* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *purpurascens* Kuntze, *Schkuhria abrotanoides* Roth, *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron., *Schkuhria advena* Thell., *Schkuhria bonariensis* Hook. & Arn., *Schkuhria coquimbana* Phil., *Schkuhria isopappa* Benth., *Schkuhria octoaristata* DC., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *typica* Cabrera, nom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cachanlahuen cimarrón, canchalagua.

Scolymus

Scolymus hispanicus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL.

Senecio

Senecio acanthifolius Hombr. & Jacquinot

Sinónimos: *Senecio acanthifolius* Hombr. & Jacquinot subsp. *virens* (Phil.) Cabrera & Zardini, *Senecio virens* Phil., *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord., *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord. subsp. *virens* (Phil.) B. Nord., *Senecio ombrophyllus* Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio adenophyllus Meyen & Walp.

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4200-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tola hedionda, hachakoma del burro, tola del burro.

Senecio adenotrichius DC.

Sinónimos: *Adenotrichia amplexicaulis* Lindl., *Heterolepis conyzoides* Bertero ex DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 300-1200 m.

Senecio alcornis Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio chrysanthemoides* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-900 m.

Senecio algens Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4200-5200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Senecio alloeophyllus O. Hoffm.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1300-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio almeidae Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Senecio angulatus L.f.

Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Senecio angustissimus Phil.

Sinónimos: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *angustissimus* (Phil.) Speg., *Senecio nahuelbutanus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio anthemidiphyllus J. Remy

Sinónimos: *Senecio campanae* Phil., *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var. *viscidus* Hook. & Arn., *Senecio brachylepis* Phil., *Senecio psammophilus* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio antofagastanus Cabrera

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 1000 m.

Senecio aquaticus Hill. subsp. *aquaticus*

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: BIO, LLA.

Senecio aquaticus Hill. subsp. *barbareifolius* (Wimm. &

Grab.) Walters
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.

Senecio argyreus Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio aristianus J. Remy

Sinónimos: *Senecio guayacanensis* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Senecio arleguianus J. Remy

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1200 m.

Senecio arnicoides Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio plantagineus* Bertero ex Colla, *Aster plantagineus* Poepp. ex DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 800 m.

Senecio arnottii Hook.f.

Sinónimos: *Senecio limbardioides* Hook. & Arn., hom. illeg., *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn., *Senecio arnottii* Hook.f. var. *major* Macloskie
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio aspericaulis J. Remy

Sinónimos: *Senecio hypsophilus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 2400-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio atacamensis Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mukuraka, chachacoma blanca, cacho de cabra, chachacoma del burro.

Senecio baccharidifolius Poepp. ex DC.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio bahioides Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *glaber*

Hook. & Arn., *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *lanosus*

Hook. & Arn., *Senecio irregularis* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Senecio balsamicus Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2700 m.

Senecio barbarae Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4300-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio Barrosianus Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Senecio beauifilii Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 1500-1900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio behnii Ricardi & Martic.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3200-3300 m.

Nombre vulgar: Viravira.

Senecio benaventianus J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Senecio berteroi (DC.) Pelsner

Sinónimos: *Robinsonia berteroi* (DC.) Sanders, Stuessy & Martic., *Balbisia berteroi* DC., *Vendredia berterii* (DC.)

Baillon, *Rhetinodendron berteroi* (DC.) Hemsl.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nota: Posiblemente extinta.

Senecio bipontinii Wedd.

Sinónimos: *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzii* Wedd.,

hom. illeg., *Senecio julietii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 120-2520 m.

Senecio botijae Ehrh.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Senecio brachylobus Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500 m.

Senecio bracteolatus Hook. & Arn. var. *bracteolatus*

Sinónimos: *Senecio coxi* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio bracteolatus Hook. & Arn. var. *valderramae* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio valderramae* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1000-1400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio breviscapus DC.

Sinónimos: *Senecio acaulis* Phil., *Senecio chamaecephalus* Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2600-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Senecio bridgesii Hook. & Arn.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-3000 m.

Senecio brunonianus Hook. & Arn.
Sinónimos: *Senecio serenensis* J. Remy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 100 m.

Senecio buglossus Phil.
Sinónimos: *Senecio limonius* Phil., *Senecio valdivianus* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Nombre vulgar: Hualtata, lengua de vaca.

Senecio bustillosianus J. Remy var. *borchersii* (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio borchersii* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

Senecio bustillosianus J. Remy var. *bustillosianus*
Sinónimos: *Senecio schulzeanus* Meigen
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2600-2700 m.

Senecio cachinalensis Phil. var. *cachinalensis*
Sinónimos: *Senecio breanus* Phil., *Senecio larrañagae* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 200-400 m.

Senecio cachinalensis Phil. var. *copiapinus* (Phil.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio copiapinus* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.

Senecio calocephalus Poepp.
Sinónimos: *Senecio columbaria* J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Senecio candidans DC.
Sinónimos: *Brachypappus candicans* (J. Vahl) Sch. Bip.,
Cacalia candicans Vahl, *Culcitium gayanum* J. Remy,
Senecio culciremy Cuatrec.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio candollei Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3500-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chukuchuku.

Senecio cerberoanus J. Remy var. *cerberoanus*
Sinónimos: *Senecio berterianus* DC. var. *obtusus* DC.,
Senecio phaedruss Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Senecio cerberoanus J. Remy var. *lanatus* Cabrera
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Senecio chamomillifolius Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Senecio chañaralensis Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio chilensis Less. var. *argophyllus* (Phil.) Cabrera
fina. *argophyllus*
Sinónimos: *Senecio argophyllus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio chilensis Less. var. *argophyllus* (Phil.) Cabrera
fina. *discoideus* Cabrera
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio chilensis Less. var. *chilensis*

Sinónimos: *Senecio argenteus* Kuntze ex DC., *Senecio linearifolius* Colla, *Senecio phagnaloides* DC.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio chillanensis Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 700-1800 m.

Senecio chionophilus Phil.

Sinónimos: *Senecio vulcanicus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio chrysocomoides Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio chrysolepis Phil.

Sinónimos: *Senecio juncaensis* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3400-4200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Senecio clarioneifolius J. Remy

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2300-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio coquimbensis Phil.

Sinónimos: *Senecio berterianus* DC., hom. illeg., *Senecio glanduloso-hirtellus* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-700 m.

Senecio coronopodiphyllus J. Remy

Sinónimos: *Metazanthus cacalioides* Meyen

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio corrugatus (Phil.) Pelsner

Sinónimos: *Robinsonia gayana* Decne., *Robinsonia corrugata* Phil., *Robinsonia longifolia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Resino.

Senecio coscayanus Ricardi & Martic.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 3200 m.

Senecio covasii Cabrera

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 1800-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio crepidioides Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 400-600 m.

Senecio crithmoides Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio diazii* Phil., *Senecio remyanus* Phil., *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzei* Wedd., hom. illeg., *Senecio julietii* Phil., *Senecio iberidifolius* Phil., p.p.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1700-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio crusoei Pelsner

Sinónimos: *Robinsonia gracilis* Decne., *Robinsonia micrantha* Phil. ex Hemsl.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Resinillo.

Senecio ctenophyllus Phil.

Sinónimos: *Senecio vittatus* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Nombre vulgar: Flor amarilla, monte manzanilla, tuksatuksa.

Senecio cumingii Hook. & Arn. var. *bracteosus* (J. Remy)

Cabrera

Sinónimos: *Senecio bracteosus* J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Senecio cumingii Hook. & Arn. var. ***cumingii***

Sinónimos: *Senecio paralias* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Perú.

Senecio cuneatus Hook.f.

Sinónimos: *Senecio arenicola* Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio darwinii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *laxus* Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio davilae Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 600-3000 m.

Senecio depressus Hook. & Arn.

Sinónimos: *Culcitium depressum* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Senecio poeppigii* Hook. & Arn. var. *condensatus* Reiche
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 3100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio dichotomus Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-2900 m.

Senecio diemii Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio digitatus Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio donianus Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio arachnoideus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2700-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio dryophyllus Meyen & Walp.

Sinónimos: *Senecio tarapacanus* Phil., *Senecio amphibolus* Wedd., *Senecio amphibolus* Wedd. var. *socialis* (Wedd.) Cabrera, *Senecio socialis* Wedd.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Wilaparpa, parpararpa.

Senecio elquiensis Cabrera

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 800 m.

Senecio eriophyton J. Remy

Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-4800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chachacoma, cachacoma.

Senecio eruciformis J. Remy var. ***brachycephalus*** (Phil.)

Cabrera
Sinónimos: *Senecio rutaceus* Phil. var. *brachycephalus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 1200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio eruciformis J. Remy var. ***eruciformis***

Sinónimos: *Senecio rutaceus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 2200-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Nica.

Senecio espinosae Cabrera

Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2500 m.

Senecio evenius (Phil.) Pelsner

Sinónimos: *Robinsonia evenia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Senecio farinifer Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio apricus* Phil., *Senecio belophyllus* J. Remy, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *longifolia* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 700-1600 m.

Senecio flaginoides DC.

Sinónimos: *Senecio albolanatus* Phil., hom. illeg., *Senecio leuciscus* Phil., *Senecio leyboldtii* Phil., *Senecio meyenii* Phil., *Senecio sericeus* Kuntze, p.p.

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, MAG.

Rango altitudinal: 400-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio fistulosus Poepp. ex Less. var. ***fistulosus***

Sinónimos: *Senecio hualtata* Bertero ex DC., *Senecio amplus* J. Remy, *Senecio cordillerae* Phil., *Senecio dombeyanus* DC., *Senecio hualtata* Bertero ex DC. var. *variabilis* (Phil.) Reiche, *Senecio quillotensis* Phil., *Senecio variabilis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1600-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualtata, lampazo, paco.

Senecio fistulosus Poepp. ex Less. var. ***ochroleucus*** (Hook. & Arn.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio fistulosus* Poepp. ex DC., nom. illeg., *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, BIO, LRI.

Rango altitudinal: 1200-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio francisci Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1300-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio garaventai Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1600-1900 m.

Senecio gayanus DC.

Sinónimos: *Senecio soloanus* Phil., *Senecio sotoanus* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 700-1000 m.

Senecio gilliesii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Cacalia candicans* Poepp. ex DC., *Cacalia nivea* Kuntze ex DC., *Culcitium poeppigii* DC., *Senecio poeppigii* (DC.) Wedd., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 700-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio glaber Less.

Sinónimos: *Senecio molinae* Phil., *Senecio ahrendsi* Phil., *Senecio delfinii* Phil., *Senecio fernandezii* Phil., *Senecio möelleri* Phil., *Senecio phyllocomus* Phil., *Senecio pratensis* Phil., *Senecio pratensis* Phil. var. *delfinii* (Phil.) Reiche, *Senecio glaber* Less. var. *pratensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio tocornali* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1100-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chilquilla.

Senecio glabratus Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio auriculatus* Poepp. ex DC., *Senecio berterianus* Colla, *Senecio valparadisiacus* Colla, *Senecio macrotus* Kuntze ex Meyen

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Senecio gnidioides Phil. var. ***gilvus*** (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio gilvus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio gnidioides Phil. var. ***gnidioides***

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio grandjotii Cabrera

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 3200-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio grindeliifolius DC.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio gunkelii Cabrera

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500 m.

Senecio haenkeanus Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4500-5000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Chukuchuku.

Senecio haenkei DC.

Sinónimos: *Senecio chionotus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio hakeifolius Bertero ex DC. var. *hakeifolius*

Sinónimos: *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var.

ochroleucus (Phil.) Reiche, *Senecio leptophyllus* Hook.

& Arn., *Senecio ochroleucus* Phil., hom. illeg., *Senecio*

valparadisiensis J. Remy, *Senecio platycodon* Baker, p.p.,

Senecio linearilobus Bong. var. *beta* Hook. & Arn.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Nombre vulgar: Pie de pajarito.

Senecio hakeifolius Bertero ex DC. var. *vidalii* (Phil.)

Reiche

Sinónimos: *Senecio vidalii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200 m.

Senecio haloragis J. Remy var. *glandulosus* Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio haloragis J. Remy var. *haloragis*

Sinónimos: *Senecio germainii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio helgae Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4000-4600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio hickenii Hauman

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio hieracium J. Remy

Sinónimos: *Senecio pearcei* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio hirsutulus Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio hirtus Cabrera

Sinónimos: *Senecio crispus* Phil., hom. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Nombre vulgar: Chachacom.

Senecio humifusus (Hook.f.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *eradiatus*

A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 900-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio humillimus Sch. Bip. ex Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pasto, k'jota.

Senecio illapelinus Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 3100-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio illinitus Phil.

Sinónimos: *Senecio cervicornis* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Senecio invalidus C. Jeffrey

Sinónimos: *Senecio debilis* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 1100-1500 m.

Senecio isernii Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio jacobiformis J. Remy

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 0-2600 m.

Senecio jaffuelii Cabrera

Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1700-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio jarae Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2400-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Romerillo.

Senecio jilesii Cabrera

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2000 m.

Senecio johnstonianus Cabrera

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2000-2700 m.

Senecio jorquerae Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Senecio jungei Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Senecio kingii Hook.f.

Sinónimos: *Senecio gymnocaulos* Phil., *Senecio subdiscoideus* Sch. Bip. ex Wedd., *Metazanthus grandiflorus* Meyen, *Senecio breviculus* Phil., *Senecio caespitosus* Phil., *Senecio kingii* Hook.f. fma. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Hosseus, *Senecio purpuratus* Phil., *Senecio purpuratus* Phil. var. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Reiche, *Senecio kingii* Hook.f. var. *paradoxus* (Albov ex Kurtz) Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio laetevirens Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio laevicaulis DC.

Sinónimos: *Senecio holophyllus* J. Remy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2500 m.

Senecio landbeckii Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Senecio laseguei Hombr. & Jacquinot

Sinónimos: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *intermedius* Sch. Bip., *Senecio magellanicus* Phil., hom. illeg., *Senecio philippii* De Wild.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 100-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio lastarrianus J. Remy

Sinónimos: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *angustifolius* DC., *Senecio nitidus* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 900-2000 m.

Senecio laucanus Ricardi & Martic.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4200-4300 m.

Senecio leptocaulos Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 800-1600 m.

Senecio leucomallus A. Gray var. *incisus* A. Gray

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio leucomallus A. Gray var. *leucomallus*

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio leucophyton Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 1500-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio leucus Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio linaresensis Soldano

Sinónimos: *Senecio subdentatus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *aclonetus* (Phil.)

Cabrera

Sinónimos: *Senecio aclonetus* Phil., *Senecio encelia* J.

Remy, *Senecio microcephalus* Phil. var. *aclonetus* (Phil.)

Kuntze

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *heliophytoides* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Senecio heliophytoides* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *linariifolius*

Sinónimos: *Senecio promaucanus* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio lithostaurus Cabrera

Sinónimos: *Senecio remyanus* Phil. fma. *eradiatus* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio looseri Cabrera

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 3000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio lorentziella Hicken

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2900-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio luridus Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2400 m.

Senecio madagascariensis Poir.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ.

Senecio madariagae Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-3400 m.

Senecio magellanicus Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio culcitenellus* Cuatrec., *Senecio*

vaginifolius Sch. Bip., *Culcitium magellanicum* (Hook. &

Arn.) Hombr. & Jacquinot

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio mapuche Cabrera

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1800-2200 m.

Senecio martinensis Dusén
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 600-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio masafuerae (Skotts.) Pelser
Sinónimos: *Robinsonia masafuerae* (Skotts.) Pelser
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Senecio masatierrae Pelser
Sinónimos: *Robinsonia macrocephala* Decne.,
Symphyochaeta macrocephala (Decne.) Skotts.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Incienso.
Nota: Extinta.

Senecio maulinus Reiche
Sinónimos: *Senecio leucomallus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 200-2800 m.

Senecio mesembrynus Cabrera
Sinónimos: *Senecio bakeri* Reiche
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio microcephalus Phil. var. *angustifolius* Cabrera
Arbusto. Nativo.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 300-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio microcephalus Phil. var. *microcephalus*
Arbusto. Nativo.
Distribución: NUB, LRI.
Rango altitudinal: 300-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio microphyllus Phil.
Sinónimos: *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var.
adenophyllus Hook. & Arn., *Senecio gypsophilus* Phil.,
Senecio bowenkampi Phil., *Senecio alfalfalis* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio micropifolius DC.
Sinónimos: *Senecio pelolepis* Johnst.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1900-4300 m.

Senecio microtis Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-3200 m.

Senecio minutifolius Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1600-3200 m.

Senecio miser Hook. f.
Sinónimos: *Senecio ericoides* Reiche, *Senecio fueginus*
Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 100-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio montianus J. Remy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, COQ, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2400-3000 m.

Senecio munnozii Cabrera
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio murinus Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 400-1400 m.
Nombre vulgar: Hierba de los ratones, hierba zonza.

Senecio murorum J. Remy
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 100-200 m.
Nombre vulgar: Monte azulillo.

Senecio myriophyllus Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1200 m.

Senecio neaei DC. var. ***incisus*** DC.

Sinónimos: *Senecio sericeus* Kuntze var. *incisus* (DC.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio neaei DC. var. ***neaei***

Sinónimos: *Senecio sericeus* Kuntze var. *neaei* (DC.) Kuntze

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 300-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio nigrescens Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio chamaedryfolius* Less.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Nombre vulgar: Nilhue.

Senecio nublensis Soldano

Sinónimos: *Senecio carnosus* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Senecio nutans Sch. Bip.

Sinónimos: *Senecio graveolens* Wedd.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tola hembra, chachacoma, chachakoma macho.

Senecio obtectus Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2200-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio oreinus Cabrera

Sinónimos: *Senecio andicola* Phil., hom. illeg., *Senecio monticola* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio oreophyton J. Remy

Sinónimos: *Senecio medicinalis* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3100-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba del incordio, chachacoma.

Senecio otaeguianus Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio otites Kunze ex DC.

Sinónimos: *Senecio chiloensis* Phil., *Senecio otophorus* Phil., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 600-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Trompetilla, tutuco, trompón.

Senecio pachyphyllos J. Remy

Sinónimos: *Senecio domeykoanus* Phil., *Senecio sedifolius* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1200-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio pappii Ricardi & Martic.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, ANT.

Rango altitudinal: 3200-3600 m.

Nombre vulgar: Kopa de cóndor, chachakoma blanca, pupusa.

Senecio parodii Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 300-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. ***alyssoides*** (Sch. Bip.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacquinot var. *alyssoides* Sch. Bip., *Senecio exilis* Hombr. & Jacquinot, *Senecio floccidus* Hombr. & Jacquinot

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. ***andersonii*** (Hook.f.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio andersonii* Hook.f., *Senecio andersonii* Hook.f. var. β Hook.f., *Senecio forsteri* Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 100-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. ***lobatifolius*** (Hombr. & Jacquinot) Cabrera
Sinónimos: *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. β J. Remy, nom. illeg., *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *lobatifolia* Hombr. & Jacquinot, *Senecio danyaussii* Hombr. & Jacquinot var. *trifurcatus* Sch. Bip.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. ***patagonicus***
Sinónimos: *Senecio lechleri* Phil., *Senecio palenae* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio paucidentatus DC. var. ***limbardioides*** (Hook. & Arn.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio limbardioides* Hook. & Arn., *Senecio olivaceus* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio paucidentatus DC. var. ***paucidentatus***
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Senecio pemehuensis Soldano
Sinónimos: *Senecio scoparius* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1400 m.

Senecio pentaphyllus Phil.
Sinónimos: *Senecio lacinosus* Phil., *Senecio navarri* Phil., *Senecio pentaphyllus* Phil. var. *navarri* (Phil.) Reiche, *Senecio schoenleini* Meigen
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2300-2500 m.

Senecio peripotamus C. Jeffrey
Sinónimos: *Senecio rivularis* J. Remy, hom. illeg.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-2700 m.

Senecio peteroanus Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, ARA.
Rango altitudinal: 1600-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio petrophyus Pelsler
Sinónimos: *Robinsonia saxatilis* Danton
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 300 m.

Senecio pfisteri Ricardi & Martic.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4300-4400 m.

Senecio philippicus Regel & Körn.
Sinónimos: *Senecio paposanus* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-900 m.

Senecio philippii Sch. Bip. ex Wedd.
Sinónimos: *Senecio ammophilus* Phil., *Senecio hirthi* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio phyllicifolius Poepp. ex DC.
Sinónimos: *Cineraria phyllicifolia* Poepp. ex DC.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-2000 m.

Senecio phylloleptus Cuatrec.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Flor amarilla.

Senecio pilquensis H. Buek
Sinónimos: *Senecio heterophyllus* DC., hom. illeg., *Senecio phyllomorphus* Steud., *Senecio porophylloides* J. Remy
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 900-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio pissisi Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3000-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio planiflorus Kunze ex Cabrera

Sinónimos: *Senecio littoralis* Poepp. ex DC., nom. illeg.,

Senecio sinuatilobus DC. var. *littoralis* DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Senecio poeppigii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Senecio dealbatus* Phil., *Senecio micropifolius*

DC. var. β . *monocephalus* DC., *Senecio williamsii* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 1300-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio polygaloides Phil.

Sinónimos: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var.

tenuifolius DC., *Senecio multibracteatus* Phil., hom. illeg.,

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *discoideus* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, AIS.

Rango altitudinal: 2000-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio polyphyllus Kunze ex DC.

Sinónimos: *Senecio tristis* Phil. var. *comberi* Greenm.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1700-2600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Senecio portalesianus J. Remy var. *lanuginosus* (Phil.)

Cabrera

Sinónimos: *Senecio antucensis* Phil. var. *lanuginosa* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-2500 m.

Senecio portalesianus J. Remy var. *portalesianus*

Sinónimos: *Senecio antucensis* Phil., *Senecio polyphyllus*

Kunze ex DC. var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Senecio*

ceratophyllum D. Don ex Hook. & Arn. var. β *nana* D. Don

ex Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1500-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio portulacoides J. Remy

Sinónimos: *Senecio macer* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1200-2800 m.

Senecio prenanthifolius Phil.

Sinónimos: *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Phil., nom.

nud., *Senecio helianthoides* Phil., *Senecio ranconensis* Sch.

Bip. ex Lechl., nom. nud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senecio proteus J. Remy var. *geissei* (Phil.) Cabrera

Sinónimos: *Senecio geissei* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1200-1800 m.

Senecio proteus J. Remy var. *proteus*

Sinónimos: *Senecio bracteolatus* Phil., *Senecio foliolosus*

Reiche, *Senecio pinnatifidus* Phil., *Senecio stenophyllum*

Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

Nombre vulgar: Pajarito, palito blanco.

Senecio pseudalmeidae Cabrera

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 300 m.

Senecio pseuderucoides Cabrera

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1900 m.

Senecio pubescens Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1500-1600 m.

Senecio puchii Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4200-4800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Chachakoma, leña de tola, tola de piedra.

Senecio pycnanthus Phil.

Sinónimos: *Senecio pycnanthus* Phil. var. *brevifolia* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-1200 m.

Senecio rahmeri Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 4100-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio reicheanus Cabrera

Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3600 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Senecio renjifoanus Phil.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1600-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio ricardii Martic. & Quezada

Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, ATA.
Rango altitudinal: 3100-3400 m.

Senecio santeliciis Phil.

Sinónimos: *Senecio crispus* Phil. var. *santelisis* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3500-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio santiagoensis Kuntze

Sinónimos: *Senecio leucanthemifolius* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2300-2500 m.

Senecio saxicola Wedd.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200-300 m.
Países limítrofes: Perú.

Senecio schoenemannii Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1300 m.

Senecio scopulorum Poepp.

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 900-1500 m.

Senecio scorzonerifolius Meyen & Walp.

Sinónimos: *Senecio armeriifolius* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 4400-4600 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Romerillo chico.

Senecio segethii Phil.

Sinónimos: *Senecio peraltae* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio sericeonitens Speg.

Sinónimos: *Senecio patagonicus* Phil., hom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 700-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio serratifolius (Meyen & Walp.) Cuatrec.

Sinónimos: *Senecio cernuus* Phil., hom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Senecio sinuatilobus DC.

Sinónimos: *Senecio mollis* Poepp. ex DC.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Senecio skottsbergii Cabrera var. *anomalus* Cabrera

Subarbusto. Endémico.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Senecio skottsbergii Cabrera var. *skottsbergii*

Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 600-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio smithii DC.

Sinónimos: *Brachypappus smithii* (DC.) Sch. Bip., *Senecio verbascifolius* Hombr. & Jacquinot ex Decne, *Senecio kurtzii* Phil., *Senecio punctarenicus* Krause, *Cineraria leucanthea*

Banks & Sol. ex Walp.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio socompa Cabrera
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio spinosus DC.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3400-4600 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Añawayaya, kaylla, espina, tola de espino, té del cuerno.

Senecio subauritus Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-1500 m.

Senecio subpubescens Cabrera
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 1000-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. *salsus* (Griseb.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio diversifolius* Phil., hom. illeg., *Senecio salsus* Griseb., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *diversifolius* (Phil.) Cabrera
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Chachakoma macho.

Senecio subumbellatus Phil.
Sinónimos: *Senecio thermarum* Phil., *Senecio antirrhinifolius* Phil., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *subdiscoideus* DC., *Senecio multicaulis* Poepp., hom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio sundtii Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3600-4700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Senecio sylvaticus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Senecio tacorensis Cabrera
Sinónimos: *Senecio olivaceobracteatus* Ricardi & Martic.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4200 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Koya blanca, monte blanco, payakoa, kpa de cóndor.

Senecio talquinus Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2100 m.

Senecio tehuelches (Speg.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio miser* Hook.f. var. *tehuelches* Speg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 400-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio thurifer (Decne.) Pelsler
Sinónimos: *Robinsonia thurifera* Decne.
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Senecio tinctolobus I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3000-4300 m.

Senecio tricuspидatus Hook. & Arn. var. *dentatus* (Sch. Bip.) Cabrera
Sinónimos: *Senecio ibari* Phil., *Senecio longipes* Hook.f., *Senecio longipes* Hook.f. var. *dentatus* Sch. Bip., *Senecio longipes* Hook.f. var. *integrifolius* Sch. Bip.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio tricuspидatus Hook. & Arn. var. *tricuspидatus*
Sinónimos: *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm., *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm. var. *simplicior* O. Hoffm. ex Dusén
Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio trifidus Hook. & Arn.
Sinónimos: *Senecio demissus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2700-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio trifurcatus (G. Forst.) Less.
Sinónimos: *Cineraria trifurcata* (G. Forst.) Spreng., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pentadactylus* (Phil.) Speg., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pisensis* Sch. Bip. ex Wedd., *Senecio pentadactylus* Phil., *Tussilago trifurcata* G. Forst.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 800-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio trifurcifolius Hieron.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4200-5100 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Senecio triodon Phil.
Sinónimos: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *subradiatus* DC.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 900-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio tripinnatifidus Reiche
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1100-1300 m.

Senecio tristis Phil.
Sinónimos: *Senecio consanguineus* Phil., *Senecio setulosus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1200-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio troncosii Phil.
Sinónimos: *Senecio thinophilus* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Senecio viridis Phil. var. *radiatus* R.E. Fr.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio viridis Phil. var. *viridis*
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Mocora, mocoraca.

Senecio viscosissimus Colla
Sinónimos: *Senecio hakeaefolius* Hook. & Arn., *Cineraria humilis* Poepp.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, COQ, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Senecio volckmannii Phil.
Sinónimos: *Senecio rosmarinus* Phil. var. *ascotanensis* (Phil.) Cabrera, *Senecio rosmarinus* Phil., *Senecio ascotanensis* Phil., *Senecio doña-e-annae* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3300-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Romero, pukachaki, pata colorada, kopa de cóndor, viravira.

Senecio vulgaris L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Senecio websteri Hook.f.
Sinónimos: *Senecio websteri* Hook.f. var. *subdiscoideus* A. Gray
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio werdermannii Greenm.
Sinónimos: *Senecio modestus* Phil., hom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Senecio xerophilus Phil. var. *deserticola* (Cabrera) Cabrera
Sinónimos: *Senecio deserticola* Cabrera, *Senecio cremophilus* Phil., hom. illeg., *Senecio eremophilus* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4500 m.

Senecio xerophilus Phil. var. *xerophilus*
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3700-4700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Romerillo, romerillo blanco.

Senecio zapahuirensis Martic. & Quezada
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2100-3000 m.

Senecio zoellneri Martic. & Quezada
Sinónimos: *Culcitium albifolium* Zoellner
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Chukuchuku.

Senecio zosterifolius Hook. & Arn.
Sinónimos: *Senecio uliginosus* Phil., *Haplostichia stolonifera* Phil., *Senecio cotuloides* Reiche, *Senecio graminifolius* Phil., *Senecio potamogetonifolius* Sch. Bip. ex Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 600-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Sigesbeckia

Sigesbeckia serrata DC.
Sinónimos: *Sigesbeckia jorullensis* auct. non Kunth
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 1300-2900 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Silybum

Silybum marianum (L.) Gaertn.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Smallanthus

Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

Solidago

Solidago argentinensis López Laph. & Semple
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Solidago chilensis Meyen
Sinónimos: *Solidago linearifolia* DC., *Solidago microglossa* DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker, *Aster sagei* Phil., *Solidago coquimbana* Phil., *Solidago floribunda* Phil., *Solidago laxiflora* Phil., *Solidago parviflora* Phil., *Solidago recta* Phil., *Solidago valdiviana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Fulel, huellen.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Solidago patagonica Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Soliva

Soliva sessilis Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Soliva microloma* Phil., *Soliva valdiviana* Phil., *Gymnostyles chilensis* Spreng.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Dicha.

Soliva stolonifera (Brot.) R. Br. ex Sweet
Sinónimos: *Soliva urbica* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, MAU, JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Sonchus

***Sonchus arvensis* L.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

***Sonchus asper* (L.) Hill**
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA, IDE.

***Sonchus oleraceus* L.**
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Sonchus tenerrimus* L.**
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Spilanthes

***Spilanthes leiocarpa* DC.**
Sinónimos: *Ceratocephalus leiocarpus* (DC.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 200-300 m.
Países limítrofes: Perú.

Spinoliva

***Spinoliva ilicifolia* (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. *baccharoides* (D. Don ex Hook. & Arn.) G.Sancho**
Sinónimos: *Proustia baccharoides* D. Don ex Hook. & Arn., *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn. fma. *baccharoides* (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Nombre vulgar: Huañil, olivillo.

Spinoliva ilicifolia* (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. *ilicifolia
Sinónimos: *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *ilicifolia* (Hook. & Arn.) DC., *Proustia olivillo* Phil., *Proustia reticulata* Phil., *Proustia ilicifolia* Hook. & Arn. fma. *ilicifolia*
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 900-2000 m.
Nombre vulgar: Huañil, olivillo.

Stevia

***Stevia philippiana* Hieron.**
Sinónimos: *Stevia hyssopifolia* Phil., hom. illeg., *Stevia menthaefolia* Phil., hom. illeg., *Stevia hyssopifolia* var. *panulensis* B.L. Rob. ex I.M. Johnst.; *Porophyllum tarapacanicum* Zoellner
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 780-3600 m.
Nombre vulgar: Mulumulu.

Symphotrichum

***Symphotrichum glabrifolium* (DC.) G.L. Nesom**
Sinónimos: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *australis* (Phil.) Reiche, *Erigeron australis* Phil., *Erigeron glabrifolius* DC., *Erigeron scorzoneraefolium* J. Remy, *Aster glabrifolius* (DC.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 780-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Symphotrichum patagonicum* (Cabrera) G.L. Nesom**
Sinónimos: *Aster patagonicus* Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 250-350 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Symphotrichum peteroanum* (Phil.) G.L. Nesom**
Sinónimos: *Aster peteroanus* Phil., *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *latifolius* Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Symphotrichum squamatum* (Spreng.) G.L. Nesom**
Sinónimos: *Aster exilis* Elliott var. *australis* A. Gray, *Aster moelleri* (Phil.) Reiche, *Baccharis asteroides* Bertero ex Colla, *Conyza berterooana* Phil., *Conyza squamata* Spreng., *Conyzanthus squamatus* (Spreng.) Tamamsch., *Erigeron depilis* Phil., *Erigeron semiamplexicaule* Meyen, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron., *Tripolium oliganthum* Phil., *Tripolium moelleri* Phil., *Tripolium conspicuum* J. Remy, *Aster asteroides* (Bertero ex Colla) Rusby, comb. illeg., *Symphotrichum subulatum* (Michx.) G.L. Nesom var. *squamatum* (Spreng.) S.D. Sundb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Symphyotrichum vahlii (Gaudich.) G.L. Nesom
Sinónimos: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *tenuifolius* (Phil.) Cabrera, *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn., *Aster zosterifolius* Reiche, *Erigeron graminifolius* Phil., *Erigeron pugae* Phil., *Erigeron vahlii* Gaudich., *Symphyotrichum vahlii* (Gaudich.) G.L. Nesom var. *tenuifolium* (Phil.) G.L. Nesom, *Tripolium humile* Phil., *Tripolium tenuifolium* Phil., *Astradelphus calbucanus* Phil., *Erigeron tripolioides* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tagetes

Tagetes biflora Cabrera
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tagetes minuta L.
Sinónimos: *Tagetes bonariensis* Pers.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Quinchihue, soyko, suyko blanco.

Tagetes multiflora Kunth
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Soyko, sayko, té de burro.

Tanacetum

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Tanacetum vulgare L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Taraxacum

Taraxacum fernandezianum Dahlst. ex Skottsb.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Nota: La cita de Richards (1976) de su presencia en la Región Metropolitana de Santiago se considera dudosa.

Taraxacum gilliesii Hook. & Arn.
Sinónimos: *Taraxacum ibari* Phil., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *magellanicum* (Comm. ex Sch. Bip.) Reiche, *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip., *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip. var. *lobatum* Dahlst.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Taraxacum officinale F.H. Wigg.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Tessaria

Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.
Sinónimos: *Baccharis absinthioides* Hook. & Arn., *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Pluchea absinthioides* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Brea, chilquilla, sorona, péril, callacozo, hierba de la zorra.

Thamnosericis

Thamnosericis lacerata (Phil.) F. Phil. fma. *lacerata*
Sinónimos: *Rea lacerata* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: IDE.

Thamnosericis lacerata (Phil.) F. Phil. fma. *obtusifolia* Skottsb.
Arbusto. Endémico.
Distribución: IDE.

Tolpis

Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Tragopogon

Tragopogon dubius Scop.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: MAU.

Tragopogon porrifolius L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, AIS.

Trichocline

Trichocline aurea (D. Don) Reiche

Sinónimos: *Bichenia aurea* D. Don, *Chaetanthera berteriana* Less., *Trichocline pedicularifolia* Walp.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Hierba de la yesca, yerguilla.

Trichocline caulescens Phil.

Sinónimos: *Onoseris lanata* Phil., *Trichocline nivea* Phil., *Trichocline stuebelii* Phil., *Chaetanthera crispa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1800-3500 m.

Nombre vulgar: Wanti, garra de león, bailabaila.

Trichocline cineraria (D. Don) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Chaetanthera crenata* J. Remy, *Gerbera cineraria* (D. Don) Kuntze, *Leuceria contrayerba* Kurtz, *Trichocline contrayerba* (Kurtz) Hauman, *Trichocline crenata* (J. Remy) Reiche, *Bichenia cineraria* D. Don, *Bichenia crenata* (J. Remy) Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1700-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trichocline dealbata (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.f. ex Griseb.

Sinónimos: *Chaetanthera dealbata* Hook. & Arn., *Chaetanthera parviflora* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trichocline deserticola Zardini

Sinónimos: *Trichocline spathulata* (Phil.) Zardini, comb. illeg., *Onoseris spathulata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Nombre vulgar: Pastito plomo, botón.

Tripleurospermum

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, MAG.

Triptilion

Triptilion achilleae DC.

Sinónimos: *Triptilion chilense* Bertero ex DC., nom. nud., *Triptilion dusenii* O. Hoffm., *Triptilion euphrasioides* DC., *Triptilion tenuifolium* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LBO, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Triptilion benaventei J. Remy

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-1300 m.

Triptilion berteroi Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1200-1600 m.

Triptilion capillatum (D. Don) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Reiche, *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Nassauvia capillata* D. Don, *Triptilion andinum* Phil., *Triptilion laxum* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 300-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Triptilion cordifolium Lag. ex Lindl.

Sinónimos: *Nassauvia cordifolia* (Lag. ex Lindl.) D. Don, comb. illeg., *Triptilion maritimum* Poepp. ex DC., nom. nud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Siempreviva del cerro.

Triptilion gibbosum J. Remy

Sinónimos: *Triptilion compactum* Phil., *Triptilion pusillum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Triptilion spinosum Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Triptilion bulbosum* J. Remy, *Triptilion diffusum* D. Don, *Triptilion digitatum* Phil., *Triptilion pectinatum* Phil. var. *millefolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion pectinatum* Phil., *Triptilion ramulosum* Phil., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *eriochlaenum* DC., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *integrifolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *remyanum* (Phil.) Reiche, *Nassauvia spinosa* (Ruiz & Pav.) D. Don, *Nassauvia diffusa* D. Don, nom. illeg., *Triptilion humile* Phil., *Triptilion integrifolium* Phil., *Triptilion laciniatum* Willd., *Triptilion millefolium* Phil., *Triptilion remyanum* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Siempreviva.

Trixis

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don

Sinónimos: *Perdicium cacalioides* Kunth

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Urmenetea

Urmenetea atacamensis Phil.

Sinónimos: *Onoseris atacamensis* (Phil.) Hoffm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2400-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Kótar, koka del desierto, coquilla, oreja de ratón.

Urospermum

Urospermum picroides (L.) F.W. Schmidt

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Verbesina

Verbesina aurita Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A. Gray

Sinónimos: *Verbesina scabra* Phil., hom. illeg., *Ximenesia*

encelioides Cav., *Verbesina encelioides* (Cav.) Echegaray, comb. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Maravilla, flor amarilla, mirasol, mirasol chico.

Verbesina saubinetia Klatt

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500-700 m.

Villanova

Villanova oppositifolia Lag.

Sinónimos: *Vasquezia biternata* Phil., *Vasquezia oppositifolia*

(Lag.) S.F. Blake

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Villanova robusta Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2800-3800 m.

Volutaria

Volutaria tubuliflora (Murb.) Sennen

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

Werneria

Werneria aretioides Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Werneria cochlearis Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Werneria glaberrima Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4200-4600 m.

Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Maransel, comida de vizcacha.

Werneria heteroloba Wedd.
Sinónimos: *Werneria heteroloba* Wedd. fma. *microcephala* Rockh.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Teqerere, pasto de bofedal.

Werneria pinnatifida J. Remy
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3400-4450 m.
Países limítrofes: Argentina.

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.
Sinónimos: *Werneria denticulata* S.F. Blake, *Werneria brachypappa* Phil., hom. illeg., *Werneria rhizoma* J. Remy, *Werneria brachypappa* Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2200-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Mamañika, qatari, anojarpsike, vega.

Werneria solivifolia Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Werneria spathulata Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pupusa, pupusa de agua.

Xanthium

Xanthium spinosum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Xanthium strumarium L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, NUB, BIO.

Xenophyllum

Xenophyllum ciliolatum (A. Gray) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria ciliolata* A. Gray
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5200 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pupusa, poposa, yaretilla.

Xenophyllum incisum (Phil.) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria incisa* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4300-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pupusa del agua, pupusa del campo.

Xenophyllum juniperinum (Hieron.) J. Calvo
Sinónimos: *Werneria juniperina* Hieron.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4100-5200 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria poposa* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-5300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Poposa, pupusa, jasuasos, asoaso, yareta.

Xenophyllum pseudodigitatum (Rockh.) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria pseudodigitata* Rockh.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Xenophyllum weddellii (Phil.) V.A. Funk
Sinónimos: *Werneria weddellii* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Poposa, pupusa, purapura.

Yunquea

Yunquea tenzii Skottsb.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

BALANOPHORACEAE

Ombrophytum

Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B. Hansen
Sinónimos: *Juelia subterranea* Aspl., *Juelia lilloana* Sleumer, *Juelia meyeri* Sleumer, *Ombrophytum peruvianum* auct. non Poepp. & Endl.
Hierba parásita. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Maíz del monte, sicha, pora.

BASELLACEAE

Anredera

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: VAL, IPA.

BERBERIDACEAE

Berberis

Berberis actinacantha Mart.
Sinónimos: *Berberis brachyacantha* Phil. ex Reiche, *Berberis coquimbensis* Muñoz, *Berberis crispa* Gay, *Berberis florida* Phil., *Berberis hakeoides* (Hook.f.) C.K. Schneid., *Berberis variiflora* C.K. Schneid., *Berberis actinacantha* Mart. var. *crispa* (Gay) Reiche, *Berberis congestiflora* Gay var. *hakeoides* Hook.f.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-1900 m.
Nombre vulgar: Michay.

Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. *brachybotria* (Gay) Landrum
Sinónimos: *Berberis brachybotria* Gay, *Berberis brachybotria* Gay var. *brevispina* Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. *chilensis*
Sinónimos: *Berberis diffusa* Gay, *Berberis ferox* Gay, *Berberis fragrans* Phil. ex Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *diffusa* (Gay) Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *ferox* (Gay) Reiche, *Berberis gayi* K. Koch

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 300-1600 m.
Nombre vulgar: Michay.

Berberis congestiflora Gay
Arbusto. Endémico.
Distribución: RME, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Michay.

Berberis corymbosa Hook. & Arn.
Sinónimos: *Berberis paniculata* Phil., *Berberis corymbosa* Hook. & Arn. var. *paniculata* (Phil.) Reiche
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 300-600 m.

Berberis darwinii Hook.
Sinónimos: *Berberis costulata* Gand., *Berberis knightii* (Lindl.) K. Koch, *Mahonia knightii* Lindl.
Arbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Michay, quelung.

Berberis empetrifolia Lam.
Sinónimos: *Berberis mutabilis* Phil., *Berberis wawrana* C.K. Schneid., *Berberis empetrifolia* Lam. var. *magellanica* C.K. Schneid.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Zarcilla, monte negro, uva de la cordillera.

Berberis glomerata Hook. & Arn.
Sinónimos: *Berberis glomerata* Hook. & Arn. var. *zahlbruckneriana* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis zahlbruckneriana* C.K. Schneid.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 500-1000 m.

Berberis horrida Gay
Sinónimos: *Berberis pilosifolia* Ahrendt, *Berberis actinacantha* Mart. var. *mollis* Reiche, *Berberis actinacantha* Mart. var. *horrida* (Gay) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 800-1000 m.
Nombre vulgar: Michay.

Berberis ilicifolia L.f.

Sinónimos: *Berberis subantarctica* Gand., *Berberis lagenaria* Poir.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chelia.

Berberis litoralis Phil.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Nombre vulgar: Michay de Paposo.

Berberis masafuerana Skottsbo.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 200-1100 m.

Berberis microphylla G. Forst.

Sinónimos: *Berberis buxifolia* Lam. var. *antucoana* (C.K. Schneid.) Orsi, *Berberis buxifolia* Lam., *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir., *Berberis inermis* Pers., *Berberis antucoana* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *nuda* C.K. Schneid., *Berberis marginata* Gay, *Berberis spinosissima* (Reiche) Ahrendt, *Berberis buxifolia* Lam. var. *spinosissima* Reiche, *Berberis buxifolia* Lam. var. *papillosa* C.K. Schneid., *Berberis dulcis* Sweet, *Berberis buxifolia* Lam. var. *antarctica* C.K. Schneid.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calafate, michay, mulun.

Berberis montana Gay

Sinónimos: *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean var. *hirsutipes* Sprague, *Berberis coletioides* Lechl., *Berberis polypetala* Phil., *Berberis montana* Gay var. *gracilis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *chillanensis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *coletioides* (Lechl.) C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *montana* (Gay) Reiche, *Berberis coletioides* Lechl. var. *gracilis* (C.K. Schneid.) Ahrendt

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Palo amarillo.

Berberis negeriana Tischler

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Berberis rotundifolia Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Berberis philippii* Ahrendt, *Berberis polymorpha* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

Berberis serratodentata Lechl.

Sinónimos: *Berberis pearcei* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Saloll.

Berberis trigona Kunze ex Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Berberis linearifolia* Phil., *Berberis linearifolia* Phil. var. *longifolia* (Reiche) Ahrendt, *Berberis grisebachii* Lechl., *Berberis trigona* Kunze ex Poepp. & Endl. var. *longifolia* Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 500-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Calafate, michay.

Berberis valdiviana Phil.

Sinónimos: *Berberis valdiviana* Phil. var. *gracilifolia* Ahrendt

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Clen, espina en cruz.

BERBERIDOPSISACEAE

Berberidopsis

Berberidopsis corallina Hook.f.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 100-600 m.

Nombre vulgar: Michay rojo.

BETULACEAE

Alnus

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Árbol. Introducido.

Distribución: COQ, RME, BIO, LLA.

Nombre vulgar: Aliso.

BIGNONIACEAE

Argyria

Argyria adscendens DC. var. *adscendens*

Sinónimos: *Argyria huidobriana* Clos, *Argyria lutea* Phil.,

Argyria viridis Phil. var. *lutea* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 900-3200 m.

Nombre vulgar: Triaca.

Argyria adscendens DC. var. *viridis* (Phil.) Gleisner & Ricardi

Sinónimos: *Argyria viridis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 1800-2500 m.

Argyria bifrons Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Argyria bustillosii Phil.

Sinónimos: *Argyria australis* Phil., *Argyria potentillifolia*

DC. var. *australis* (Phil.) Macloskie, comb. illeg., *Argyria*

potentillifolia DC. var. *australis* (Phil.) Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LBO, BIO.

Rango altitudinal: 800-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Argyria checoensis (Meyen) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Oxalis checoensis* Meyen, *Argyria incana* Phil.,

Argyria sitiens I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Argyria farnesiana Gleisner & Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 900-1000 m.

Argyria geranioides DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 900-1400 m.

Argyria glutinosa Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1400-2900 m.

Argyria potentillifolia DC.

Sinónimos: *Argyria potentillaefolia* DC. var. *beta* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-3500 m.

Argyria radiata (L.) D. Don

Sinónimos: *Bignonia radiata* L., *Argyria canescens* D.

Don, *Argyria puberula* DC., *Argyria feuillie* DC., *Argyria*

tenuifolia C. Presl, *Oxymitus argyloides* C. Presl, *Argyria*

chrysantha Phil., *Argyria eremophila* Phil., *Argyria*

glabriuscula Phil., *Argyria villosa* Phil., *Argyria digitalina*

Phil., *Argyria viridis* Phil. var. *digitalina* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Flor del jote, cartucho, terciopelo.

Argyria tomentosa Phil.

Sinónimos: *Argyria tomentosa* Phil. var. *tenella* (Phil.)

Reiche, *Argyria tenella* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2400-2900 m.

Argyria uspallatensis DC.

Sinónimos: *Argyria trifoliata* DC., *Tecoma uspallatensis*

Mart. ex DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, VAL.

Rango altitudinal: 1700-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Campsidium

Campsidium valdivianum (Phil.) Skottsb.

Sinónimos: *Campsidium chilense* Reissek & Seem., *Tecoma*

valdiviana Phil.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,

MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pilpilvoqui blanco, voqui bejuco, voqui de canasta.

Eccremocarpus

Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) D. Don, comb. illeg., *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) Sweet, *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. var. *sepium* Bertero ex A.DC., *Eccremocarpus sepium* Bertero
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 200-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chupa-chupa, chupapoto.

Tecoma

Tecoma fulva (Cav.) D. Don
Sinónimos: *Bignonia fulva* Cav., *Tecomaria fulvum* (Cav.) Seem., *Bignonia meyeniana* Schauer, *Stenolobium fulvum* (Cav.) Sprague
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 200-2300 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chuvé.

BORAGINACEAE

Amsinckia

Amsinckia calycina (Moris) Chater
Sinónimos: *Lithospermum calycinum* Moris, *Amsinckia angustifolia* Lehm., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *pseudolycopsioides* Clos, *Lithospermum chilense* Colla
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Hierba rocilla.

Amsinckia tessellata A. Gray
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Asperugo

Asperugo procumbens L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Borago

Borago officinalis L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Buglossoides

Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AIS.

Cordia

Cordia decandra Hook. & Arn.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Nombre vulgar: Carbón, carbonillo.

Cryptantha

Cryptantha alfalfalis (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Eritrichium alfalfalis* Phil., *Eritrichium rigidum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 700-1100 m.

Cryptantha alyssoides (A. DC.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium alyssoides* A. DC., *Eritrichium gilliesii* Phil., *Eritrichium talquinum* Phil., *Cryptantha talquina* (Phil.) Brand
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-2700 m.

Cryptantha aprica (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium apricum* Phil., *Eritrichium bridgesii* Phil., *Eritrichium lignosum* Phil., *Eritrichium denudatum* Phil., *Eritrichium closii* Phil., *Eritrichium rengifoanum* Phil., *Cryptantha candelabrum* Brand
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 400-2400 m.

Cryptantha argentea I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Cryptantha aspera (Phil.) Grau

Sinónimos: *Eritrichium asperum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Cryptantha calycina (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium calycinum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3100-3800 m.

Cryptantha calycotricha I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Cryptantha capituliflora (Clos) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium capituliflorum* Clos, *Eritrichium cephalanthum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cryptantha chaetocalyx (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium chaetocalyx* Phil., *Cryptantha divaricata* Reiche, *Eritrichium pustulosum* Phil., *Eritrichium divaricatum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Cryptantha chispae Grau

Sinónimos: *Eritrichium affine* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Cryptantha clandestina (Trevir.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Lithospermum clandestinum* Trevir., *Cryptantha philippiana* Brand
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Cryptantha cynoglossoides (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium cynoglossoides* Phil., *Eritrichium uspallatense* Phil., *Cryptantha phacelioides* auct. non (Clos) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 700-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cryptantha dichita (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium dichita* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Nombre vulgar: Papur.

Cryptantha diffusa (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium diffusum* Phil., *Eritrichium debile* Phil., *Cryptantha debilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha famatinae* Brand, *Cryptantha borchersii* (Phil.) Hauman, *Eritrichium borchersii* Phil., *Eritrichium micranthum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chapinqhora macho.

Cryptantha dimorpha (Phil.) Greene

Sinónimos: *Eritrichium dimorphum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 600-2000 m.

Cryptantha diplotricha (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium diplotrichum* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil. var. *humilis* Phil., *Eritrichium axillare* Phil., *Cryptantha hossei* Brand, *Cryptantha modesta* Brand, *Cryptantha capituliflora* (Clos) Reiche var. *compacta* Brand, *Cryptantha axillaris* (Phil.) Reiche, *Cryptantha diplotricha* (Phil.) Reiche var. *humilis* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cryptantha dolichophylla (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium dolichophyllum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-1200 m.

Cryptantha filaginea (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium filagineum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Perú.

Cryptantha filiformis (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium filiforme* Phil., *Eritrichium mite* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Cryptantha gayi I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-900 m.

Cryptantha globulifera (Clos) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium globuliferum* Clos, *Eritrichium floribundum* Phil., *Cryptantha floribunda* (Phil.) Reiche, *Eritrichium carrizalense* Phil., *Eritrichium glareosum* Phil., *Eritrichium oliganthum* Phil., *Eritrichium parvulum* Phil., *Eritrichium sphaerophorum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cryptantha glomerata Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. ***glomerata***
Sinónimos: *Eritrichium strictum* Phil., *Eritrichium longisetum* Phil., *Eritrichium diplasianthum* Phil., *Eritrichium foliosum* Phil., *Cryptantha candolleana* Brand
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2800 m.

Cryptantha glomerata Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. ***quadrinuculata*** Grau
Sinónimos: *Eritrichium vidali* Phil., *Cryptantha vidali* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Cryptantha glomerulifera (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Eritrichium glomeruliferum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cryptantha gnaphalioides (A. DC.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium gnaphalioides* A. DC., *Eritrichium fruticosum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2900 m.
Nombre vulgar: Té de burro.

Cryptantha haplostachya (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Eritrichium haplostachyum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200 m.

Cryptantha hispida (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium hispidum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2700-3800 m.
Nombre vulgar: Itallapa.

Cryptantha involucrata (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium involucratum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 1300-3500 m.

Cryptantha kingii (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium kingii* Phil., *Eritrichium virens* Phil., *Eritrichium macrocalyx* Phil., *Cryptantha virens* (Phil.) Reiche, *Cryptantha macrocalyx* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Cryptantha limensis (A. DC.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Eritrichium limense* A. DC.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3800 m.
Países limítrofes: Perú.

Cryptantha linearis (Colla) Greene
Sinónimos: *Eritrichium lineare* (Colla) DC., *Myosotis linearis* Colla, *Eritrichium minutiflorum* Phil., *Cryptantha minutiflora* (Phil.) Brand, *Eritrichium gracile* Phil., *Cryptantha gracilis* (Phil.) Reiche, *Eritrichium fallax* Phil., *Cryptantha fallax* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Nombre vulgar: Sobaquillo.

Cryptantha longifolia (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Eritrichium longifolium* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Cryptantha marioricardiana Teillier
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Cryptantha marticorenae Grau

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-900 m.

Cryptantha phaceloides (Clos) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium phaceloides* Clos
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3300 m.

Cryptantha romanii I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 500 m.

Cryptantha spathulata (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium spathulatum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.

Cryptantha subamplexicaulis (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Eritrichium subamplexicaule* Phil.
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Cryptantha taltalensis I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Cryptantha volckmannii (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium volckmannii* Phil., *Eritrichium chrysanthum* Phil., *Cryptantha chrysantha* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 600-2900 m.

Cryptantha werdermanniana I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2300 m.

Cynoglossum

Cynoglossum creticum Mill.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Cynoglossum zeylanicum (Vahl ex Hornem.) Thunb. ex Lehm.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, ARA, LLA.

Echium

Echium plantagineum L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Echium vulgare L.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Johnstonella

Johnstonella parviflora (Phil.) Hasenstab & M.G. Simpson

Sinónimos: *Cryptantha parviflora* (Phil.) Reiche, *Eritrichium parviflorum* Phil., *Eritrichium microphyllum* Phil., *Cryptantha microphylla* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Países limítrofes: Perú.

Lappula

Lappula redowskii (Hornem.) Greene

Sinónimos: *Myosotis redowskii* Hornem.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 100-150 m.
Países limítrofes: Argentina.

Myosotis

Myosotis albiflora Banks & Sol. ex Hook.f.

Sinónimos: *Eritrichium albiflorum* Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Myosotis antarctica Hook. f.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Myosotis arvensis (L.) Hill

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Myosotis azorica H.C. Watson ex Hook.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA.

Myosotis discolor Pers. subsp. *canariensis* (Pit.) Grau
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AIS, MAG.

Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, ARA, LRI, MAG.

Myosotis latifolia Poir.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, RME, NUB, BIO, LRI.

Myosotis laxa Lehm.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,
AIS, JFE.

Myosotis ramosissima Rochel
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Myosotis scorpioides L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, ARA, LLA, AIS, MAG.

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: AIS, MAG.

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: JFE.

Nama

Nama dichotomum (Ruiz & Pav.) Choisy
Sinónimos: *Nama stricta* Phil., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy fma. *amplifolia* Brand, *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *amplifolia* (Brand) C.L. Hitchc., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *stricta* (Phil.) Brand, *Hydrolea dichotoma* Ruiz & Pav., *Marylaunidium dichotomum* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nama undulatum Kunth var. *australe* C.L. Hitchc.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nesocaryum

Nesocaryum stylosum (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Heliotropium stylosum* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Omphalodes

Omphalodes linifolia (L.) Moench
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ARA.

Pectocarya

Pectocarya anomala I.M. Johnst.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2300-2600 m.
Países limítrofes: Perú.

Pectocarya dimorpha (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *dimorpha* I.M. Johnst.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, AIS.

Pectocarya pusilla (A. DC.) A. Gray
Sinónimos: *Gravelia pusilla* A. DC.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, LBO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Phacelia

Phacelia brachyantha Benth.
Sinónimos: *Phacelia brachyantha* Benth. var. *paniculata* A.DC., *Phacelia clinopodioides* Bertero ex Brand, *Phacelia simplicifolia* Colla
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAG.
Rango altitudinal: 1500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray
Sinónimos: *Eutoca cumingii* Benth., *Microgenetes cumingii* A.DC., *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *pusilla*

(Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *grandis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *frigida* (Phil.) Brand, *Eutoca frigida* Phil., *Eutoca peraltae* Phil., *Phacelia frigida* (Phil.) Reiche, *Eutoca litoralis* Phil., *Eutoca grandis* Phil., *Eutoca pinnatifida* Phil., *Eutoca pusilla* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 3200-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Phacelia nana Wedd.

Sinónimos: *Eutoca lomarifolia* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3500-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd.

Sinónimos: *Phacelia boliviana* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *lobulata* Hicken, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *decumbens* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *elatior* Griseb., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *foliosa* Reiche, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *robusta* Wedd., *Phacelia viscosa* Phil., *Phacelia foliosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Phacelia secunda J.F. Gmel. var. *pinnata* (Vahl) Deginani

Sinónimos: *Heliotropium pinnatum* Vahl, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *robusta* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. var. *robusta* (Brand) J.F. Macbr., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *pinnata* (Ruiz & Pav.) Constance, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *amoena* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Aldea pinnata* Ruiz & Pav., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *pinnata* (Vahl) Brand

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, MAG.

Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Phacelia secunda J.F. Gmel. var. *secunda*

Sinónimos: *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *plantaginea* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *andina* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville fma. *genuina* Brand, nom. illeg., *Aldea circinata* Willd., *Phacelia parviflora* Phil., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *acutiloba* DC.,

Phacelia circinata (Willd.) Jacq. var. *paniculata* DC., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *obtusiloba* DC., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *plantaginea* (Brand) Constance, *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *parviflora* (Phil.) Constance, *Hydrophyllum magellanicum* Lam., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Phacelia setigera Phil.

Sinónimos: *Phacelia pinnatifida* Griseb. var. *setigera* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4000-4800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Phacelia sinuata Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plagiobothrys

Plagiobothrys armeriifolius (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium armeriifolius* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

Plagiobothrys calandrinoides (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium calandrinoides* Phil., *Eritrichium albiflorus* Griseb., *Eritrichium uliginosum* auct. non Phil., *Plagiobothrys lechleri* I.M. Johnst., *Allocarya alternifolia* Brand, *Allocarya humilis* Brand, *Plagiobothrys albiflorus* (Griseb.) R.L. Pérez-Mor. ex D.M. Moore, *Eritrichium nubigenum* Phil. ex F. Meigen

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAG.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Plagiobothrys collinus (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium collinum* Phil., *Cryptantha collina* (Phil.) Reiche, *Eritrichium inconspicuum* Phil., *Cryptantha inconspicua* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Plagiobothrys corymbosus (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Myosotis corymbosa* Ruiz & Pav., *Allocarya sessilifolia* Greene, *Allocarya sessiliflora* Reiche, *Allocarya corymbosa* (Ruiz & Pav.) Brand, *Eritrichium sessiliflorum* A.DC., *Cryptantha corymbosa* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *pulchella* (Phil.) Reiche, *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil., *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *pulchellum* Phil., *Plagiobothrys tenuifolius* (Schlecht. ex Phil.) I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plagiobothrys foliosus I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Plagiobothrys fulvus (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Myosotis fulva* Hook. & Arn., *Eritrichium laxiflorum* Phil., *Eritrichium fulvum* Hook. & Arn. var. *pinguis* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Plagiobothrys germainii (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium germainii* Phil., *Allocarya germainii* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Plagiobothrys gracilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Myosotis gracilis* Ruiz & Pav., *Echinosperrum gracile* (Ruiz & Pav.) Lehm., *Rochelia gracilis* (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, RME, MAU, BIO.

Plagiobothrys myosotoides (Lehm.) Brand

Sinónimos: *Plagiobothrys tinctorius* (Ruiz & Pav.) A. Gray, *Eritrichium tinctorium* A. DC., *Eritrichium pugae* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Plagiobothrys oppositifolius (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium oppositifolius* Phil., *Eritrichium*

limonium Phil., *Eritrichium cinereum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ARA.

Plagiobothrys pedicellaris (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Allocarya capitata* (Clos) Brand var. *longipes* (Phil. ex Reiche) Brand, *Allocarya tenuifolia* (Schlecht. ex Phil.) Greene var. *longipes* Phil. ex Reiche, *Eritrichium tenuifolium* Schlecht. ex Phil. var. *longipes* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA.

Plagiobothrys polycaulis (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium polycaulis* Phil., *Eritrichium delicatulum* Phil., *Eritrichium graminifolium* Phil., *Eritrichium bracteatum* Phil., *Eritrichium vernum* Phil., *Eritrichium flavicans* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Plagiobothrys pratensis (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium pratense* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-300 m.

Plagiobothrys procumbens (Colla) A. Gray

Sinónimos: *Allocarya procumbens* (Colla) Greene, *Myosotis procumbens* Colla, *Eritrichium illapelinum* Phil., *Eritrichium tenuicaule* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plagiobothrys pulchellus (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium pulchellum* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Plagiobothrys uliginosus (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium uliginosum* Phil., *Allocarya uliginosa* (Phil.) Greene, *Eritrichium pedicellare* Phil., *Allocarya pedicellaris* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Plagiobothrys verrucosus (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Eritrichium verrucosum* Phil., *Plagiobothrys patagonicus* I.M. Johnst., *Plagiobothrys myosotoides*

(Lehm.) Brand var. *patagonicus* (I.M. Johnst.) Brand
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, AIS.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Selkirkia

Selkirkia berteroi (Colla) Hemsl.
Sinónimos: *Cynoglossum berteroi* Colla
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Selkirkia limense (Willd.) Holstein & Weigend
Sinónimos: *Cynoglossum limense* Willd., *Cynoglossum decurrens* var. *limense* (Willd.) DC., *Cynoglossum decurrens* Ruiz & Pav., *Cynoglossum alatum* Molina
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI.

Selkirkia pauciflora (Ruiz & Pav.) Holstein & Weigend
Sinónimos: *Cynoglossum pauciflorum* Ruiz & Pav., *Cynoglossum paniculatum* Hook. & Arn., *Mapucheia paniculata* (Hook. & Arn.) M. Serrano, R. Carbajal & S. Ortiz, *Cynoglossum azocartii* Phil., *Cynoglossum paniculatum* var. *azocartii* (Phil.) Reiche, *Cynoglossum paniculatum* fma. *azocartii* (Phil.) Brand, *Cynoglossum paniculatum* fma. *philippianum* Brand
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 100-1100 m.
Nombre vulgar: No me olvides.

Tiquilia

Tiquilia atacamensis (Phil.) A.T. Richardson
Sinónimos: *Coldenia atacamensis* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Nombre vulgar: Káuchal.

Tiquilia grandiflora (Phil.) A.T. Richardson
Sinónimos: *Coldenia grandiflora* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1400 m.
Países limítrofes: Perú.

Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson
Sinónimos: *Coldenia littoralis* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Perú.

Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T. Richardson
Sinónimos: *Coldenia paronychioides* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-3300 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Tiquilia tacnensis A.T. Richardson
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1900-2000 m.
Países limítrofes: Perú.

BRASSICACEAE

Alshehbazia

Alshehbazia hauthalii (Gilg & Muschl.) Salariao & Zuloaga
Sinónimos: *Eudema hauthalii* Gilg & Muschl., *Onuris hauthalii* (Gilg & Muschl.) Al-Shehbaz, *Brayopsis hauthalii* (Gilg & Muschl.) Skotts., *Brayopsis skottsbergii* Gilg ex Skotts.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Alyssum

Alyssum alyssoides (L.) L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, MAG.

Arabidopsis

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS.

Atacama

Atacama nivea (Phil.) Toro, Mort & Al-Shehbaz
Sinónimos: *Sisymbrium niveum* Phil., *Mathewsia nivea* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.

Barbarea

Barbarea verna (Mill.) Asch.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Brassica

Brassica napus L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, JFE.

Brassica oleracea L.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: LLA, MAG, JFE, IPA.

Brassica rapa L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Brassica tournefortii Gouan

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

Camelina

Camelina microcarpa Andr. ex DC.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

Capsella

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.

Cardamine

Cardamine africana L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

Cardamine bonariensis Pers.

Sinónimos: *Cardamine alsophila* Phil. var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Cardamine nasturtioides* Bertero ex Barnéoud, *Cardamine andicola* Phil., *Cardamine nemophila* Phil., *Cardamine pusilla* Phil., *Cardamine ramosissima* Steud.,

Cardamine tridens Phil., *Cardamine bracteata* Phil., *Cardamine caespitosa* Phil., *Cardamine alsophila* Phil., *Cardamine alsophila* Phil. var. *bracteata* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *caespitosa* (Phil.) Reiche, *Cardamine alsophila* Phil. var. *tridens* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Berro picante.

Cardamine chenopodiifolia Pers.

Sinónimos: *Arabis commersonii* DC., *Arabis spathulata* (Poir.) DC., *Sisymbrium bellidifolium* Poir., *Sisymbrium spathulatum* Poir., *Heterocarpus fernandezianus* Phil., *Cardamine fernandeziana* (Phil.) Johow

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Cardamine chilensis DC.

Sinónimos: *Cardamine valdiviana* Phil., *Cardamine chilensis* DC. var. *angustifolia* O.E. Schulz, *Cardamine solisii* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil. var. *callitrichoides* (Speg.) O.E. Schulz, *Cardamine vulgaris* Phil. var. *micropetala* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Cardamine nana* Barnéoud, *Cardamine micropetala* Phil., *Cardamine ramosissima* Steud. var. *micropetala* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cardamine cordata Barnéoud

Sinónimos: *Cardamine cordata* Barnéoud var. *decumbens* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine calbucana* Phil., *Cardamine monticosa* Phil., *Cardamine decumbens* Barnéoud, *Cardamine peteroana* Phil., *Cardamine andina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 700-2900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cardamine geraniifolia (Poir.) DC.

Sinónimos: *Dentaria geraniifolia* (Poir.) Reiche, *Sisymbrium geraniifolium* Poir.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cardamine glacialis (G. Forst.) DC.

Sinónimos: *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pubescens* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Griseb., *Cardamine strictula* Steud., *Sisymbrium glaciale* G. Forst., *Cardamine ciliata* Phil., *Cardamine gongyloides* Phil., *Cardamine litoralis* Phil., *Cardamine magellanica* Phil., *Cardamine palenae* Phil., *Cardamine soehrensii* Phil., *Cardamine pratensis* L. var. *minor* Barnéoud, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pumila* A. Gray, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *elatior* A. Gray, *Cardamine hirsuta* L. var. *antiscorbutica* (Banks & Sol. ex Griseb.) Reiche, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. subsp. *litoralis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *magellanica* (Phil.) Reiche, *Cardamine hirsuta* L. var. *soehrensii* (Phil.) Reiche, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *soehrensii* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium grandiflorum* Molina

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, RME, MAU, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cardamine hirsuta L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

Cardamine kruesselii Johow ex Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Cardamine marginata Phil.

Sinónimos: *Cardamine vulgaris* Phil. var. *marginata* (Phil.) O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Cardamine rostrata Griseb.

Sinónimos: *Cardamine rostrata* Griseb. var. *reniformis* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine reniformis* Phil., *Cardamine lechleriana* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cardamine tenuirostris Hook. & Arn.

Sinónimos: *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *affinis* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz, *Cardamine tenuirostris*

Hook. & Arn. subsp. *reicheana* O.E. Schulz, *Cardamine flavescens* Phil., *Cardamine affinis* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cardamine tuberosa DC.

Sinónimos: *Cardamine tuberosa* DC. subsp. *cognata* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine granulata* Phil., *Cardamine cognata* Steud., *Cardamine tuberosa* DC. var. *granulata* (Phil.) Reiche, *Cardamine thyrsoides* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cardamine variabilis Phil.

Sinónimos: *Cardamine integrifolia* Phil. var. *diversifolia* O.E. Schulz, *Cardamine variabilis* Phil. var. *pinnatisecta* O.E. Schulz, *Cardamine thermarum* Martic., *Cardamine triphylla* Phil., *Sisymbrium simpsonii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cardamine volckmannii Phil.

Sinónimos: *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn., *Cardamine petiolulata* Phil. ex O.E. Schulz, *Cardamine stricta* Phil., *Cardamine hirsuta* L. var. *nivalis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hook. f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cardamine vulgaris Phil.

Sinónimos: *Cardamine garaventae* O.E. Schulz, *Cardamine grandjotii* O.E. Schulz, *Cardamine macrostachya* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *oligozyga* O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *vulgaris* (Phil.) Reiche, *Cardamine intermedia* Steud.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Chorispora

Chorispora tenella (Pall.) DC.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

Cremolobus

Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) DC.

Sinónimos: *Urbanodoxa tarapacana* Ricardi & Martic., *Biscutella chilensis* Lag. ex DC., *Cremolobus sinuatus* Hook., *Cremolobus pinnatifidus* Hook.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 0-4400 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Descurainia

Descurainia antarctica (E. Fourn.) O.E. Schulz

Sinónimos: *Descurainia argentea* O.E. Schulz, *Hesperis antarctica* (E. Fourn.) Kuntze

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex Reiche

Sinónimos: *Descurainia brachycarpa* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Sisymbrium brachycarpum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium depressum* Phil.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Descurainia erodiifolia (Phil.) Prantl ex Reiche

Sinónimos: *Sisymbrium erodiifolium* Phil.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 200-3200 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr.

Sinónimos: *Sisymbrium myriophyllum* Willd. ex DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1900-4600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Qasabe.

Descurainia nuttallii (Colla) O.E. Schulz

Sinónimos: *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.)

Prantl var. *elegantula* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia*

cumingiana (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *tenuissima* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium tenuissimum* Phil., *Sophia tenuissima* (Phil.) Macloskie, *Sisymbrium elegantulum* Phil., *Sisymbrium nuttalli* Colla, *Sisymbrium macrophyllum* Barnéoud, *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl var. *macrophylla* (Barnéoud) Prantl ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Descurainia pimpinellifolia (Barnéoud) O.E. Schulz

Sinónimos: *Descurainia glaucescens* (Phil.) Prantl ex Reiche, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche

fma. *umbellifera* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia pimpinellifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glaucescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium pimpinellifolium* Barnéoud,

Sisymbrium umbelliferum Phil., *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *pimpinellifolium* (Barnéoud) Reiche,

Sophia glaucescens (Phil.) Macloskie

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, MAG.

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche

Sinónimos: *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *minutiflora* (Prantl ex Reiche) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *rubescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia minutiflora* Prantl

ex Reiche var. *florida* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium rubescens* Phil., *Descurainia rubescens* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium strictum* Phil., *Sisymbrium floridum* Phil., *Hesperis florida* (Phil.) Kuntze, *Descurainia minutiflora* Prantl ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3200-4700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Kasawi.

Diploxaxis

Diploxaxis muralis (L.) DC.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Draba

Draba funiculosa Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Draba gilliesii Hook. & Arn.

Sinónimos: *Draba davilae* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *davilae* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *stolonifera* (Barnéoud) Reiche, *Draba rosulata* Phil., *Draba stolonifera* Barnéoud, *Draba araucana* Phil., *Draba colchaguensis* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. fma. *araucana* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 400-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Draba macleanii Hook.f.

Sinónimos: *Draba atacamensis* Gilg
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3900-4900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Draba magellanica Lam.

Sinónimos: *Draba magellanica* Lam. var. *saffordii* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba saffordii* Phil., *Draba incana* L. var. *magellanica* (Lam.) Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Draba pusilla F. Phil.

Sinónimos: *Draba schoenleinii* F. Meigen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, MAG.
Rango altitudinal: 500-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Draba thlaspiiformis (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Draba philippii* O.E. Schulz, *Eudema thlaspiiforme* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Draba verna L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, AIS, MAG.

Eruca

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL.

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. *vesicaria*

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL.

Hesperis

Hesperis matronalis L.

Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: MAG.

Hirschfeldia

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA.

Hollermayera

Hollermayera valdiviana (Phil.) Ravenna

Sinónimos: *Hollermayera sylvatica* O.E. Schulz, *Armoracia valdiviana* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LLA.
Rango altitudinal: 600-700 m.

Hornungia

Hornungia procumbens (L.) Hayek

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, MAG.

Isatis

Isatis tinctoria L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Ivania

Ivania cremnophila (I.M. Johnst.) O.E. Schulz

Sinónimos: *Cardamine cremnophila* I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2700-3300 m.
Nombre vulgar: Hierba del gato.

Ivania juncalensis Al-Shehbaz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 2400-2600 m.

Lepidium

Lepidium angustissimum Phil.
Sinónimos: *Lepidium tayloriae* Al-Shehbaz
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1900-2400 m.

Lepidium auriculatum Regel & Körn.
Sinónimos: *Lepidium araucanum* Phil., *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *araucanum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Lepidium bipinnatifidum Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Mosquetón, picantilla.

Lepidium bonariense L.
Sinónimos: *Thlaspi multifidum* Poir., *Lepidium mendocinum* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, JFE, IPA.
Rango altitudinal: 0-3300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Hierba del tapón.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández y en la Isla de Pascua.

Lepidium campestre (L.) W.T. Aiton
Hierba. Anual. Introducida.
Nota: Al-Shehbaz (2010) señala su presencia en Chile, sin mencionar región.

Lepidium chichicara Desv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Perú.

Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA.

Lepidium cumingianum Fisch. & C.A. Mey.
Sinónimos: *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *berteroanum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *orbiculatum* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *canescens* Thell., *Lepidium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey. var. *subsagittatum* Thell.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, VAL, RME, LBO, BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Lepidium didymum L.
Sinónimos: *Coronopus didymus* (L.) Sm., *Senebiera didyma* (L.) Pers.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, IPA.
Rango altitudinal: 0-2900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

Lepidium draba L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

Lepidium heterophyllum Benth.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA.

Lepidium horstii Johow ex Skottsbo.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 300 m.

Lepidium johnstonii C.L. Hitchc.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 700-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lepidium latifolium L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, MAU.

Lepidium myrianthum Phil.
Sinónimos: *Lepidium ruderales* L. var. *myrianthum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lepidium nitidum Nutt. ex Torr. & A. Gray
Sinónimos: *Lepidium curicoanum* Phil., *Lepidium chilense* Kunze, *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *curicoanum* (Phil.) Reiche, *Lepidium tenuifolium* Phil., *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *tenuifolium* (Phil.) Reiche, *Lepidium tenuissimum* Steud.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nota: Según Al-Shehbaz (2010), esta especie se distribuye en Chile y disyunto en California, Norte América.

Lepidium philippianum (Kuntze) Thell.
Sinónimos: *Nasturtium philippianum* Kuntze, *Lepidium philippianum* (Kuntze) Thell. var. *brachystylum* Thell., *Onuris reichei* Gilg & Muschl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2400-3000 m.

Lepidium pseudodidymum Thell. ex Druce
Sinónimos: *Coronopus pinnatifidus* (DC.) Gaertn. var. *australis* (Hook.f.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lepidium rahmeri Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, VAL.
Rango altitudinal: 2600-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Kolka.

Lepidium raimondii O.E. Schulz
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 3000-4500 m.
Países limítrofes: Perú.

Lepidium reichei Phil. ex Reiche
Sinónimos: *Lepidium morrisonii* C.L. Hitchc., *Nasturtium brevicaule* (Barnéoud) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lepidium sativum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, ARA.

Lepidium spathulatum Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1600 m.

Lepidium spicatum Desv.
Sinónimos: *Lepidium spicatum* Desv. var. *calyx-persistente* Boelcke, *Lepidium spicatum* Desv. var. *racemosum* (Griseb.) Boelcke, *Lepidium racemosum* Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lepidium strictum (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.
Sinónimos: *Lepidium oxycarpum* Torr. & A. Gray var. *strictum* S. Watson
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-3800 m.

Lepidium virginicum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, IDE.

Lobularia

Lobularia maritima (L.)
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.

Mancoa

Mancoa hispida Wedd.
Sinónimos: *Mancoa minima* Rollins, *Radicula scabra* Rusby
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3400-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Mathewsia

Mathewsia auriculata Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-2700 m.

Mathewsia foliosa Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Mathewsia incana Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Mathewsia linearifolia Turcz.
Sinónimos: *Mathewsia collina* I.M. Johnst., *Mathewsia laciniata* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Matthiola

Matthiola incana (L.) R.Br.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, JFE.

Menonvillea

Menonvillea chilensis (Turcz.) B.D. Jacks.
Sinónimos: *Menonvillea chilensis* (Turcz.) B.D. Jacks. var. *aptera* (Phil.) Rollins, *Menonvillea parviflora* Phil., *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *parviflora* (Phil.) Reiche, *Menonvillea parvula* Phil., *Cymatoptera chilensis* Turcz., *Menonvillea aptera* Phil., *Menonvillea media* Turcz., *Menonvillea parviflora* Phil. var. *aptera* (Phil.) I.M. Johnst., *Menonvillea pinnatifida* Barnéoud var. *parvula* (Phil.) Gilg & Muschl., *Menonvillea orbiculata* Phil. fma. *glabra* Gilg & Muschl.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Menonvillea cicatricosa (Phil.) Rollins
Sinónimos: *Hexaptera cicatricosa* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1800-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Menonvillea comberi Sandwith
Sinónimos: *Menonvillea scapigera* (Phil.) Rollins subsp. *hirsuta* (Rollins) Prina, *Menonvillea hirsuta* Rollins
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1000-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Menonvillea constitutionis (F. Phil.) Rollins
Sinónimos: *Hexaptera constitutionis* F. Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Menonvillea cuneata (Gillies & Hook.) Rollins
Sinónimos: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *violacea* (Phil.) Reiche, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud, *Hexaptera violacea* Phil., *Hexaptera jussiaei* Barnéoud var. *tridens* (Phil.) Reiche, *Hexaptera tridens* Phil., *Decaptera trifida* Turcz.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1700-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Menonvillea filifolia Fisch. & C.A. Mey.
Sinónimos: *Menonvillea linearis* DC. var. *filifolia* (Fisch. & C.A. Mey.) Rollins, *Menonvillea angustifolia* C. Presl
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1200 m.

Menonvillea flexuosa Phil.
Sinónimos: *Menonvillea crassa* Rollins, *Menonvillea falcata* Reiche, *Menonvillea flexuosa* Phil. fma. *tomentosa* Gilg & Muschl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-3700 m.

Menonvillea frigida (Phil.) Rollins
Sinónimos: *Hexaptera frigida* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3900-4700 m.

Menonvillea linearis DC.
Sinónimos: *Menonvillea robustula* Steud., *Menonvillea trifida* Phil., *Menonvillea linearis* DC. var. *trifida* (Phil.) Reiche, *Menonvillea virgata* Phil., *Menonvillea linearis* DC. var. *virgata* (Phil.) Reiche, *Dispeltophorus crassifolius* Lehm.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Menonvillea litoralis (Barnéoud) Rollins
Sinónimos: *Menonvillea gayi* Phil., *Hexaptera litoralis* Barnéoud, *Menonvillea arachnoidea* O.E. Schulz
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 200-1100 m.

Menonvillea macrocarpa (I.M. Johnst.) Rollins
Sinónimos: *Hexaptera macrocarpa* I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.

Menonvillea marticorenae (Al-Shehbaz) Salariato & Al-Shehbaz

Sinónimos: *Menonvillea filifolia* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *marticorenae* Al-Shehbaz

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Menonvillea minima Rollins

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Menonvillea nordenskjoeldii (Dusén) Rollins

Sinónimos: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *nordenskjoeldii* (Dusén) Gilg & Muschl., *Hexaptera nordenskjoeldii* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Menonvillea orbiculata Phil.

Sinónimos: *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *perplexa* Rollins, *Menonvillea alata* Rollins

Hierba. Bienal. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Menonvillea pinnatifida Barnéoud

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 800-3000 m.

Menonvillea purpurea (Hastings) Rollins

Sinónimos: *Hexaptera purpurea* Hastings, *Hexaptera linearis* Barnéoud

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Menonvillea rollinsii Al-Shehbaz & Martic.

Sinónimos: *Aimara rollinsii* (Al-Shehbaz & Martic.) Salariato & Al-Shehbaz

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2600-3400 m.

Menonvillea scapigera (Phil.) Rollins subsp. *longipes* (Rollins) Prina

Sinónimos: *Menonvillea hookeri* Rollins, *Menonvillea perstylosa* Rollins, *Menonvillea longipes* Rollins, *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 1100-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Menonvillea spathulata (Gillies & Hook.) Rollins

Sinónimos: *Hexaptera pusilla* Phil., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. subsp. *pusilla* (Phil.) Gilg & Muschl., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Hexaptera cuneata* (Gillies & Hook.) Rollins var. *edentata* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 2200-4100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Menonvillea virens (Phil.) Rollins

Sinónimos: *Hexaptera virens* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mostacillastrum

Mostacillastrum andinum (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium corymbosum* Phil., *Sisymbrium corymbosum* Phil. var. *consanguineum* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Hesperis andina* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. fma. *dolichocarpum* Hauman, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *latifolium* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil. var. *morenoanum* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *latifolium* (Phil.) Speg., *Sisymbrium andinum* Phil., *Sisymbrium amplexicaule* Phil. var. *corymbosum* (Phil.) Reiche, *Hesperis corymbosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium consanguineum* Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 1800-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mostacillastrum commune (Speg.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium sagittatum* var. *commune* Speg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mostacillastrum dianthoides (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium dianthoides* Phil., *Sisymbrium arequipanum* Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3200-4400 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Mostacillastrum ferreyrae (Förther & Weigend) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium ferreyrae* Förther & Weigend
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 300-1000 m.
Países limítrofes: Perú.

Mostacillastrum gracile (Wedd.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Heterothrix gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Pennellia gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Sisymbrium gracile* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 1800-3900 m.
Países limítrofes: Perú.

Mostacillastrum leptocarpum (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hastatum* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *juncalense* O.E. Schulz, *Hesperis leptocarpa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium hastatum* Phil., *Sisymbrium leptocarpum* Hook. & Arn., *Sisymbrium gayanum* Barnéoud, *Nasturtium hastatum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1800-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Mostacillastrum pectinifolium (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium pectinifolium* Al-Shehbaz
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2300-3800 m.
Países limítrofes: Perú.

Mostacillastrum sagittatum (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *ciliatum* (Phil.) Speng., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn., *Hesperis sagittata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sophia sagittata* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Sisymbrium ciliatum* Phil., *Sisymbrium fruticosum* Reiche, *Sisymbrium volckmannii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 100-3700 m.

Nasturtium

Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, LBO.

Nasturtium officinale R. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Neuontobotrys

Neuontobotrys berningeri O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 0-3200 m.

Neuontobotrys elloanensis Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3500 m.

Neuontobotrys grayana (Baehni & J.F. Macbr.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium grayanum* Baehni & J.F. Macbr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2600-3300 m.
Países limítrofes: Perú.

Neuontobotrys intricatissima (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Draba intricatissima* Phil., *Sisymbrium intricatissimum* (Phil.) Reiche, *Hesperis intricatissima* (Phil.) Kuntze, *Eremodraba intricatissima* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 1400-2900 m.
Países limítrofes: Perú.

Neuontobotrys lanata (Walp.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz, *Sisymbrium foliosum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz var. *glabrescens* O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Sisymbrium donnarosae* Martic., *Hesperis foliosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Phil. ex Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 2400-4100 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Chuchar.

Neuontobotrys linearifolia (Kuntze) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Neuontobotrys linifolia* O.E. Schulz, *Hesperis linearifolia* Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 100-3800 m.

Neuontobotrys mendocina (Romanczuk) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium mendocinum* Romanczuk

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Neuontobotrys polyphylla (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium polyphyllum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Neuontobotrys tarapacana (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium philippianum* I.M. Johnst.,

Sisymbrium tarapacanicum Phil., *Cardamine deserticola*

Phil., *Neuontobotrys deserticola* (Phil.) Al-Shehbaz, *Arabis tarapacana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1700-4600 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: kamatokamata.

Noccaea

Noccaea magellanica (Comm. ex Poir.) Holub

Sinónimos: *Thlaspi alpestre* L. var. *gracile* (Phil.) Gilg

& Muschl., *Thlaspi andicola* Hook. & Arn., *Thlaspi*

glaucophyllum Barnéoud, *Thlaspi gracile* Phil., *Thlaspi*

magellanicum Comm. ex Poir. var. *andicola* (Hook. & Arn.)

O.E. Schulz, *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir., *Draba*

depilis Phil., *Thlaspi exile* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Onuris

Onuris alismatifolia Gilg ex Skottsbl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Onuris graminifolia Phil.

Sinónimos: *Onuris oligosperma* (Speg.) Gilg & Muschl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 1100-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Onuris hatcheriana (Gilg ex Macloskie) Gilg & Muschl.

Sinónimos: *Draba hatcheriana* Gilg ex Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 900-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Onuris papillosa O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Onuris spgazziniana Gilg & Muschl.

Sinónimos: *Draba graminifolia* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pennellia

Pennellia lechleri (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sinónimos: *Stenodraba lechleri* (E. Fourn.) Ravenna,

Pennellia petraea (Kuntze) O.E. Schulz, *Sisymbrium*

petraeum Phil., nom. illeg., *Stenodraba glareosa* Ravenna,

Heterothrix petraea (Kuntze) O.E. Schulz, *Sisymbrium*

caespitosum Phil., *Sisymbrium fastigiatum* Phil., *Stenodraba*

fastigiata (Phil.) Ravenna, *Sisymbrium lechleri* E. Fourn.,

Weberbaueria lechleri (E. Fourn.) Al-Shehbaz, *Hesperis*

lechleri (E. Fourn.) Kuntze, *Hesperis petraea* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, NUB, ARA.

Rango altitudinal: 300-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Pennellia parvifolia (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sinónimos: *Sisymbrium parvifolium* Phil., *Sisymbrium*

vestitum (Ravenna) Al-Shehbaz, *Stenodraba parvifolia*

(Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba vestita* Ravenna,

Weberbaueria parvifolia (Phil.) Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Petroravenia

Petroravenia friesii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Eudema friesii* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2800-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Petroravenia werdermannii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Eudema werdermannii* O.E. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3800-4700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polypsecadium

Polypsecadium litorale (Phil.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Sisymbrium litorale* Phil., *Sisymbrium litorale*

Phil. var. *virgatum* O.E. Schulz, *Hesperis litoralis* (Phil.)

Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Polypsecadium magellanicum (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz

Sinónimos: *Brassica antarctica* Molina, *Brassica*

magellanica Juss. ex Pers., *Sisymbrium magellanicum*

(Juss. ex Pers.) Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polypsecadium zoellneri Al-Shehbaz

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Raphanus

Raphanus raphanistrum L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LLA.

Raphanus sativus L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Rapistrum

Rapistrum rugosum (L.) All.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI, IPA.

Rorippa

Rorippa austroamericana Mart.-Laborde

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LLA.

Rango altitudinal: 2000-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie

Sinónimos: *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC., *Sisymbrium*

bonariense Poir., *Cardamine indica* (L.) Kuntze var.

bonariensis (Poir.) Kuntze, *Nasturtium indicum* (L.) DC.

subsp. *bonariense* (Poir.) Kuntze & Muschl., *Nasturtium*

tweediei O.E. Schulz, *Nasturtium macrorrhizum* Steud.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rorippa coxii (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas

Sinónimos: *Nasturtium coxi* F. Phil. ex Phil., *Sisymbrium*

lacinosum Phil., *Nasturtium patens* Phil., *Turritis chilensis*

Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, ARA.

Rango altitudinal: 100-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rorippa mandonii (E. Fourn.) Mart.-Laborde

Sinónimos: *Sisymbrium mandonii* E. Fourn., *Diploaxis*

vernalis Phil., *Hesperis mandonii* (E. Fourn.) Kuntze,

Nasturtium eggersii O.E. Schulz

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Rorippa palustris (L.) Besser

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rorippa philippiana Macloskie

Sinónimos: *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC. var.

micranthum (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Rorippa sarmentosa (Sol. ex G. Forst.) J.F. Macbr.

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: IPA.

Rorippa sylvestris (L.) Besser

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Sarcodraba

Sarcodraba dusenii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Grammosperma dusenii* O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Schizopetalon

Schizopetalon arcuatum Al-Shehbaz
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200-400 m.

Schizopetalon bipinnatifidum Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-2400 m.

Schizopetalon biseriatum Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Schizopetalon brachycarpum Al-Shehbaz
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2100-2300 m.

Schizopetalon corymbosum Al-Shehbaz
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.

Schizopetalon dentatum (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Sinónimos: *Diploxis chilensis* Barnéoud, *Perreymondia dentata* Barnéoud, *Perreymondia multifida* Barnéoud, *Perreymondia viridis* Phil., *Schizopetalon viride* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 600-2300 m.

Schizopetalon maritimum Barnéoud
Sinónimos: *Schizopetalon gayanum* Barnéoud
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Schizopetalon rupestre (Barnéoud) Reiche
Sinónimos: *Perreymondia rupestris* Barnéoud, *Perreymondia brongniartii* Barnéoud, *Schizopetalon brongniartii* (Barnéoud) Reiche, *Schizopetalon walkeri* Sims

var. *brongniartii* (Barnéoud) Gilg & Muschl., *Schizopetalon san-romanii* Phil., *Schizopetalon dentatum* (Barnéoud) Gilg & Muschl. var. *san-romanii* (Phil.) Gilg & Muschl.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1900-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Schizopetalon tenuifolium Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Schizopetalon walkeri Sims
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Sibara

Sibara anethifolia (Phil.) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Werdermannia anethifolia* (Phil.) I.M. Johnst., *Nasturtium anethifolium* Phil., *Heterothrix anethifolia* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium carnosulum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Sibara dilloniorum Al-Shehbaz
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Sibara macrostachya (Phil.) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Sisymbrium macrostachyum* Phil., *Werdermannia macrostachya* (Phil.) O.E. Schulz, *Nasturtium macrostachyum* Phil., *Sisymbrium pectinatum* Reiche, *Sisymbrium larranagae* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Sibara pinnata (Barnéoud) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Werdermannia pinnata* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud, *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud var. *pubescens* Barnéoud, *Nasturtium deserticola* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2800 m.

Sinapis

Sinapis arvensis L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ.

Sisymbrium

Sisymbrium altissimum L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO.

Sisymbrium austriacum Jacq.
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA, LLA.

Sisymbrium irio L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Sisymbrium orientale L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

Teesdalia

Teesdalia nudicaulis (L.) W.T. Aiton
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Thlaspi

Thlaspi arvense L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, MAG.

Tomostima

Tomostima australis (R. Br.) Al-Shehbaz, M. Koch & Jordon-Thaden
Sinónimos: *Draba australis* R. Br.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, MAG.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tropidocarpum

Tropidocarpum lanatum (Barnéoud) Al-Shehbaz & R.A. Price
Sinónimos: *Agallis montana* Phil., *Agallis lanata* (Barnéoud) Gilg & Muschl. ex O.E. Schulz, *Lepidium lanatum* Barnéoud
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 200-900 m.

Weberbaueria

Weberbaueria chillanensis (Phil.) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Draba chillanensis* Phil., *Stenodraba chillanensis* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000-2900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Weberbaueria colchaguensis (Barnéoud) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Cardamine colchaguensis* Barnéoud, *Draba andina* Phil., *Draba patagonica* Phil., *Sisymbrium colchaguensis* (Barnéoud) Wedd. ex E. Fourn., *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *hirticaulis* O.E. Schulz, *Stenodraba colchaguensis* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Stenodraba patagonica* (Phil.) Ravenna, *Arabis drabaeformis* Schltld., *Arabis colchaguensis* (Barnéoud) Turcz., *Hesperis colchaguensis* (Barnéoud) Kuntze, *Braya pusilla* A. Gray, *Hesperis pusilla* (A. Gray) Kuntze, *Weberbaueria pusilla* (A. Gray) O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Weberbaueria imbricatifolia (Barnéoud) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Draba imbricatifolia* Barnéoud, *Sisymbrium imbricatifolium* (Barnéoud) Wedd., *Hesperis imbricatifolia* (Barnéoud) Kuntze, *Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glabrata* O.E. Schulz, *Braya imbricatifolia* (Barnéoud) A. Gray
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2800-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Weberbaueria lagunae (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *lagunae* O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 3800-4000 m.

Weberbaueria stenophylla (Leyb.) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Draba stenophylla* Leyb., *Draba cauquensis* Phil., *Draba leyboldii* Phil., *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz, *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz var. *leyboldii* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Weberbaueria suffruticosa (Barnéoud) Al-Shehbaz
Sinónimos: *Draba suffruticosa* Barnéoud, *Sisymbrium suffruticosum* (Barnéoud) E. Fourn., *Hesperis suffruticosa* (Barnéoud) Kuntze, *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Draba imbricatifolia* Barnéoud var. *suffruticosa* (Barnéoud) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 3300-4100 m.

Xerodraba

Xerodraba lycopodioides (Speg.) Skottsbo.
Sinónimos: *Xerodraba pectinata* (Speg.) Skottsbo., *Eudema lycopodioides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Eudema pectinata* (Speg.) Gilg & Muschl.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Xerodraba patagonica (Speg.) Skottsbo.
Sinónimos: *Braya patagonica* Speg., *Eudema patagonica* (Speg.) Gilg & Muschl., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze var. *microphylla* Gilg, nom. nud.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

CACTACEAE

Austrocactus

Austrocactus patagonicus (F.A.C. Weber) Backeb.
Sinónimos: *Cereus patagonicus* F.A.C. Weber, *Echinocactus intertextus* Phil.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ARA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Austrocactus philippii (Regel & E. Schmidt) Buxb.
Sinónimos: *Austrocactus hibernus* F. Ritter, *Erdisia philippii* (Regel & E. Schmidt) Britton & Rose, *Cereus philippi* Regel & Schmidt, *Echinocactus philippii* (Regel & E. Schmidt) K. Schum., *Echinopsis philippii* (Regel & E. Schmidt) G. Nicholson
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Austrocactus spiniflorus (Phil.) F. Ritter
Sinónimos: *Erdisia spiniflora* (Phil.) Britton & Rose, *Opuntia spiniflora* Phil., *Corryocactus spiniflorus* (Phil.) Hutchison, *Opuntia bicolor* Phil., *Opuntia clavata* Phil., *Cereus hypogaeus* F.A.C. Weber ex Regel, *Echinocereus hypogaeus* Rümpler, *Eulychnia clavata* Phil., *Echinocereus clavata* K. Schum.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Browningia

Browningia candelaris (Meyen) Britton & Rose
Sinónimos: *Cereus candelaris* Meyen, *Cactus candelaris* (Meyen) Meyen
Árbol suculento. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Candelabro, cardón, sabaya.

Copiapoa

Copiapoa ahremephiana N.P. Taylor & G.J. Charles
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Copiapoa boliviana (Pfeiff.) F. Ritter
Sinónimos: *Copiapoa atacamensis* Middled., *Echinocactus bolivianus* Pfeiff., *Copiapoa calderana* F. Ritter subsp. *atacamensis* (Middled.) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Copiapoa calderana F. Ritter
Sinónimos: *Copiapoa atacamensis* Middled. var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa calderana* F. Ritter var. *spiniosior* F. Ritter, *Copiapoa lembckeii* Backeb., nom. illeg.
Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoa cinerascens (Salm-Dyck) Britton & Rose
Sinónimos: *Copiapoa applanata* Backeb., nom. illeg., *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *intermedia* F. Ritter, *Echinocactus cinerascens* Salm-Dyck, *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *appplanata* F. Ritter, *Echinocactus ambiguus* Hildm. ex K. Schum.

Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. ***cinerea***
Sinónimos: *Copiapoa tenebrosa* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *tenebrosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactus cinereus* Phil.

Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. ***columna-alba*** (F. Ritter) Backeb.

Sinónimos: *Copiapoa columna-alba* F. Ritter var. *nuda* F. Ritter, *Copiapoa columna-alba* F. Ritter, *Copiapoa melanohystrix* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. ***gigantea*** (Backeb.) N.P. Taylor

Sinónimos: *Copiapoa gigantea* Backeb. var. *haseltoniana* (Backeb.) F. Ritter, *Copiapoa gigantea* Backeb., *Copiapoa haseltoniana* Backeb., *Copiapoa albispina* Backeb., nom. nud., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P. Taylor

Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 700-1000 m.

Copiapoa coquimbana (Rümppler) Britton & Rose var. ***coquimbana***

Sinónimos: *Copiapoa alticostata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *alticostata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *armata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *pendulina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *pseudocoquimbana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler) Britton & Rose var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümppler)

Britton & Rose var. *wagenknechtii* F. Ritter, *Copiapoa pendulina* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *chaniarensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *vulgata* F. Ritter, *Copiapoa vallenarensis* F. Ritter, *Copiapoa serenana* Voldan, *Echinocactus coquimbanus* Rümppler, *Copiapoa wagenknechtii* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Copiapoa coquimbana (Rümppler) Britton & Rose var. ***fiedleriana*** (K. Schum.) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Copiapoa fiedleriana* (K. Schum.) Backeb., *Copiapoa pepiniana* (K. Schum.) Backeb. var. *fiedleriana* Backeb., *Echinocactus fiedlerianum* K. Schum.

Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoa dealbata F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter, *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter var. *gigantea* F. Ritter, *Copiapoa dealbata* F. Ritter var. *carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa dealbata* F. Ritter fma. *gigantea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *dealbata* (F. Ritter) Backeb.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoa decorticans N.P. Taylor & G.J. Charles

Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoa echinata F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa echinata* F. Ritter fma. *pulla* F. Ritter, *Copiapoa echinata* F. Ritter var. *borealis* F. Ritter, *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *echinata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa totoralensis* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoa echinoides (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Sinónimos: *Copiapoa cuprea* F. Ritter, *Copiapoa dura* F. Ritter, *Copiapoa echinoides* (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *cuprea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactus echinoides* Lem. ex Salm-Dyck
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.

Copiapoa eremophila F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *eremophila* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose fma. *albispina* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

Copiapoa grandiflora F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *grandiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. *esmeraldana* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Copiapoa esmeraldana* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. *humilis*

Sinónimos: *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *paposoensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. illeg., *Copiapoa paposoensis* F. Ritter, nom. illeg., *Echinocactus humilis* Phil.

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. *longispina* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Copiapoa longispina* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. *taltalensis* (Werderm.) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Copiapoa chaniaralensis* F. Ritter, *Copiapoa taltalensis* (Werderm.) Looser, *Echinocactus taltalensis* Werderm.

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. *tenuissima* (F. Ritter) G. Charles

Sinónimos: *Copiapoa tenuissima* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 600-800 m.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. *tocopillana* (F. Ritter) G. Charles

Sinónimos: *Copiapoa tocopillana* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. *varispinata* (F. Ritter) G. Charles

Sinónimos: *Copiapoa varispinata* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. *hypogaea*

Sinónimos: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *barquitensis* F. Ritter, *Copiapoa mollicula* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 400-500 m.

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. *montana* (F. Ritter) G. Charles

Sinónimos: *Copiapoa olivana* F. Ritter, *Copiapoa montana* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Copiapoa krainziana F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa krainziana* F. Ritter var. *scopulina* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *krainziana* (F. Ritter) Slaba

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 300-900 m.

Copiapoa laui L. Diers

Sinónimos: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *laui* (L. Diers) A. Hoffm.

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 100-700 m.

Copiapoa longistaminea F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *longistaminea* (F. Ritter) Slaba

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Copiapoa marginata (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *bridgesii* (Pfeiff.) A.E. Hoffm.

Sinónimos: *Echinocactus bridgesii* Pfeiff., *Copiapoa bridgesii* (Pfeiff.) Backeb.

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-700 m.

Copiapoa marginata (Salm-Dyck) Britton & Rose var. ***marginata***

Sinónimos: *Echinocactus marginatus* Salm-Dyck, *Echinocactus columnaris* Pfeiff., *Echinocactus streptocaulon* Hook., *Copiapoa streptocaulon* (Hook.) Oosten

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Copiapoa megarhiza Britton & Rose

Sinónimos: *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *microrhiza* F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 200-800 m.

Copiapoa rarissima F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Copiapoa rupestris F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *hornilloensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter var.

rupestris (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter, *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rubriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa hornilloensis* F. Ritter,

Copiapoa rubriflora F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Copiapoa serpentisulcata F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa serpentisulcata* F. Ritter var. *castanea* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Copiapoa solaris (F. Ritter) F. Ritter

Sinónimos: *Copiapoa conglomerata* (Phil.) Lembcke, *Copiapoa ferox* Lembcke & Backeb., nom. illeg., *Echinocactus conglomeratus* Phil., *Pilocopiapoa solaris* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Corryocactus

Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose

Sinónimos: *Corryocactus krausii* Backeb., *Cereus brevistylus* K. Schum.

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Guacalla.

Cumulopuntia

Cumulopuntia dactylifera (Vaupel) E.F. Anderson

Sinónimos: *Cumulopuntia pentlandii* (Salm-Dyck) F. Ritter var. *dactylifera* (Vaupel) F. Ritter, *Opuntia dactylifera* Vaupel

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: ANT.

Países limítrofes: Perú.

Cumulopuntia echinacea (Ritter) Ritter

Sinónimos: *Tephrocactus echinaceus* F. Ritter, *Opuntia echinacea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *echinacea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Maihueniopsis boliviana* (Salm-Dyck) R. Kiesling

subsp. *echinacea* (Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2600-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Cumulopuntia ignescens (Vaup.) Ritter

Sinónimos: *Tephrocactus ignescens* (Vaupel) Backeb., *Opuntia ignescens* Vaupel, *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *ignescens* (Vaupel) D.R. Hunt, *Maihueniopsis boliviana* (Salm-Dyck) R. Kiesling

subsp. *ignescens* (Vaup.) Faúndez & R. Kiesling

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Piskayu.

Cumulopuntia sphaerica (C.F. Först.) E.F. Anderson

Sinónimos: *Opuntia leucophaea* Phil., *Cumulopuntia tubercularis* F. Ritter, *Opuntia sphaerica* C.F. Först., *Echinocactus berteri* auct. non (Colla) Gay

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Jalajala, puskaye.

Cylindropuntia

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth

Arbusto suculento. Introducido.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Echinopsis

Echinopsis atacamensis (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley
Sinónimos: *Cereus atacamensis* Phil., *Trichocereus atacamensis* (Phil.) Backeb., *Helianthocereus atacamensis* (Phil.) Backeb.

Árbol suculento. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Pasakana.

Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley
subsp. **chiloensis**

Sinónimos: *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *borealis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *conjungens* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *eburneus* F. Ritter, nom. illeg., *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *panhoplites* (K. Schum.) F. Ritter, nom. illeg., *Cactus chiloensis* Colla, *Cereus chiloensis* (Colla) DC., *Cereus quisco* J. Remy ex Gay

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley
subsp. **litoralis** (Johow) Lowry

Sinónimos: *Echinopsis litoralis* (Johow) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose subsp. *litoralis* (Johow) Lowry, *Cereus litoralis* Johow, *Trichocereus litoralis* (Johow) Looser, *Echinopsis bolligeriana* Mächler & H.E. Walter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Echinopsis coquimbana (Molina) Friedrich & G.D. Rowley
Sinónimos: *Trichocereus coquimbana* (Molina) Britton & Rose, *Cactus coquimbanus* Molina, *Cereus coquimbanus* (Molina) K. Schum.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Echinopsis deserticola (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley var. *fulvilana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinopsis spinibarbis* (Pfeiff.) A.E. Hoffm., *Trichocereus deserticola* (Werderm.) Looser, *Trichocereus fulvilanus* F. Ritter, *Eulychnia spinibarbis* (Pfeiff.) Britton & Rose,

Cereus deserticola Werderm., *Trichocereus spinibarbis* (Pfeiff.) F. Ritter, *Cereus spinibarbis* Pfeiff.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 400-800 m.

Echinopsis ferox (Britton & Rose) Backeb.

Sinónimos: *Lobivia ferox* Britton & Rose, *Pseudolobivia ferox* (Britton & Rose) Backeb.

Subarbusto suculento. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Echinopsis formosa (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck

Sinónimos: *Echinocactus formosa* Pfeiff., *Acanthocalycium formosum* (Pfeiff.) Backeb., *Soehrencia formosa* (Pfeiff.) Backeb., *Trichocereus formosus* (Pfeiff.) F. Ritter, *Lobivia longispina* Britton & Rose

Arbusto suculento. Nativo.

Distribución: ANT.

Países limítrofes: Argentina.

Echinopsis glauca (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley

fma. **pendens** (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Trichocereus glaucus* F. Ritter fma. *pendens* F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 400-600 m.

Echinopsis nigripilis (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Cereus nigripilis* Phil., *Trichocereus nigripilis* (Phil.) Baker, *Trichocereus coquimbanus* (Molina) Britton & Rose var. *nigripilis* (Phil.) Borg

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Echinopsis skottsbergii (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley

Sinónimos: *Trichocereus skottsbergii* Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce

Eriosyce aspillagae (Söhrens) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus aspillagae* (Söhrens) F. Ritter, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *aspillagae* (Söhrens) A.E. Hoffm., *Neoporteria aspillagae* (Söhrens) Backeb., *Echinocactus aspillagae* Söhrens, *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt. subsp. *maechleri* H.E. Walter

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb. var. ***aurata***

Sinónimos: *Eriosyce algarrobensis* F. Ritter, *Eriosyce ceratistes* Britton & Rose, *Eriosyce ihotzkyana* F. Ritter var. *ausseliana* (F. Ritter) F. Ritter, *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *algarrobensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *mollensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *vallenarensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Echinocactus auratus* Pfeiff., *Echinocactus ceratistes* Otto ex Pfeiff., *Echinocactus sandillon* Gay
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb. var. ***spinibarbis*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Eriosyce spinibarbis* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Eriosyce caligophila R. Pinto

Sinónimos: *Islaya caligophila* (R. Pinto) Faúndez & R. Kiesling
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 600-700 m.

Eriosyce chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. ***albidiflorus*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. *albidiflorus* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Eriosyce chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. ***chilensis***

Sinónimos: *Pyrrhocactus chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter, *Pyrrhocactus krausii* F. Ritter, *Neoporteria chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose, *Echinocactus chilensis* Hildm. ex K. Schum., *Neochilenia chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Backeb.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Eriosyce confinis (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus confinis* F. Ritter, *Neoporteria confinis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria*

kunzei (C.F. Först.) Backeb. var. *confinis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia confinis* (F. Ritter) Backeb.

Subarbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce crispa (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus crispus* F. Ritter, *Neoporteria crispa* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *crispa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Horridocactus crispus* (F. Ritter) Backeb.

Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. subsp. ***curvispina*** var. ***curvispina***

Sinónimos: *Pyrrhocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb., *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *descendens* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *mollensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus coliguayensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus grandiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *orientalis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus limariensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter, *Pyrrhocactus pamaensis* F. Ritter, *Neoporteria choapensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *coliguayensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *limariensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria litoralis* F. Ritter, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *choapensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce limariensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *gracilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *lissocarpa* (F. Ritter) Katt., *Cactus curvispinus* Bertero ex Colla, *Horridocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) Backeb., *Pyrrhocactus choapensis* F. Ritter, *Horridocactus choapensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus aconcaguensis* F. Ritter, *Horridocactus aconcaguensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *aconcaguensis* (F. Ritter) & *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *limariensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H., *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. subsp. ***curvispina*** var. ***tuberisulcata*** (Jacobi) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus tuberisulcatus* (Jacobi) A. Berger, *Pyrrhocactus armatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* Backeb., nom. illeg., *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. fma. *vegasanus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *mutabilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus odoriflorus* F. Ritter, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *armata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *odoriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria tuberisulcata* (Jacobi) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *armata* (F. Ritter) Katt., *Echinocactus tuberisulcatus* Jacobi, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *robusta* (F. Ritter) Katt., *Cactus horridus* Bertero ex Colla, nom. illeg., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *mutabilis* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus robustus* F. Ritter, *Echinocactus horridus* (Bertero ex Colla) J. Remy ex Gay
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. subsp. ***marksiana*** (Ritter) R. Ferryman

Sinónimos: *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter, *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus truncatipetalus* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *lissocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *marksiana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria marksiana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 200-500 m.

Eriosyce engleri (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus engleri* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *engleri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria engleri* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Horridocactus engleri* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1900 m.

Eriosyce eriosyzoides (F. Ritter) Ferryman

Sinónimos: *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus atroviridis* F. Ritter, *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus transiens* F. Ritter, *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter)

A.E. Hoffm. var. *totalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria eriosyzoides* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria huascensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieu* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *huascensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb., *Neoporteria totalensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *domeykoensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *transitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A. Hoffm., comb. illeg., *Neochilenia transitensis* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *carrizalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *huascensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *totalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce kunzei* (C.F. Först.) Katt. var. *transitensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman, *Horridocactus eriosyzoides* F. Ritter, *Eriosyce kunzei* auct. non (C.F. Först.) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *transitensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Horridocactus atroviridis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *atroviridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *carrizalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus carrizalensis* F. Ritter, *Horridocactus carrizalensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria totalensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *carrizalensis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *huascensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus huascensis* F. Ritter, *Neochilenia huascensis* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *totalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Pyrrhocactus totalensis* F. Ritter, *Neochilenia totalensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus kunzei* (C.F. Först.) Y. Ito
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Eriosyce esmeraldana (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria esmeraldana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Thelocephala esmeraldana* (F. Ritter) F. Ritter, *Chileorebutia esmeraldana* F. Ritter, *Neochilenia esmeraldana* (F. Ritter) Backeb.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-200 m.

Eriosyce garaventae (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus garaventae* (F. Ritter) F. Ritter, *Horridocactus garaventae* F. Ritter, *Neoporteria subaiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria garaventae*

(F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *garaventae* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Eriosyce heinrichiana (Backeb.) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus heinrichianus* (Backeb.) F. Ritter, *Pyrrhocactus chaniarensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *spiniosior* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter var. *intermedius* F. Ritter, *Pyrrhocactus trapichensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus wagenknechtii* F. Ritter, *Neoporteria chorosensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria deherdtiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neoporteria dimorpha* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chaniarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chorosensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *dimorpha* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *setosiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *trapichensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *wagenknechtii* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria occulta* (Phil.) Britton & Rose, *Neoporteria ritteri* Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria setosiflora* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *intermedia* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. var. *setosiflora* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt., *Chilenia occulta* (Phil.) Backeb., *Echinocactus occultus* Phil., *Chilenia jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce ihotzkyana F. Ritter

Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Eriosyce iquiquensis (F. Ritter) Ferryman

Sinónimos: *Pyrrhocactus saxifragus* F. Ritter, *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floribunda* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *saxifraga* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria iquiquensis* (F. Ritter) Donald & G.D.

Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *residua* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria residua* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Islaya iquiquensis* (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling, *Neochilenia iquiquensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus aricensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus residuus* F. Ritter & Buining, *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt. subsp. *iquiquensis* (F. Ritter) Katt.

Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 600-1000 m.

Eriosyce islayensis (C.F. Först.) Katt.

Sinónimos: *Islaya islayensis* (C.F. Först.) Backeb., *Echinocactus islayensis* C.F. Först.
Arbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR.
Países limítrofes: Perú.

Eriosyce krausii (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria esmeraldana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *malleolata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala krausii* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala longirapa* F. Ritter, *Thelocephala malleolata* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala malleolata* (F. Ritter) F. Ritter var. *solitaria* (F. Ritter) F. Ritter, *Chileorebutia kraussii* Ritter, *Neochilenia kraussii* (Ritter) Backeb., *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. var. *kraussii* (Ritter) Hoffman, *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *malleolata* Hoffman & Walter, *Chileorebutia malleolata* Ritter, *Neochilenia malleolata* (Ritter) Backeb., *Thelocephala malleolata* (Ritter) Ritter, *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. var. *malleolata*, *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *malleolata* Hoffman & Walter var. *weisserii* Hoffman & Walter, *Thelocephala weisserii* (Hoffman & Walter) Faúndez & Saldivia
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eriosyce lapampaensis F. Ritter

Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200-2500 m.

Eriosyce laui Luthy

Sinónimos: *Islaya laui* (Luthy) Faúndez & R. Kiesling, *Rimacactus laui* (Luthy) Mottram
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 500-700 m.

Eriosyce megacarpa F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Eriosyce napina (Phil.) Katt.
Sinónimos: *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. fma. *nuda* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *duripulpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *lembckeii* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *glabrescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia lembckeii* Backeb., *Eriosyce aerocarpa* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. var. *duripulpa* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *lembckeii* Katt., *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *fulva* (F. Ritter) Katt., *Thelocephala aerocarpa* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala duripulpa* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala fulva* F. Ritter, *Thelocephala nuda* F. Ritter, *Echinocactus napinus* Phil., *Thelocephala napina* (Phil.) Y. Ito, *Chileorebutia napina* (Phil.) F. Ritter, *Neochilenia napina* (Phil.) Backeb., *Neochilenia napina* (Phil.) Backeb. var. *mitis* (Phil.) Backeb., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *aerocarpa* (F. Ritter) Ferryman, *Chileorebutia aerocarpa* F. Ritter, *Neochilenia aerocarpa* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *aerocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala lembckeii* (Backeb.) F. Ritter, *Chileorebutia duripulpa* F. Ritter, *Neochilenia duripulpa* (F. Ritter) Backeb., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *challensis* R. Keim & I. Schaub, *Eriosyce spectabilis* A.E. Hoffm. & H.E. Walter, nom. nud.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Eriosyce occulta Katt.
Sinónimos: *Pyrrhocactus philippianus* Faúndez, *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter, nom. illeg., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter var. *spiniosior* F. Ritter, nom. illeg.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. ***glabrescens*** (F. Ritter) Katt.
Sinónimos: *Thelocephala glabrescens* (F. Ritter) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. ***malleolata*** (F. Ritter) A.E. Hoffm. & H. Walter var. ***weisseri*** A.E. Hoffm. & H. Walter
Sinónimos: *Thelocephala weisseri* (A. Hoffmann & H.

Walter) Faúndez & Saldivia
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. ***odieri***
Sinónimos: *Neoporteria monte-amargensis* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb., *Neoporteria reichei* (K. Schum.) Backeb., *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. var. *monte-amargensis* Katt., *Thelocephala odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter, *Neochilenia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb., *Chileorebutia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter, *Echinocactus odieri* Lem. ex Salm-Dyck
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Eriosyce paucicostata (F. Ritter) Ferryman subsp. ***echinus*** (Ritter) R. Ferryman
Sinónimos: *Pyrrhocactus echinus* F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *echinus* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *echinus* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *glaucescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus glaucescens* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 400-800 m.

Eriosyce paucicostata (F. Ritter) Ferryman subsp. ***floccosa*** (Ritter) R. Ferryman
Sinónimos: *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *floccosa* (F. Ritter) Katt., *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter var. *minor* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria eriocephala* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floccosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-600 m.

Eriosyce paucicostata (F. Ritter) Ferryman subsp. ***paucicostata***
Sinónimos: *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *densispinus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *elongatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *flaviflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter var. *viridis* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria fusca* (Muehlenpf.) Britton & Rose, *Neoporteria haenkeana* (C.F. Först.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria paucicostata*

(F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *neohankeana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *viridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria woutersiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Delaetia woutersiana* Backeb., nom. illeg., *Eriosyce taltalensis* (Hutchinson) Katt. subsp. *paucicostata* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus paucicostatus* F. Ritter, *Neoporteria neohankeana* (F. Ritter) Ferryman, *Neochilenia paucicostata* (F. Ritter) Backeb.
Arbusto suculento. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Eriosyce recondita (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus reconditus* F. Ritter, *Pyrrhocactus vexatus* F. Ritter, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *vexata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neochilenia recondita* (F. Ritter) Backeb.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 400-1000 m.

Eriosyce rodentiophila F. Ritter

Sinónimos: *Eriosyce rodentiophila* F. Ritter var. *lanata* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Eriosyce senilis (Backeb.) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria nidus* (Söhrrens ex K. Schum.) Britton & Rose, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter fma. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter fma. *tenuispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter var. *robusta* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria multicolor* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrrens) Britton & Rose var. *coimasensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria nidus* (Söhrrens) Britton & Rose var. *gerocephala* (Y. Ito) F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrrens) Britton & Rose var. *matancillana* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrrens) Britton & Rose var. *multicolor* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria robusta* F. Ritter, *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *robusta* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *coimasensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *elquiensis* Katt., *Echinocactus senilis* Phil., nom. illeg., *Neoporteria gerocephala* Y. Ito, *Neoporteria senilis* Backeb., *Echinocactus nidus* Söhrrens ex K. Schum.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 200-500 m.
Nombre vulgar: Viejito.

Eriosyce simulans (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Pyrrhocactus simulans* F. Ritter, *Neoporteria simulans* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *simulans* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia simulans* (F. Ritter) Backeb.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 100-400 m.

Eriosyce sociabilis (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria sociabilis* F. Ritter, *Neoporteria sociabilis* F. Ritter var. *napina* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. subsp. ***clavata*** (Söhrrens ex K. Schum.) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm., *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm. fma. *grandiflora* F. Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm. var. *nigrihorrida* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm. var. *parviflora* F. Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm. var. *procera* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *graciana* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *serenana* F. Ritter, *Neoporteria nigrihorrida* Backeb., *Neoporteria nigrihorrida* (Backeb.) Backeb. fma. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *microsperma* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *napina* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *nigrihorrida* (Backeb.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *vallenarensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *wagenknechtii* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. subsp. *clavata* (Söhrrens ex K. Schum.) Katt.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. subsp. ***subgibbosa*** var. ***castanea*** (F. Ritter) Katt.

Sinónimos: *Neoporteria castanea* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. subsp. ***subgibbosa*** var. ***subgibbosa***

Sinónimos: *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose, *Neoporteria castanea* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Neoporteria litoralis* F. Ritter var. *intermedia* F. Ritter, *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var.

intermedia (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *litoralis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *orientalis* F. Ritter, *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *litoralis* (F. Ritter) Katt., *Echinocactus subgibbosus* Haw., *Cereus dichroacanthus* Mart. ex Pfeiff., *Echinocactus acutissima* Otto & Dietr., *Echinocactus castaneoides* Cels ex Salm-Dyck, *Cactus berteri* Colla
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. ***pilisipina*** (F. Ritter) Katt.
Sinónimos: *Pyrrhocactus pilispina* Ritter, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pilisipina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria pilispina* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. ***pygmaea*** R. Ferryman
Sinónimos: *Pyrrhocactus pygmaeus* F. Ritter, *Pyrrhocactus gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pulchellus* F. Ritter, *Neoporteria calderana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley fma. *gracilis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley fma. *pygmaea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pulchella* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *scoparia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria scoparia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison var. *transiens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *pygmaea* (F. Ritter) Katt.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. ***taltalensis***
Sinónimos: *Pyrrhocactus taltalensis* (Hutchison) F. Ritter, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt., *Pyrrhocactus tenuis* F. Ritter, *Neoporteria rupicola* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison, *Neochilenia taltalensis* (Hutchison) Backeb., *Pyrrhocactus rupiculus* F. Ritter
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 500-700 m.

Eriosyce tenebrica (F. Ritter) Katt.
Sinónimos: *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *fankhauseri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala fankhauseri* F. Ritter, *Thelocephala tenebrica* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Eriosyce villosa (Monv.) Katt.
Sinónimos: *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger, *Neoporteria laniceps* F. Ritter, *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger var. *laniceps* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cactus villosus* Monv., *Neoporteria atrispinosa* Backeb., *Echinocactus villosus* (Monv.) Labour.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Nombre vulgar: Quisco.

Eulychnia

Eulychnia acida Phil.
Sinónimos: *Eulychnia acida* Phil. var. *elata* F. Ritter, *Eulychnia acida* Phil. var. *procumbens* F. Ritter
Árbol suculento. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Nombre vulgar: Copao.

Eulychnia aricensis F. Ritter
Árbol suculento. Endémico.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 400-700 m.

Eulychnia breviflora Phil.
Sinónimos: *Eulychnia barquitenis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *taltalensis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *tenuis* F. Ritter, *Eulychnia saint-pieana* F. Ritter var. *barquitenis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Cereus panoplaeatus* Monv.
Árbol suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Copao.

Eulychnia castanea Phil.
Sinónimos: *Cereus castaneus* (Phil.) K. Schum., *Philippicereus castaneus* (Phil.) Backeb.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Eulychnia iquiquensis (K. Schum.) Britton & Rose
Sinónimos: *Eulychnia iquiquensis* (K. Schum.) Britton & Rose var. *pullilana* F. Ritter, *Cereus iquiquensis* K. Schum., *Eulychnia breviflora* Phil. subsp. *iquiquensis* (K. Schum.) D.R. Hunt
Árbol suculento. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Copao.

Eulychnia saint-pieana F. Ritter
Árbol suculento. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Haageocereus

Haageocereus australis Backeb.
Sinónimos: *Haageocereus australis* Backeb. fma. *subtilispinus* F. Ritter, *Haageocereus multicolorspinus* Buining
Arbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Perú.

Haageocereus fascicularis (Meyen) F. Ritter
Sinónimos: *Cereus fascicularis* Meyen, *Trichocereus fascicularis* (Meyen) Britton & Rose, *Weberbauerocereus fascicularis* (Meyen) Backeb.
Arbusto suculento. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Nombre vulgar: Chikachika.

Maihuenia

Maihuenia patagonica (Phil.) Britton & Rose
Sinónimos: *Opuntia patagonica* Phil.
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.
Sinónimos: *Opuntia poeppigii* Otto & Pfeiff., *Maihuenia philippii* (F.A.C. Weber) K. Schum., *Pereskia philippii* F.A.C. Weber, *Pereskia poeppigii* Salm-Dyck, *Opuntia maihuen* J. Remy
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Maihuén.

Maihueniopsis

Maihueniopsis archiconoidea F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia archiconoidea* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1200-1800 m.

Maihueniopsis atacamensis (Phil.) F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia atacamensis* Phil., *Tephrocactus atacamensis* (Phil.) F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4100 m.
Nombre vulgar: Chuchampe.

Maihueniopsis camachoii (Espinosa) F. Ritter
Sinónimos: *Tephrocactus camachoii* (Espinosa) Backeb., *Opuntia camachoii* Espinosa, *Tephrocactus chilensis* Backeb.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3900 m.
Nombre vulgar: Kume.

Maihueniopsis colorea (F. Ritter) F. Ritter
Sinónimos: *Tephrocactus coloreus* F. Ritter, *Opuntia colorea* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1300-3500 m.

Maihueniopsis crassispinga F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia crassispinga* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200 m.

Maihueniopsis darwinii (Hensl.) F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia darwinii* Hensl., *Tephrocactus darwinii* (Hensl.) Backeb. ex Fric
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Maihueniopsis domeykoensis F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia domeykoensis* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Maihueniopsis glomerata (Haw.) R. Kiesling
Sinónimos: *Opuntia glomerata* Haw., *Maihueniopsis tarapacana* (Phil.) F. Ritter, *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb., *Opuntia conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) G.D. Rowley, *Tephrocactus conoideus* F. Ritter ex Backeb., *Tephrocactus reicheanus* (Espinosa) Backeb., *Maihueniopsis conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) F. Ritter, *Opuntia ovallei* Gay, *Opuntia tarapacana* Phil., *Tephrocactus tarapacanus* (Phil.) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Maihueniopsis grandiflora F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1700 m.

Maihueniopsis nigrispina (K. Schum.) R. Kiesling
Sinónimos: *Opuntia nigrispina* K. Schum., *Tephrocactus nigrispinus* (K. Schum.) Backb.
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Maihueniopsis ovata (Pfeiff.) F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia ovata* Pfeiff., *Tephrocactus ovatus* (Pfeiff.) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Gatito, perrito.

Maihueniopsis rahmeri (Phil.) F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia rahmerii* Phil.
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: TAR.

Maihueniopsis wagenknechtii F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia wagenknechtii* (F. Ritter) D.R. Hunt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2000 m.

Miqueliopuntia

Miqueliopuntia miquelii (Monv.) F. Ritter
Sinónimos: *Opuntia miquelii* Monv., *Cylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb., *Opuntia geissei* Phil., *Austrocilindropuntia miquelii* (Monv.) Backb.
Arbusto suculento. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Neowerdermannia

Neowerdermannia chilensis Backeb.
Sinónimos: *Weingartia chilensis* (Backeb.) Backeb., *Sulcorebutia chilensis* (Backeb.) F.H. Brandt
Subarbusto suculento. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Oreocereus

Oreocereus hempelianus (Gürke) D.R. Hunt
Sinónimos: *Arequipa australis* F. Ritter, *Arequipa hempeliana* (Gürke) Kreuz. & Buining, *Echinopsis hempelianus* Gürke, *Oreocereus australis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2400-3700 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Achacaño.

Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter
Sinónimos: *Oreocereus variicolor* Backeb., *Arequipa leucotricha* (Phil.) Britton & Rose, *Echinocactus leucotrichus* Phil., *Borzicactus leucotrichus* (Phil.) Kimmnach
Arbusto suculento. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2400-3500 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Pichaja, chastudo.

Pterocactus

Pterocactus australis (F.A.C. Weber) Backeb.
Sinónimos: *Opuntia australis* F.A.C. Weber
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Pterocactus hickenii Britton & Rose
Sinónimos: *Opuntia skottsbergii* Britton & Rose, *Pterocactus skottsbergii* (Britton & Rose) Backeb.
Subarbusto suculento. Nativo.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tunilla

Tunilla soehrensii (Britton & Rose) Hunt & Iliff
Sinónimos: *Platyopuntia chilensis* Ritt., *Tunilla chilensis* (Ritt.) D. Hunt & J. Iliff, *Airampoia chilensis* (Ritt.) Doweld.
Arbusto suculento. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

CALCEOLARIACEAE

Calceolaria

Calceolaria aiseniana Ehrh.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Calceolaria alba Ruiz & Pav.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.

Calceolaria andina Benth.
Sinónimos: *Calceolaria secunda* Witasek
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 800-3000 m.

Calceolaria angustifolia (Lindl.) Sweet
Sinónimos: *Calceolaria berterii* Colla, *Calceolaria salicariifolia* Phil., *Calceolaria integrifolia* L. var. *angustifolia* Lindl.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2600 m.

Calceolaria arachnoidea Graham subsp. *arachnoidea*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1900-2600 m.
Nombre vulgar: Relbún de la cordillera.

Calceolaria arachnoidea Graham subsp. *nubigena* (Poepp.) C. Ehrh.
Sinónimos: *Calceolaria nubigena* Poepp., *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *lanata* Meyen ex Walp. & Schauer, *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *viridis* Benth.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Nombre vulgar: Relbún de la cordillera.

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. *ascendens*
Sinónimos: *Calceolaria uspallatensis* Kraenzl.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1900 m.

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. *exigua* (Witasek) Nic. García
Sinónimos: *Calceolaria exigua* Witasek, *Calceolaria miserrima* Kraenzl., *Calceolaria parvifolia* Phil., nom. illeg.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1600-2100 m.

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. *glandulifera* (Witasek) C. Ehrh.
Sinónimos: *Calceolaria bipartita* Phil., *Calceolaria glandulifera* Witasek
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 800-2000 m.

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. *pristiphylla* (Phil.) C. Ehrh.
Sinónimos: *Calceolaria pristiphylla* Phil., *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *pristiphylla* (Phil.) Kraenzl.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 500-1800 m.

Calceolaria asperula Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 900-2000 m.

Calceolaria auriculata Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 200 m.

Calceolaria biflora Lam.
Sinónimos: *Calceolaria plantaginea* Sm., *Calceolaria falklandica* (S. Moore) Kraenzl., *Fagelia falklandica* S. Moore
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria caleuana Muñoz-Schick & Moreira

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2100-2300 m.

Calceolaria campanae Phil.

Sinónimos: *Calceolaria gnaphaliifolia* Kraenzl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Calceolaria cana Cav.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 600-2500 m.

Calceolaria cavanillesii Phil.

Sinónimos: *Calceolaria recta* Witasek
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria collina Phil. subsp. ***collina***

Sinónimos: *Calceolaria coquimbensis* (Benth.) Kraenzl.,
Calceolaria ascendens Lindl. var. *coquimbensis* Benth.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Calceolaria collina Phil. subsp. ***conferta*** (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria conferta* Witasek, *Calceolaria fulva* Witasek fma. *viscosa* Witasek
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 400-1600 m.

Calceolaria collina Phil. subsp. ***subincisa*** (Benth.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria abscondita* Witasek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *subincisa* Benth., *Calceolaria quadriradiata* Phil.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 200-800 m.

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. ***corymbosa***

Sinónimos: *Calceolaria herbertiana* Lindl., *Calceolaria cordata* Phil., *Calceolaria herbertiana* Lindl. var. *parviflora* Lindl.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.
Nombre vulgar: Arguenita del cerro.

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. ***floccosa*** (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria floccosa* Witasek
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2200-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. ***mimuloides*** (Clos) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria mimuloides* Clos, *Calceolaria oligantha* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2200-3500 m.

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. ***montana*** (Cav.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria montana* Cav., *Calceolaria villosa* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2200-3100 m.

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. ***santiagina*** C. Ehrh.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 700-2300 m.

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. ***tetraphylla*** (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria tetraphylla* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 700-1600 m.

Calceolaria crenatiflora Cav.

Sinónimos: *Calceolaria hollermayeri* Kraenzl., *Calceolaria cunninghamii* Vatke, *Calceolaria pendula* Sweet
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria densifolia Phil. subsp. ***densifolia***

Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1200-1300 m.

Calceolaria densifolia Phil. subsp. *laxa* C. Ehrh.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 1300-1700 m.

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp. *araucana* (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria araucana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp. *cumingiana* (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *cumingiana* (Witasek) Reiche, *Calceolaria cummingiana* Witasek

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp. *dentata*

Sinónimos: *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *compacta* (Phil.) Reiche, *Calceolaria laetevirens* Kraenzl., *Calceolaria compacta* Phil., *Calceolaria chiloensis* Lindl., *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *chiloensis* (Lindl.) Kraenzl.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria filicaulis Clos subsp. *filicaulis*

Sinónimos: *Calceolaria flabellifolia* Kraenzl., *Calceolaria palenae* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1400-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria filicaulis Clos subsp. *luxurians* (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria luxurians* Witasek, *Calceolaria cana* Cav. var. *pannosa* (Phil.) Reiche, *Calceolaria pannosa* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2200-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria flavovirens C. Ehrh.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Calceolaria georgiana F. Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 400-700 m.

Calceolaria germainii Witasek

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 600-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth. subsp. *alcahuensis* (Muñoz-Schick) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria alcahuensis* Muñoz-Schick, *Calceolaria dumetorum* Phil., *Calceolaria glutinosa* Meigen, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 700-2100 m.

Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth. subsp. *glandulosa*

Sinónimos: *Calceolaria kingii* Phil., *Calceolaria atrovirens* Witasek

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Calceolaria hypericina Poepp. ex Benth.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1800-3000 m.

Calceolaria inamoena Kraenzl.

Sinónimos: *Calceolaria aberrans* Kraenzl.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3500-3800 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Kukumelo.

Calceolaria integrifolia L.

Sinónimos: *Calceolaria rugosa* Ruiz & Pav.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria lanigera Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

Calceolaria latifolia Benth.

Sinónimos: *Calceolaria latifolia* Benth. var. *longepetiolata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria longepetiolata* Phil., *Calceolaria stachydifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 500-1100 m.

Calceolaria lepida Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1800 m.

Calceolaria meyeniana Phil. subsp. ***cheiranthoides*** (Witasek) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria cheiranthoides* Reiche ex Witasek

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 500 m.

Calceolaria meyeniana Phil. subsp. ***glabrata*** (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria glabrata* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Calceolaria meyeniana Phil. subsp. ***meyeniana***

Sinónimos: *Calceolaria glabrata* Phil. var. *meyeniana* (Phil.) Reiche, *Calceolaria landbecki* Phil., *Calceolaria andicola* Witasek, *Calceolaria crocea* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Rango altitudinal: 600-2300 m.

Calceolaria meyeniana Phil. subsp. ***nahuelbutae*** (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria vernicosa* Phil., *Calceolaria nahuelbutae* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1300 m.

Calceolaria morisii Walp.

Sinónimos: *Calceolaria polyphylla* Kraenzl., *Calceolaria hypoleuca* Kuntze, nom. nud., *Calceolaria wettsteiniana* Witasek, *Calceolaria salviaefolia* Colla, nom. illeg.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Calceolaria nitida Colla

Sinónimos: *Calceolaria pseudoglandulosa* Clos

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 400-500 m.

Calceolaria nudicaulis Benth.

Sinónimos: *Calceolaria pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 500-1800 m.

Nombre vulgar: Topatopa.

Calceolaria pallida Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1600-2200 m.

Calceolaria paposana Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-600 m.

Calceolaria paralia Cav.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 600-2300 m.

Calceolaria petioalaris Cav.

Sinónimos: *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *cuspidata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria cuspidata* Phil., *Calceolaria effusa* Phil., *Calceolaria connata* Hook. ex Graham, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *oblongifolia* Clos, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *latifolia* Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Calceolaria philippii Eyz.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 1300 m.

Calceolaria picta Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Calceolaria pinifolia Cav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 2600-4300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria pinnata L.

Sinónimos: *Calceolaria bipinnatifida* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Calceolaria poikilanthos Sandwith
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1300-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria polifolia Hook.
Sinónimos: *Calceolaria spatellifolia* Kraenzl.
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-2300 m.
Nombre vulgar: Té de burro.

Calceolaria polyrrhiza Cav.
Sinónimos: *Calceolaria lanceolata* Cav., *Calceolaria prichardii* (Rendle) Kraenzl., *Fagelia prichardii* Rendle, *Calceolaria acutifolia* Witasek, *Calceolaria chubutensis* Skotts., *Calceolaria mendocina* Phil., *Calceolaria cymbiflora* Sandwith, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *acutifolia* (Witasek) Reiche, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *pusilla* (Witasek) Reiche, *Calceolaria pusilla* Witasek, *Calceolaria lanceolata* Cav. fma. *acutifolia* (Witasek) W. Bowden, *Calceolaria patagonica* Kraenzl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria purpurea Graham
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 900-2300 m.

Calceolaria rinconada Ehrh.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 200-600 m.

Calceolaria rubiginosa C. Ehrh.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 400-700 m.

Calceolaria segethii Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 800-2200 m.

Calceolaria spathulata Witasek
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1900-2000 m.

Calceolaria stellariifolia Phil.
Sinónimos: *Calceolaria rupicola* F. Meigen
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, RME.
Rango altitudinal: 2700-4300 m.
Nombre vulgar: Zapatilla, willjaya.

Calceolaria talcana Grau & Ehr. Bayer
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-1300 m.

Calceolaria tenella Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Calceolaria skottsbergii* Gand.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria thyrsoiflora Graham
Sinónimos: *Calceolaria thyrsoiflora* Graham var. *alliacea* Phil., *Calceolaria bridgesii* Kunze
Arbusto o subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Hierba dulce, palqui, palo dulce.

Calceolaria tripartita Ruiz & Pav.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-3900 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Calceolaria undulata Benth.
Sinónimos: *Calceolaria foliosa* Phil., *Calceolaria brevistyla* Clos
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, BIO.
Rango altitudinal: 1300-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria uniflora Lam.
Sinónimos: *Calceolaria nana* Sm., *Calceolaria darwinii* Benth., *Calceolaria uniflora* Lam. var. *darwinii* (Kuntze) Witasek ex Reiche, *Fagelia darwinii* Kuntze, *Calceolaria minima* Witasek
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria valdiviana Phil. subsp. ***crassifolia*** (Phil.) C. Ehrh.

Sinónimos: *Calceolaria crassifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Calceolaria valdiviana Phil. subsp. ***valdiviana***

Sinónimos: *Calceolaria llaimae* Kraenzl., *Calceolaria plantaginea* Sm. var. *obtusifolia* Clos, *Calceolaria obtusifolia* (Clos) Witasek, *Calceolaria tenera* Phil., *Calceolaria werdermannii* Kraenzl., *Calceolaria tenerifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 600-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria verbascifolia Bertero ex Phil.

Sinónimos: *Calceolaria borchersi* Phil., *Calceolaria oreas* Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO.

Rango altitudinal: 500-1300 m.

Calceolaria viscosissima (Hook.) Lindl.

Sinónimos: *Calceolaria pubescens* Phil., *Calceolaria robusta* A. Dietr., *Calceolaria integrifolia* L. var. *viscosissima* Hook., *Calceolaria gmelinii* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Calceolaria volckmannii Phil.

Sinónimos: *Calceolaria benthami* Phil., *Calceolaria bigemina* Phil., *Calceolaria poeppigiana* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calceolaria williamsii Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, BIO.

Rango altitudinal: 2400-2700 m.

Jovellana

Jovellana guentheri Kraenzl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Jovellana punctata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Calceolaria puncticulata* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Jovellana violacea (Cav.) G. Don

Sinónimos: *Calceolaria violacea* Cav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-600 m.

CALYCERACEAE

Boopis

Boopis australis Decne.

Sinónimos: *Acarpha australis* (Decne.) Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Boopis filifolia Speg.

Sinónimos: *Boopis prichardii* S. Moore

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Boopis gracilis Phil.

Sinónimos: *Boopis pozoaeformis* Phil., *Boopis gracilis*

Phil. var. *decumbens* Chodat & Wilczek, *Boopis gracilis*

Phil. var. *pozoaeformis* (Phil.) Hicken, *Boopis bicolor* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Boopis graminea Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Boopis multicaulis Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Boopis patagonica Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Boopis pusilla Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1600 m.

Calycera

Calycera eryngioides J. Remy

Sinónimos: *Anomocarpus eryngioides* (J. Remy) Miers
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Nombre vulgar: Repollito de cordillera.

Calycera herbacea Cav. var. ***herbacea***

Sinónimos: *Calycera herbacea* Cav. var. *viridiflora* (Phil.)
Pontiroli, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers, *Calycera nudicaulis* Phil., *Boopis viridiflora* Miers, *Chodat & Hassl.*,
Calycera viridiflora (Phil.) Miers fma. *squarrosa* (Miers)
Hicken, *Gymnocaulus viridiflorus* Phil., *Boopis australis*
Decne. var. *squarrosa* (Miers) Reiche, *Boopis squarrosa*
Miers
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 2200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calycera herbacea Cav. var. ***sinuata*** (Miers) Pontiroli

Sinónimos: *Calycera sinuata* Miers, *Calycera viridiflora*
(Phil.) Miers fma. *sinuata* (Miers) Hicken, *Calycera intermedia* Phil.,
Calycera involucrata Phil., *Calycera crenata* R.E. Fr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2500-4900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Calycera leucanthema (Poepp. ex Less.) Kuntze

Sinónimos: *Calycera integrifolia* (Phil.) Reiche, *Boopis integrifolia* Phil.,
Boopis leucanthema Poepp. ex Less., *Acicarpa lanata* Lag.,
Anomocarpus leucanthemus (Poepp. ex Less.) Miers, *Anomocarpus tenuifolius* Miers,
Anomocarpus tenuis Miers, *Leucocera annua* Turcz.,
Calycera lanata Benth. & Hook.f.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 300-700 m.

Calycera sessiliflora Phil.

Sinónimos: *Calycera sessiliflora* Phil. var. *axillaris* (Miers)
Reiche, *Anomocarpus axillaris* Miers, *Anomocarpus*

subsessiliflorus Miers, nom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 700-1900 m.

Calycera sympaganthera (Ruiz & Pav.) Kuntze

Sinónimos: *Calycera balsamitaefolia* (Juss.) Rich., nom. illeg.,
Calycera sympaganthera (Ruiz & Pav.) Martic. & Quezada, comb. illeg.,
Scabiosa sympaganthera Ruiz & Pav., *Boopis balsamitaefolia* Juss., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1300 m.

Gamocarpha

Gamocarpha alpina (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen

Sinónimos: *Boopis alpina* Poepp. ex Less., *Gamocarpha poeppigii* DC. var. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Boopis angustifolia* Phil.,
Gamocarpha ligulata Miers
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamocarpha dentata Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamocarpha gilliesii Miers

Sinónimos: *Gamocarpha breviscapa* Phil., *Boopis gilliesii* (Miers) Hauman,
Boopis breviscapa Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 200-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gamocarpha polycephala Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB.

Gamocarpha pumila Miers

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Gamocarpha selliana Reiche

Sinónimos: *Gamocarpha patagonica* Speg., *Gamocarpha selliana* Reiche var. *multicaulis* Dusén
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Moschopsis

Moschopsis leyboldii Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Moschopsis monocephala (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Boopis monocephala* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Waje, anukaylla.

Moschopsis rosulata (N.E. Br.) Dusén

Sinónimos: *Acicarpha rosulata* N.E. Br., *Moschopsis spathulata* Dusén, *Gamocarpha rosulata* (N.E. Br.) Skottsbo.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 700-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Moschopsis subandina (Speg.) Dusén

Sinónimos: *Gamocarpha subandina* Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Moschopsis trilobata Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nastanthus

Nastanthus caespitosus (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Boopis caespitosa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, MAU.

Rango altitudinal: 500-4300 m.

Nombre vulgar: Chicorea.

Nastanthus compactus (Phil.) Miers

Sinónimos: *Nastanthus diazi* (Phil.) Phil. ex Reiche, *Boopis diazi* Phil., *Boopis compacta* Phil.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, MAU.

Rango altitudinal: 3000-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nastanthus scapigerus (J. Remy) Miers

Sinónimos: *Nastanthus laciniatus* Miers, *Boopis laciniata* (Miers) Ball, *Boopis scapigera* J. Remy, *Boopis miersii* Phil., *Nastanthus spathulatus* (Phil.) Miers var. *spathulatus*, *Boopis spathulata* Phil., *Boopis bellidifolia* Phil., *Nastanthus bellidifolius* (Phil.) Reiche, *Boopis dubia* Phil., *Boopis reichei* Phil., *Boopis araucana* Phil., *Nastanthus araucanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus scapiger* Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, MAG.

Rango altitudinal: 500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nastanthus ventosus (Meyen) Miers

Sinónimos: *Calycera andina* Miers, nom. nud., *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *pinnatifidus* (Miers) Reiche, *Nastanthus pinnatifidus* Miers, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *laciniatus* (Miers) Reiche, *Calycera ventosa* Meyen, *Boopis ventosa* (Meyen) Kuntze, *Boopis scapigera* J. Remy var. *ventosus* (Meyen) Wedd., *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche var. *ventosus* (Meyen) Pontiroli, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *agglomeratus*, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *breviflorus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *gayanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *gilliesii* (Miers) Reiche, *Boopis breviflora* Phil., *Boopis gayana* Phil., *Nastanthus gilliesii* Miers, *Nastanthus gayanus* (Phil.) Miers

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1500-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

CAMPANULACEAE

Campanula

Campanula rapunculoides L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: JFE.

Cyphocarpus

Cyphocarpus innocuus Sandwith

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1000 m.

Cyphocarpus psammophilus Ricardi

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800 m.

***Cyphocarpus rigescens* Miers**

Sinónimos: *Cyphocarpus rigescens* Miers fma. *glabratus* Phil. ex E. Wimm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Nombre vulgar: Pata de pajarito.

Downingia

***Downingia pusilla* (G. Don ex A. DC.) Torr.**

Sinónimos: *Bolelia humilis* Greene, *Clintonia pusilla* G.

Don ex A. DC., *Downingia humilis* (Greene) Greene,

Lobelia pusilla Poepp., *Bolelia pusilla* (Poepp.) Greene

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Legenere

***Legenere valdiviana* (Phil.) E. Wimm.**

Sinónimos: *Howellia limosa* Greene, *Howellia valdiviana*

(Phil.) E. Wimm., *Legenere limosa* (Greene) McVaugh,

Lobelia valdiviana (Phil.) Vatke, *Mezleria valdiviana* Phil.,

Dortmannia valdiviana (Phil.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lobelia

***Lobelia anceps* L.f.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Lobelia bridgesii* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Tupa bridgesii* (Hook. & Arn.) A. DC.,

Rapuntium bridgesii (Hook. & Arn.) C. Presl, *Dortmannia*

bridgesii (Hook. & Arn.) Kuntze, *Lobelia blanda* (D. Don)

Heynh., *Tupa blanda* D. Don, *Rapuntium blandum* (D. Don)

C. Presl, *Rapuntium lucaeana* C. Presl, *Lobelia lucaeana*

(C. Presl) A. DC., *Dortmannia blanda* (D. Don) Kuntze,

Dortmannia lucaeana (C. Presl) Kuntze

Subarbusto. Endémica.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Tupa rosada.

***Lobelia excelsa* Bonpl.**

Sinónimos: *Lobelia salicifolia* Sweet, *Tupa salicifolia*

(Sweet) G. Don, *Tupa glaucescens* Phil., *Rapuntium*

excelsum (Bonpl.) C. Presl, *Dortmannia excelsa* (Bonpl.)

Kuntze, *Lobelia gigantea* auct. non Cav., *Lobelia arguta*

Lindl., *Tupa arguta* (Lindl.) G. Don, *Dortmannia arguta*

(Lindl.) Kuntze, *Lobelia neriifolia* Moris, *Tupa kingi* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Tupa.

***Lobelia oligophylla* (Wedd.) Lammers**

Sinónimos: *Pratia repens* Gaudich., *Hypsela reniformis*

(Kunth) C. Presl, *Pratia longiflora* Hook.f., *Hypsela*

oligophylla (Wedd.) Benth. & Hook.f. ex Zahlbr., *Lobelia*

pratiana Gaudich. ex Lammers, *Lysipomia reniformis*

Kunth, *Pratia atacamensis* Phil., *Pratia oligophylla* Wedd.,

Pratia pencana Phil., *Pratia subsessilis* Wedd., *Hypsela*

longiflora (Hook.f.) F. Phil., *Hypsela subsessilis* (Wedd.)

Benth. & Hook.f. ex Zahlbr., *Hypsela atacamensis* (Phil.)

F. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,

LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Qatari.

***Lobelia polyphylla* Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lobelia ovata* Reiche, *Tupa polyphylla* (Hook.

& Arn.) G. Don, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.)

C. Presl, *Dortmannia polyphylla* (Hook. & Arn.) Kuntze,

Tupa ovata Phil., *Rapuntium subdentatum* C. Presl, *Lobelia*

polyphylla Hook. & Arn. fma. *subdentata* (C. Presl) E.

Wimm., *Tupa subdentata* (C. Presl) A. DC., *Dortmannia*

subdentata (C. Presl) Kuntze, *Lobelia polyphylla* Hook.

& Arn. var. *besseriana* (C. Presl) Reiche, *Tupa polyphylla*

(Hook. & Arn.) G. Don var. *besseriana* (C. Presl) Vatke,

Tupa besseriana (C. Presl) A. DC., *Tupa purpurea* G.

Don, *Tupa serrata* Phil., *Rapuntium besserianum* C. Presl,

Rapuntium purpureum (G. Don) C. Presl, *Dortmannia*

besseriana (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia purpurea* (G.

Don) Kuntze, *Rapuntium bracteosum* C. Presl, *Lobelia*

polyphylla Hook. & Arn. fma. *bracteosa* (C. Presl) E.

Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *bracteosa*

(C. Presl) Reiche, *Tupa bracteosa* (C. Presl) A. DC.,

Dortmannia bracteosa (C. Presl) Kuntze, *Lobelia polyphylla*

Hook. & Arn. var. *angustifolia* Hook. & Arn. ex A. DC.,

Tupa polyphylla (Hook. & Arn.) G. Don var. *angustifolia*

(Hook. & Arn.) A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn.

var. *coquimbana* (Vatke) Reiche, *Tupa coquimbana* Phil.,

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. fma. *linearifolia* (Phil.)

E. Wimm., *Tupa linearifolia* Phil., *Tupa axilliflora* Phil.,

Lobelia axilliflora (Phil.) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. fma. *hyssopifolia* (C. Presl) E. Wimm., *Rapuntium hyssopifolium* C. Presl, *Tupa hyssopifolia* (C. Presl) A. DC., *Dortmanna hyssopifolia* (C. Presl) Kuntze, *Tupa gayana* Phil., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* (A. DC.) Heynh., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *latifolia* A. DC., *Lobelia poeppigiana* Kunze ex A. DC., *Rapuntium poeppigianum* (Kunze ex A. DC.) C. Presl, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *bracteosa* (C. Presl) Vatke, *Lobelia hyssopifolia* (C. Presl) Gay, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Hook. & Arn. ex A. DC.) Heynh., *Tupa atropurpurea* Vis., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *coquimbana* Vatke, *Tupa poeppigiana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Tupa.

***Lobelia tupa* L.**

Sinónimos: *Lobelia mucronata* Cav. var. *berteroi* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. fma. *hookeri* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav., *Lobelia mucronata* Cav. fma. *ovalifolia* E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *bicalcarata* (Kuntze) E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *montana* Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *pavonii* E. Wimm., *Lobelia serrata* Meyen, *Tupa feuillei* G. Don, *Tupa feuillei* G. Don var. *macrophylla* Vatke, *Rapuntium tupa* (L.) C. Presl, *Dortmanna tupa* (L.) Kuntze, *Dortmanna philippiana* Kuntze, *Lobelia bicalcarata* (Kuntze) Zahlbr. ex K. Schum., *Dortmanna bicalcarata* Kuntze, *Lobelia tupa* L. var. *mucronata* (Cav.) Reiche, *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC., *Tupa cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Tupa feuillei* G. Don var. *mucronata* (Cav.) Vatke, *Rapuntium mucronatum* (Cav.) C. Presl, *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. var. *hookeri* A. DC., *Tupa berteroi* A. DC., *Tupa feuillei* G. Don var. *berteroi* (A. DC.) Vatke, *Dortmanna berteroi* (A. DC.) Kuntze, *Lobelia tupa* L. var. *berteroi* (A. DC.) Reiche, *Lobelia feuillei* (G. Don) Voss, nom. illeg., *Dortmanna mucronata* (Cav.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Tupa, tabaco del diablo.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Triodanis

***Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. subsp. *biflora* (Ruiz & Pav.) Lammers**

Sinónimos: *Triodanis biflora* (Ruiz & Pav.) Greene, *Campanula biflora* Ruiz & Pav., *Pentagonia biflora* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Specularia biflora* (Ruiz & Pav.) Fisch. &

A. Gray, *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, VAL, RME, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Wahlenbergia

***Wahlenbergia berteroi* Hook. & Arn.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Wahlenbergia fernandeziana* A. DC.**

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

***Wahlenbergia grahamae* Hemsl.**

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400-600 m.

***Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC.**

Sinónimos: *Campanula arida* Kunth, *Campanula chilensis* Molina, *Campanula linarioides* Lam., *Wahlenbergia arida* (Kunth) Griseb., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *arida* (Kunth) A. DC., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *micrantha* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Uño-perquén.

***Wahlenbergia masafuerae* (Phil.) Skotts.**

Sinónimos: *Euphorbia masafuerae* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

***Wahlenbergia tuberosa* Hook.f.**

Subarbusto. Nativo.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Perú.

CAPRIFOLIACEAE

Centranthus

Centranthus ruber (L.) DC.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: JFE.

Dipsacus

Dipsacus sativus (L.) Honck.
Hierba. Biental. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, JFE.

Knautia

Knautia integrifolia Bertol.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ARA.

Sambucus

Sambucus nigra L.
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Scabiosa

Scabiosa atropurpurea L.
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, JFE.

Stangea

Stangea paulae Graebn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 4700-5200 m.
Países limítrofes: Perú.

Valeriana

Valeriana aequiloba Clos
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Valeriana atacamensis Borsini
Sinónimos: *Valeriana pubescens* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Valeriana boelckei Rossow
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana bracteosa Phil.
Sinónimos: *Valeriana rupestris* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, NUB.
Rango altitudinal: 1000-1600 m.

Valeriana bridgesii Hook. & Arn.
Sinónimos: *Valeriana regularis* Clos, *Valeriana simplex*
Clos, *Valeriana phellocarpa* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 200-900 m.

Valeriana carnosa Sm.
Sinónimos: *Valeriana magellanica* Lam.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana castellanosi Borsini
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 4200-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana chilensis Borsini
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana clarionifolia Phil.
Sinónimos: *Valeriana spegazzini* Skotts., *Valeriana*
sarcophylla Stuck. & Briq., *Phyllactis clarionifolia* (Phil.)
Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, AIS.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana crispa Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Valeriana oreocharis* Phil., *Valeriana floribunda*
Phil., *Valeriana lobata* (Hook. & Arn.) Höck, *Astrephia*
lobata Hook. & Arn., *Valeriana excelsa* Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana fonckii Phil.

Sinónimos: *Valeriana crenata* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana fragilis Clos

Sinónimos: *Betckea heterophylla* Phil., *Valeriana heterophylla* Phil., *Valeriana integrifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Valeriana graciliceps Clos

Sinónimos: *Valeriana lutescens* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Valeriana grandifolia Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Valeriana hebecarpa DC.

Sinónimos: *Valeriana columbaria* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana hornschuchiana Walp.

Sinónimos: *Valeriana glauca* auct. non DC., *Valeriana rotundiloba* Clos, *Valeriana bustillosii* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana hyalinorrhiza Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Valeriana interrupta Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Valeriana lapathifolia Vahl

Sinónimos: *Valeriana cordata* Griseb., *Valeriana cordata* Griseb. var. *dentata* Phil., *Valeriana andonaegui* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualhuilque, gualhuilque.

Valeriana laxiflora DC.

Sinónimos: *Valeriana laxa* Phil., *Valeriana rupicola* Poepp. & Endl., *Valeriana sparsiflora* Clos, *Valeriana foliosa* Phil., *Valeriana lyrata* Phil., *Valeriana pearcei* Phil., *Valeriana laxiflora* DC. var. *cardaminifolia* Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana lepidota Clos

Sinónimos: *Valeriana colchaguensis* Phil., *Valeriana maipoana* Ravenna

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 1000-2300 m.

Valeriana leucocarpa DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana macrorhiza DC.

Sinónimos: *Phyllactis macrorhiza* (DC.) Wedd., *Phyllactis gilliesii* (Hook. & Arn.) Wedd., *Valeriana gilliesii* (Hook. & Arn.) Stuck. & Briq., *Betckea gilliesii* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1500-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Triaca del cerro.

Valeriana moyanoi Speg.

Sinónimos: *Valeriana fonckii* Phil. var. *spiciformis* Dusén, *Valeriana radicalis* Clos var. *patagonica* Hicken

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 1000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valeriana nivalis Wedd.

Sinónimos: *Valeriana altoandina* Cabrera
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3600-4800 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Waji.

Valeriana obtusifolia DC.

Sinónimos: *Valeriana obovata* Clos, *Valeriana aegilitis* Phil., *Valeriana araucana* Phil., *Valeriana crassicaulis* Phil., *Valeriana compacta* Phil., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Valeriana papilla Bertero ex DC.

Sinónimos: *Valeriana berterii* Colla, *Valeriana papilla* Bertero ex DC. var. *andicola* Clos
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 200-2000 m.
Nombre vulgar: Papilla.

Valeriana peltata Clos

Sinónimos: *Valeriana pterocarpa* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Valeriana petersenii Weberling & Reese

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3000-5000 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Valeriana philippiana Briq.

Sinónimos: *Valeriana pulchella* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana polemoniifolia Phil.

Sinónimos: *Valeriana pugae* Phil., *Valeriana caudata* Phil., *Valeriana germainii* Briq.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana pycnantha A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4000-4900 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Valeriana radicalis Clos

Sinónimos: *Valeriana andina* F. Meigen
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-3400 m.

Valeriana samolifolia (DC.) Colla

Sinónimos: *Plectritis congesta* (Lindl.) DC., *Betckea samolifolia* DC., *Valerianella samolifolia* (DC.) A. Gray, *Plectritis samolifolia* (DC.) Höck
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana sedifolia d'Urv.

Sinónimos: *Phyllactis sedifolia* (d'Urv.) Wedd., *Valeriana sedoides* Hombr. & Jacq., *Aretiastrum sedifolium* (d'Urv.) Graebn., Macloskie, *Valeriana magellanica* Hombr. & Jacquinet ex Decne
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana senecioides Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Valeriana sphaerocarpa Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL.

Valeriana stricta Clos

Sinónimos: *Valeriana glauca* DC., *Valeriana glauca* DC. var. *elegans* (Clos) Reiche, *Valeriana elegans* Clos
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valeriana urbanii Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-5000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Waje.

Valeriana vaga Clos

Sinónimos: *Valeriana muriculata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-2800 m.

Valeriana valdiviana Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Valeriana velutina Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1500-2200 m.

Valeriana verticillata Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Valeriana virescens Clos

Sinónimos: *Valeriana montteana* Phil., *Valeriana virescens*

Clos var. *montteana* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Valerianella

Valerianella eriocarpa Desv.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LRI.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Valerianella rimosa Bast

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ARA.

CARDIOPTERIDACEAE

Citronella

Citronella mucronata (Ruiz & Pav.) D. Don

Sinónimos: *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav., *Villaresia*

gongonha (Mart.) Miers var. *pungens* (Miers) Engl.,

Villaresia chilensis Stuntz, *Villaresia pungens* Miers,

Villaresia mucronata Ruiz & Pav. var. *laeta* Miers, *Patagua*

chilensis Poepp. ex Neger

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Huillipatagua, naranjillo.

CARICACEAE

Carica

Carica chilensis (Planch. ex A. DC.) Solms

Sinónimos: *Vasconcellea chilensis* Planch. ex A. DC.,

Papaya chilensis (Planch. ex A. DC.) Kuntze, *Carica*

pyriformis Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Palo gordo, monte gordo.

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma

Agrostemma githago L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO, ARA.

Arenaria

Arenaria digyna D.K.F. Schldl.

Sinónimos: *Arenaria serpylloides* Gay

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,

LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-4200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Arenaria fastigiata Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU.

Arenaria oligosperma Naudin

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Arenaria pleurantha Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA, AIS.

Arenaria rivularis Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3200-4700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Arenaria serpens* Kunth**

Sinónimos: *Arenaria microphylla* Phil., *Arenaria andicola* Gillies, *Arenaria andicola* Gillies var. *caespitosa* (Phil.) Hauman, *Arenaria caespitosa* Phil., *Arenaria palustris* Naudin, *Arenaria palustris* Naudin var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Arenaria patagonica* Phil., *Arenaria serpens* Kunth var. *andicola* (Gillies) Rohrb., *Arenaria serpens* Kunth var. *caespitosa* (Phil.) Hauman, *Arenaria serpens* Kunth var. *microphylla* (Phil.) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *palustris* (Naudin) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *patagonica* (Phil.) Speg., *Arenaria serpylloides* Naudin var. *andicola* (Gillies) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Arenaria serpyllifolia* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, BIO, AIS, MAG.

Augustea

***Augustea coquimbensis* (Gereau & Martic.) Iamónico**

Sinónimos: *Polycarpon coquimbense* Gereau & Martic.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1200-1700 m.

Cardionema

***Cardionema andinum* (Phil.) A. Nelson & J.F. Macbr.**

Sinónimos: *Pentacaena andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

***Cardionema kurtzii* Subils**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1500-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Cardionema ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.**

Sinónimos: *Acanthoynchia ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr., *Loeflingia ramosissima* Weinm., *Paronychia ramosissima* (Weinm.) DC., *Pentacaena ramosissima* (Weinm.) Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Jaramilla.

Cerastium

***Cerastium arvense* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Cerastium fontanum* Baumg. subsp. *vulgare* (Hartmann) Greuter & Burdet**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Cerastium glomeratum* Thuill.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Cerastium humifusum* Cambess.**

Sinónimos: *Cerastium montioides* Naudin

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Cerastium mucronatum* Wedd.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4300-4400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Colobanthus

***Colobanthus lycopodioides* Griseb.**

Sinónimos: *Colobanthus lechleri* Phil., *Drudea lycopodioides* (Griseb.) Griseb.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl.**

Sinónimos: *Colobanthus cherlerioides* Hook.f., *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook.f., *Colobanthus meigeni* Phil., *Sagina crassifolia* d'Urv., *Sagina quitensis* Kunth, *Colobanthus saginoides* Bartl.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,

MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Colobanthus subulatus (d'Urv.) Hook.f.
Sinónimos: *Colobanthus subulatus* (d'Urv.) Hook.f. var. *darwinii* Hook.f., *Sagina subulata* d'Urv.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Corrigiola

Corrigiola crassifolia Chaudhri
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.

Corrigiola propinqua Gay
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, LBO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. *latifolia* (Gay) Skottsb.
Sinónimos: *Corrigiola latifolia* Gay
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. *poepigii* Chaudhri
Sinónimos: *Corrigiola glomeruliflora* Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. *squamosa*
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Dianthus

Dianthus armeria L.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ARA.

Drymaria

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult.
Sinónimos: *Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. & Schult. var. *pacifica* Mizush., *Holosteum cordatum* L.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Drymaria engleriana (Muschl.) Baehni & J.F. Macbr. var. *devia* (Baehni & J.F. Macbr.) J.A. Duke
Sinónimos: *Drymaria devia* Baehni & J.F. Macbr.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3500 m.
Países limítrofes: Perú.

Drymaria paposana Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Herniaria

Herniaria cinerea DC.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ.

Lychnis

Lychnis coronaria (L.) Desr.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: BIO, ARA.

Microphyes

Microphyes litoralis Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Microphyes minima (Miers ex Colla) Briq.
Sinónimos: *Microphyes lanuginosus* Phil., *Talinum minimum* Miers ex Colla
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Microphyes robustus Ricardi var. *pallidus* Ricardi
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 500-900 m.

Microphyes robustus Ricardi var. *robustus*
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 800-1000 m.

Paronychia

Paronychia chilensis DC. subsp. *chilensis* var. *chilensis*

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Paronychia chilensis DC. subsp. *chilensis* var. *mutica* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Paronychia mutica* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, BIO.

Paronychia chilensis DC. subsp. *subandina* (Phil.) Chaudhri

Sinónimos: *Paronychia subandina* Phil., *Paronychia chilensis* DC. var. *subandina* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Paronychia coquimbensis Gay var. *appressa* (Phil.) Chaudhri

Sinónimos: *Paronychia appressa* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Paronychia coquimbensis Gay var. *coquimbensis*

Sinónimos: *Paronychia chilensis* DC. var. *coquimbensis* (Gay) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Paronychia franciscana Eastw.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, JFE.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Nota: Introducida en el Archipiélago de Juan Fernandez.

Paronychia johnstonii Chaudhri var. *johnstonii*

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Paronychia johnstonii Chaudhri var. *scabrida* Chaudhri

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Paronychia microphylla Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-3500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Té de burro.

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm.

Sinónimos: *Herniaria setigera* Gillies ex Hook. & Arn., *Paronychia chilensis* DC. var. *andina* (Phil.) Reiche,

Paronychia subandina Gand., nom. illeg., *Paronychia andina* Phil., nom. illeg., *Paronychia australis* Gillies

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Petrorhagia

Petrorhagia dubia (Raf.) G. López & Romo

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heyw.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA.

Philippiella

Philippiella patagonica Speg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polycarpon

Polycarpon moreiranum Muñoz-Schick

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 774 m.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Pycnophyllopsis

Pycnophyllopsis lanatum (Phil.) M. E. Timaná

Sinónimos: *Pycnophyllum lanatum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1550-2600 m.

Pycnophyllum

Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb.

Sinónimos: *Stichophyllum bryoides* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4100-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Yaretilla.

***Pycnophyllum glomeratum* Mattf.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 4200-4500 m.
Países limítrofes: Perú.

***Pycnophyllum macropetalum* Mattf.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Ayro macho.

***Pycnophyllum molle* J. Remy**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Yaretilla.

***Pycnophyllum spathulatum* Mattf.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-5000 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Reicheella

***Reicheella andicola* (Phil.) Pax**

Sinónimos: *Lyallia andicola* Phil., *Bryopsis andicola*
Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Nombre vulgar: Yaretilla de agua.

Sabulina

***Sabulina acutiflora* (Fenzl ex Endl.) Dillenb. & Kadereit**

Sinónimos: *Minuartia acutiflora* (Fenzl ex Endl.) Mattf.,
Alsine acutiflora Fenzl ex Endl., *Alsine minuta* (Naudin)
Rohrb., *Arenaria minuta* Naudin, *Minuartia minuta*
(Naudin) Roquero
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Sagina

Sagina apetala* Ard. var. *apetala

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LLA.

***Sagina apetala* Ard. var. *pachyrrhiza* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Sagina pachyrrhiza* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.

***Sagina apetala* Ard. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche**

Sinónimos: *Sagina valdiviana* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: LLA.

***Sagina chilensis* Naudin**

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, LBO, JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Sagina procumbens* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.

Saponaria

***Saponaria officinalis* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS.

Scleranthus

***Scleranthus annuus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Silene

***Silene andicola* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Melandrium andicum* (Gillies ex Hook. &
Arn.) Rohrb., *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var.
cucubaloides (Fenzl) Hosseus, *Melandrium cucubaloides*
Fenzl ex Rohrb., *Lychnis andicola* (Gillies ex Hook. &
Arn.) Rusby
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Silene antarctica* (Kuntze) Pedersen**

Sinónimos: *Lychnis antarctica* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Silene armeria* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: BIO, ARA.

***Silene chilensis* (Naudin) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis chilensis* Naudin, *Lychnis terminalis* Naudin, *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. var. *nubigenum* (Phil.) Reiche, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb., *Silene nubigena* Phil., *Melandrium terminale* (Naudin) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Silene chubutensis* (Speg.) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis chubutensis* Speg., *Melandrium chubutense* (Speg.) Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Silene gallica* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Silene magellanica* (Desr.) Bocquet**

Sinónimos: *Lychnis magellanica* Desr., *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb., *Lychnis graminea* Molina, nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Silene mandonii* (Rohrb.) Bocquet**

Sinónimos: *Melandrium mandonii* Rohrb., *Melandrium rimbachii* Mattf.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1500-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Silene patagonica* (Speg.) Bocquet**

Sinónimos: *Silene densifolia* (Dusén) Bocquet, *Lychnis patagonica* Speg., *Melandrium densifolium* Dusén, *Melandrium patagonicum* (Speg.) Speg., *Lychnis*

patagonica Speg. fma. *glabriuscula* H. Ross
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Silene plutonica* Naudin**

Sinónimos: *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *plutonicum* (Naudin) Hosseus, *Melandrium plutonicum* (Naudin) Reiche, *Silene glutinosa* Walp., nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Silene vulgaris* (Moench) Garcke**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, ARA.

Spergula

***Spergula arvensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

***Spergula bocconii* (Scheele) Pedersen**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG, JFE, IDE.

***Spergula cerviana* (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.**

Sinónimos: *Arenaria cerviana* Cham. & Schltdl., *Spergularia cerviana* (Cham. & Schltdl.) G. Don, *Lepigonum purpureum* Kindb. var. *firmum* Kindb., *Spergularia firma* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia polyantha* Phil., *Arenaria polyantha* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Spergula depauperata* (Naudin) Pedersen**

Sinónimos: *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb., *Arenaria depauperata* Naudin, *Lepigonum depauperatum* (Naudin) Kindb., *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb. var. *tenella* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Spergularia tenella* Phil., *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche, *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche var. *tenella* (Phil.) Hauman, *Lepigonum grandiflorum* Kindb., *Spergularia grandiflora* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia rengifoii* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, NUB, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 500-3800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Spergula pissisi (Phil.) Volponi

Sinónimos: *Spergularia pissisii* (Phil.) I.M. Johnst., *Arenaria pissisi* Phil., *Tissa pissisi* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Spergula platensis (Cambess.) Shinnars

Sinónimos: *Balardia platensis* Cambess.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: RME, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.

Spergula rubra (L.) D. Dietr.

Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Spergula villosa Pers.

Sinónimos: *Spergularia villosa* (Pers.) Cambess., *Arenaria berteriana* Phil., *Spergularia villosa* (Pers.) Cambess. var. *berteriana* (Phil.) Rohrb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Spergularia

Spergularia aberrans I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.

Spergularia arbuscula (Gay) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Paronychia arbuscula* Gay, *Arenaria teretifolia* Phil., *Arenaria lignosa* Phil., *Spergularia lignosa* (Phil.) Rohrb., *Spergularia fruticosa* Phil., *Spergularia teretifolia* (Phil.) Phil., *Tissa lignosa* (Phil.) Reiche, *Tissa teretifolia* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Spergularia confertiflora Steud.

Sinónimos: *Spergularia confertiflora* Steud. var. *polyphylla* (Phil.) Skotts., *Spergularia polyphylla* (Phil.) Rohrb., *Tissa polyphylla* (Phil.) Reiche, *Arenaria rubra* L. var. *polyphylla* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE, IDE.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Spergularia cremnophila I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Spergularia denticulata (Phil.) Phil.

Sinónimos: *Arenaria denticulata* Phil., *Tissa denticulata* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Spergularia dillenii Lebel

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, RME, MAU.

Spergularia fasciculata Phil.

Sinónimos: *Tissa stuebellii* Hieron., *Tissa fasciculata* (Phil.) Reiche, *Spergularia stuebellii* (Hieron.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-3800 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Alhucema.

Spergularia floribunda (Gay) Rohrb.

Sinónimos: *Arenaria floribunda* Gay, *Spergularia coquimbensis* Phil., *Tissa floribunda* (Gay) Reiche, *Lepigonum floribundum* (Gay) Kindb.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Spergularia manicata (Skotts.) Kool & Thulin

Sinónimos: *Sanctambrosia manicata* (Skotts.) Skotts., *Paronychia manicata* Skotts.
Arbusto. Endémico.
Distribución: IDE.

Spergularia marina (L.) Griseb.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, AIS, MAG.

Spergularia masafuerana Skotts.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Spergularia media (L.) C. Presl

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Spergularia pycnantha R. Roszbach
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Spergularia stenocarpa (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Arenaria stenocarpa* Phil., *Spergularia larrañagae* Phil., *Spergularia borchersi* Phil., *Tissa borchersi* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Stellaria

Stellaria alsine Grimm
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AIS, MAG.

Stellaria arvalis Fenzl ex F. Phil.
Sinónimos: *Stellaria cuspidata* Schltld. var. *alsineformis* Naudin
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Stellaria chilensis Pedersen
Sinónimos: *Stellaria concinna* Ravenna, *Stellaria circinata* Ravenna, *Stellaria celsa* Ravenna
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-3400 m.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Stellaria debilis d'Urv.
Sinónimos: *Alsine axillaris* (Phil.) Macloskie, *Alsine chubutensis* (Speg.) Macloskie, *Alsine debile* (d'Urv.) Macloskie, *Stellaria axillaris* Phil., *Stellaria chubutensis* Speg., *Stellaria debilis* d'Urv. var. *condensata* (A. Gray ex Macloskie) Hauman & Irigoyen, *Stellaria stenopetala* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *chubutensis* (Speg.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *magellanica* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *typica* Hauman, nom. illeg., *Stellaria xanthospora* Chodat & Wilczek
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Stellaria media (L.) Vill.
Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Stellaria pallida (Dumort.) Crép.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, MAG.

Stellaria parviflora Banks & Sol. ex Hook.f. subsp. *ignis* Pedersen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Stellaria weddellii Pedersen
Sinónimos: *Stellaria cuspidata* Schltld. var. *sessilifolia* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3100-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

CELASTRACEAE

Lepuropetalon

Lepuropetalon spathulatum Muhl. ex Elliott
Sinónimos: *Pyxidantha spathulata* Muhl., *Cryptopetalum pusillum* Hook. & Arn., *Lepuropetalon pusillum* (Hook. & Arn.) Gay
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Maytenus

Maytenus boaria Molina
Sinónimos: *Maytenus boaria* Molina var. *angustifolia* Turcz., *Maytenus chilensis* DC., *Maytenus chilensis* DC. var. *angustifolius* DC., *Celastrus uncinatus* Ruiz & Pav., *Maytenus crenulatus* C. Presl, *Boaria molinae* A. DC., *Maytenus magellanica* auct. non (Lam.) Hook.f., *Maytenus uncinatus* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Senecia maytenus* Lam., *Celastrum maytenus* Willd.
Árbol. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Maitén.

Maytenus chubutensis (Speg.) Lourteig, O'Donell & Sleumer

Sinónimos: *Pernettya chubutensis* Speg.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Maytenus disticha (Hook.f.) Urb.

Sinónimos: *Myginda disticha* Hook.f., *Rhacoma disticha* (Hook.f.) Loes.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f.

Sinónimos: *Cassine magellanica* Lam., *Celastrus megellanicus* (Lam.) DC., *Maytenus andina* Phil., *Euthalis lucida* Banks & Sol. ex Hook.f.

Árbol. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Leña dura.

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum

Ceratophyllum demersum L.

Sinónimos: *Ceratophyllum tricuspidatum* Dumort., *Ceratophyllum oxyacanthum* Cham., *Ceratophyllum tuberculatum* Cham., *Ceratophyllum apiculatum* Cham., *Ceratophyllum chilense* Leyb., *Ceratophyllum aquaticum* H.C. Watson, *Ceratophyllum australis* Griseb.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cola de zorro, lila de agua, pelo de agua, baba de sapo, hilo de agua.

CHENOPODIACEAE

Atriplex

Atriplex atacamensis Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-3000 m.

Nombre vulgar: Cachiyuyo.

Atriplex chapinii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Atriplex chilensis Colla

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Atriplex chizae Rosas

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Atriplex clivicola I.M. Johnst.

Sinónimos: *Atriplex clivicola* I.M. Johnst. var. *lopholepis*

I.M. Johnst., *Obione clivicola* (I.M. Johnst.) Ulbr.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-700 m.

Atriplex coquimbana Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 300-500 m.

Atriplex costellata Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Atriplex deserticola Phil.

Sinónimos: *Atriplex podocarpa* Phil., *Atriplex retusa* Gay, *Obione retusa* (Gay) Ulbr.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cachiyuyo.

Atriplex glaucescens Phil.

Sinónimos: *Atriplex polyphylla* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1300-3700 m.

Nombre vulgar: Juirajuirá.

Atriplex hortensis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME.

Atriplex hystrix Phil.

Sinónimos: *Atriplex mucronata* Phil., nom. illeg., *Obione hystrix* (Phil.) Ulbr., *Obione mucronata* (Phil.) Ulbr.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var. ***foliolosa*** (Phil.)

Rosas

Sinónimos: *Atriplex foliolosum* Phil., *Atriplex sanambrosiana* Sparre

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var. ***imbricata***

Sinónimos: *Atriplex axillaris* Phil., *Atriplex microphylla* Phil., *Obione imbricata* Moq., *Atriplex salaris* Phil., *Obione axillaris* (Phil.) Ulbr.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3500-3800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cachiyuyo, chókel, ojarar, kopakopa macho, pilaya.

Atriplex leuca Phil.

Sinónimos: *Atriplex densifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Atriplex madariagae Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-2700 m.

Nombre vulgar: Cachial, kachiyuyo, kórial, chókel, juirajura.

Atriplex myriophylla Phil.

Sinónimos: *Atriplex pusilla* (Wedd.) Phil., comb. illeg., *Obione pusilla* Wedd., hom. illeg., *Obione myriophylla* (Phil.) Ulbr.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Atriplex nummularia Lindl.

Arbusto. Introducido.

Distribución: ANT, COQ.

Atriplex oreophila Phil.

Sinónimos: *Atriplex humilis* Phil., hom. illeg., *Atriplex hypsophila* I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Atriplex patula L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA, LLA, MAG.

Atriplex peruviana Moq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 0-1900 m.

Países limítrofes: Perú.

Atriplex philippii R.E. Fr.

Sinónimos: *Atriplex prostrata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Nombre vulgar: Pasto cenizo.

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Atriplex repanda Phil.

Sinónimos: *Atriplex angustifolia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Sereno.

Atriplex rosea L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ.

Atriplex semibaccata R. Br.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Atriplex suberecta I. Verd.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ.

Atriplex taltalensis I.M. Johnst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Atriplex tatarica L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

Atriplex vallenarensis Rosas
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Atriplex vulgatissima Speg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Bassia

Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, VAL, RME.

Beta

Beta vulgaris L. subsp. *maritima* (L.) Arcang.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, VAL, RME.

Beta vulgaris L. subsp. *vulgaris*
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: TAR, JFE.

Chenopodiastrum

Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE.

Chenopodium

Chenopodium album L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Chenopodium antarcticum (Hook.f.) Benth. & Hook.f.
Sinónimos: *Blitum antarcticum* Hook.f., *Chenopodium antarcticum* (Hook.f.) Speg., comb. illeg.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chenopodium carnosulum Moq.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG.

Chenopodium crusoeanum Skottsb.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Chenopodium ficifolium Sm.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, LLA, MAG.

Chenopodium frigidum Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 3200-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chápir, yuyo, quínoa chica, illankoma.

Chenopodium glaucum L.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: IPA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Huataru (Rapa Nui).

Chenopodium hircinum Schrad.
Sinónimos: *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *typicum* A. Ludw. & Aellen, nom. illeg.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, LRI.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Yuyo, quínoa, illinkoma, ajara, quínoa de los abuelos.

Chenopodium mandonii (S. Watson) Aellen
Sinónimos: *Teloxys mandonii* S. Watson
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, VAL.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Chenopodium nesodendron Skottsb.
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 300-500 m.

Chenopodium papulosum Moq.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chenopodium petiolare Kunth
Sinónimos: *Chenopodium sparsiflorum* Phil., *Chenopodium hastatum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Yuyo, kañawe, juirajuirea, obleo, kantalo.

Chenopodium philippianum Aellen

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chenopodium quinoa Willd.

Sinónimos: *Chenopodium quinoa* Willd. fma. *purpurascens* Aellen
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, NUB, LLA.
Rango altitudinal: 0-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Quínoa, quingua, quinua, chula, ch'iva, ch'ivaqhora.

Chenopodium sanctae-clarae Johow

Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Chenopodium sancti-ambrosii Skottsb.

Arbusto. Endémico.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 300-500 m.

Chenopodium trifurcatum Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 350-2900 m.

Chenopodium vulvaria L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, VAL, RME, LBO, MAU.

Dysphania

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Sinónimos: *Ambrina parvula* Phil., *Ambrina ambrosioides* (L.) Spach, *Teloxys ambrosioides* (L.) W.A. Weber, *Chenopodium ambrosioides* L., *Ambrina incisa* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Paico, arka, toronjil dulce.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Dysphania chilensis (Schrad.) Mosyakin & Clemants

Sinónimos: *Ambrina andicola* Phil., *Ambrina denudata* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *euchilense* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. fma. *denudatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *andicola* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium anthelminticum* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *chilense* (Schrad.) Aellen, *Ambrina chilensis* (Schrad.) Spach, *Chenopodium vagans* Standl., *Chenopodium chilense* Schrad.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Paico.

Dysphania microcarpa (Phil.) Mosyakin & Clemants

Sinónimos: *Roubieva microcarpa* Phil., *Chenopodium zoellneri* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. var. *microcarpum* (Phil.) Reiche, *Chenopodium microcarpum* (Phil.) A. Troncoso
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME.

Dysphania multifida L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Maireana

Maireana brevifolia (R. Br.) Paul G. Wilson

Arbusto. Introducido.
Distribución: IDE.

Nitrophila

Nitrophila atacamensis (Phil.) Hieron. ex Ulbr.

Sinónimos: *Glaux atacamensis* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2300-4000 m.

Oxybasis

Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, LLA, AIS, MAG.

Oxybasis macrosperma (Hook.f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Sinónimos: *Chenopodium halophilum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *macrospermum*, *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *salsum* (Phil.) A. Troncoso, *Blitum salsum* Phil., *Chenopodium macrospermum* Hook.f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium macrospermum* Hook.f. var. *halophilum* (Phil.) Standl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Oxybasis urbica (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: JFE.

Salsola

Salsola kali L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Sarcocornia

Sarcocornia andina (Phil.) Freitag, M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sinónimos: *Salicornia andina* Phil., *Salicornia fruticosa* var. *andina* (Phil.) Gunckel, *Salicornia peruviana* var. *andina* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2300-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Sarcocornia magellanica (Phil.) M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sinónimos: *Salicornia magellanica* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Sarcocornia neei (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo

Sinónimos: *Salicornia peruviana* Kunth var. *corticosa* (Meyen) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Reiche, *Salicornia copiapina* Phil., *Salicornia neei* Lag.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Sosa, hierba sosa, hierba del salitre.

Nota: Introducida en Archipiélago de Juan Fernández. Alonso & Crespo (2008) excluyen a *Sarcocornia fruticosa* de las Américas, creando la combinación *Sarcocornia neei*, sin ser su sinónimo.

Sarcocornia pulvinata (R.E. Fr.) A.J. Scott

Sinónimos: *Salicornia pulvinata* R.E. Fr.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3600-4200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Janki, jankijanki, champa, yaretilla de la vega.

Suaeda

Suaeda argentinensis A. Soriano

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Suaeda foliosa Moq.

Sinónimos: *Suaeda foliosa* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Standl., *Suaeda brevifolia* Phil., *Suaeda divaricata* Moq. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda tenuifolia* Phil., *Suaeda parvifolia* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Suaeda multiflora Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Suaeda nesophila I.M. Johnst.

Sinónimos: *Suaeda divaricata* Moq. var. *microphylla* F. Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Suaeda patagonica Speg.

Sinónimos: *Lerchea patagonica* (Speg.) Speg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

CLEOMACEAE

Cleome

Cleome chilensis DC.

Sinónimos: *Cleome chilensis* DC. var. *pubescens* DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 300-700 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Hierba de los dedos, flor de la abeja, tacma.

COLUMELLIACEAE

Desfontainia

Desfontainia fulgens D. Don

Sinónimos: *Desfontainia chilensis* Gay, *Desfontainia novemdentata* Gand., *Desfontainia ilicifolia* Phil., *Desfontainia hookeri* Dunal, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *hookeri* (Dunal) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Gay) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *parvifolia* (D. Don) Hook., *Desfontainia acutangula* Dunal, *Desfontainia costaricensis* Wooson, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pavon, *Desfontainia obovata* Kraenzl., *Desfontainia parvifolia* D. Don, *Desfontainia pulchra* Mold., *Desfontainia splendens* Humb. & Bonpl., *Desfontainia steymarkii* Mold., *Linkia peruviana* Pers., *Linkia spinosa* (Ruiz & Pav.) Poiret, *Linkia splendens* (Humb. & Bonpl.) Poiret

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chapico, michai blanco, taique, trautrau.

CONVOLVULACEAE

Calystegia

Calystegia sepium (L.) R.Br.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA.

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 3-280 m.

Calystegia tuguriorum R. Br. ex Hook. f.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 30-150 m.

Países limítrofes: Argentina.

Convolvulus

Convolvulus arvensis L.

Hierba trepadora. Perenne. Introducido.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Convolvulus bonariensis Cav.

Sinónimos: *Aniseia diversifolia* Walp., *Convolvulus bonariensis* Cav. var. *multiflorus* Phil., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *diversifolius* (Walp.) Reiche, *Convolvulus triflorus* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Correhuela, bocina.

Convolvulus chilensis Pers.

Sinónimos: *Convolvulus dissectus* Cav., nom. illeg., *Convolvulus canescens* Phil., nom. illeg., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *canescens* (Phil.) Reiche

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Correhuela, bocina.

Convolvulus demissus Choisy

Sinónimos: *Convolvulus andinus* Phil., *Convolvulus demissus* Choisy var. *andinus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus demissus* Choisy var. *ovatus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus ovatus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Convolvulus hermanniae L'Hér.

Sinónimos: *Aniseia costata* (Meyen) Walp., *Convolvulus costatus* Meyen, *Convolvulus crenatus* Jacq., *Convolvulus erosus* Desr., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *elongatus* Choisy, *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *viridis* Meisn., *Convolvulus incanus* Vahl, *Ipomoea hermanniae* (L'Hér.) G. Don

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Convolvulus laciniatus Desr. var. ***hirsutus*** Desr.
Sinónimos: *Convolvulus lasianthus* Cav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Convolvulus laciniatus Desr. var. ***laciniatus***
Sinónimos: *Convolvulus geranioides* Phil., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn. var. *glabra* Griseb., *Convolvulus laciniatus* Desr. var. *peduncularis* Meisn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cressa

Cressa truxillensis Kunth
Sinónimos: *Cressa australis* R. Br. var. *petiolata* Meisn., *Cressa cretica* L. var. *truxillensis* (Kunth) Choisy
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Cuscuta

Cuscuta andina Phil.
Sinónimos: *Cuscuta racemosa* Mart. var. *andina* (Phil.) Reiche
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: MAU.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta campestris Yunck.
Hierba parásita. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Cuscuta chilensis Ker Gawl.
Sinónimos: *Cuscuta aurea* Phil.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel, cúscuta.

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. ***angustissima*** (Engelm.) Yunck.
Hierba parásita. Anual. Introducida.
Distribución: RME, ARA.

Cuscuta micrantha Choisy var. ***holwayi*** Yunck.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: MAU.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta micrantha Choisy var. ***latiflora*** Engelm.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta micrantha Choisy var. ***micrantha***
Sinónimos: *Cuscuta micrantha* Choisy var. *typica* Yunck., nom. illeg.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO.
Rango altitudinal: 3000 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta microstyla Engelm. var. ***bicolor*** (Hunz.) Hunz.
Sinónimos: *Cuscuta bicolor* Hunz.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta microstyla Engelm. var. ***microstyla***
Sinónimos: *Cuscuta microstyla* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. illeg.
Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: RME, BIO.
Rango altitudinal: 1600-3100 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta odorata Ruiz & Pav.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, LBO.
Rango altitudinal: 600-1500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta pauciflora Phil.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: MAU, LRI.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta purpurata Phil.

Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta pusilla Phil.

Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: LLA.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta rustica Hunz.

Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 4000 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta suaveolens Ser.

Sinónimos: *Cuscuta racemosa* Mart. var. *chiliana* Engelm.,
Cuscuta floribunda Phil.
Hierba parásita. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,
MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Cuscuta werdermannii Hunz.

Hierba parásita. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 300 m.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Dichondra

Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris

Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var.
microcalyx Hallier f., *Dichondra repens* auct. non J.R.
Forst. & G. Forst., *Dichondra sericea* Sw. var. *microcalyx*
(Hallier f.) H.T. Buck
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, ARA.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Dichondra sericea Sw. var. ***holosericea*** (O'Donell) Fabris

Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var.
holosericea O'Donell
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Dichondra sericea Sw. var. ***sericea***

Sinónimos: *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var.
sericea (Sw.) Choisy, *Dichondra parviflora* Meisn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,
NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Evolvulus

Evolvulus sericeus Sw. var. ***elongatus*** (Choisy) O'Donell

Sinónimos: *Evolvulus incanus* Pers. var. *elongatus* Choisy,
Leucomalla lanuginosa Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Evolvulus sericeus Sw. var. ***sericeus***

Sinónimos: *Evolvulus araucanus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Ipomoea

Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult.

Sinónimos: *Convolvulus dumetorum* Kunth, *Convolvulus*
pauciflorus Roem. & Schult., *Convolvulus pauciflorus* Roem.
& Schult. var. *chilensis* (A. Braun & Bouché) Kuntze, *Ipomoea*
chilensis A. Braun & Bouché, *Ipomoea paposana* Phil.
Hierba trepadora. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 900-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.

Hierba trepadora. Perenne. Introducida.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Tanoa, tano'a.

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Sinónimos: *Convolvulus purpureus* L.
Hierba trepadora. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

CORIARIACEAE

Coriaria

Coriaria ruscifolia L.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Deu, huique, huiqui, matarratones.

CRASSULACEAE

Crassula

Crassula closiana (Gay) Reiche

Sinónimos: *Tillaea closiana* Gay

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *connata*

Sinónimos: *Crassula erecta* (Hook. & Arn.) Berger, *Tillaea connata* Ruiz & Pav., *Tillaeae erecta* Hook. & Arn., *Tillaeae minima* Gay

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA.

Rango altitudinal: 0-3300 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *erectoides*

M. Bywater & Wickens

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU.

Nota: Presente en Arizona, California y México.

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. *muscooides*

M. Bywater & Wickens

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LLA.

Crassula decumbens Thunb.

Sinónimos: *Crassula ovallei* (Phil.) Reiche, *Crassula radicans* (Phil.) Reiche, *Tillaea ovallei* Phil., *Tillaea radicans* Phil., *Tillaea rencana* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL.

Crassula drummondii (Torr. & A. Gray) Fedde

Sinónimos: *Tillaea drummondii* Torr. & A. Gray

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Crassula moschata G. Forst.

Sinónimos: *Bulliarda magellanica* DC., nom. nud., *Crassula magellanica* (Willd. ex Schult.) Macloskie, *Tillaea magellanica* Willd. ex Schult., *Tillaea moschata* (G. Forst.) DC., *Tillaea chiloensis* Gay

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Crassula peduncularis (Sm.) F. Meigen

Sinónimos: *Crassula paludosa* (Schltdl.) Reiche, *Tillaea paludosa* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Tillaea peduncularis* Sm.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Crassula solieri (Gay) F. Meigen

Sinónimos: *Tillaea solierii* Gay, *Tillaea andicola* Phil., *Crassula andicola* (Phil.) Meigen

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Nota: También en Norteamérica.

Crassula tillaea Lest.-Garl.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Sedum

Sedum acre L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

CUCURBITACEAE

Sicyos

Sicyos baderoa Hook. & Arn. var. *ambrosianus* (Skotts.)

Mart. & Quezada

Sinónimos: *Sicyos bryoniaefolius* Moris var. *ambrosianus* Skotts.

Hierba trepadora. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 400-500 m.

Sicyos baderoa* Hook. & Arn. var. *baderoa

Sinónimos: *Sicyos bryoniaefolius* Moris

Hierba trepadora. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, JFE.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Brionia, calabacillo, tupac-llanco.

CUNONIACEAE

Caldcluvia

***Caldcluvia paniculata* (Cav.) D. Don**

Sinónimos: *Weinmannia paniculata* Cav., *Dieterica paniculata* (Cav.) Ser. ex A. DC., *Caldcluvia paniculata* (Cav.) D. Don var. *mochaena* Kunke, *Weinmannia corymbosa* Ruiz & Pav., *Weinmannia chilensis* DC.

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tiaca, triaca, quiaca.

Eucryphia

***Eucryphia cordifolia* Cav.**

Sinónimos: *Pellinia cordifolia* (Cav.) Molina

Árbol. Nativo.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ulmo, muermo.

***Eucryphia glutinosa* (Poepp. & Endl.) Baill.**

Sinónimos: *Eucryphia pinnatifolia* Gay, *Fagus glutinosa* Poepp. & Endl., *Eucryphia glandulosa* Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Nombre vulgar: Guindo santo.

Weinmannia

***Weinmannia trichosperma* Cav.**

Sinónimos: *Weinmannia dentata* Ruiz & Pav., *Windmannia trichosperma* (Cav.) Kuntze

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tineo, palo santo, teñiu, tinel, maden.

DROSERACEAE

Drosera

***Drosera uniflora* Willd.**

Sinónimos: *Drosera macloviana* Gand.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Atrapa-moscas.

ELAEOCARPACEAE

Aristotelia

***Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz**

Sinónimos: *Aristotelia glandulosa* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Aristotelia macqui* L'Hér., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *alpestris* Reiche, *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *andina* Phil., *Cornus chilensis* Molina, *Aristotelia glabra* Miers

Árbol. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Maqui, clon.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Crinodendron

***Crinodendron hookerianum* Gay**

Sinónimos: *Tricuspidaria hookeriana* (Gay) A. Cunn., *Tricuspidaria lanceolata* Miq., *Crinodendron eriocladum* Gand.

Árbol. Endémico.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Nombre vulgar: Chaquihue, chequehue, polizón, olivillo.

***Crinodendron patagua* Molina**

Sinónimos: *Tricuspidaria dependens* Ruiz & Pav., *Crinodendron dependens* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Tricuspidaria hexapetala* Turcz., *Tricuspidaria patagua* (Molina) Miers

Árbol. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Patagua, patahua.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

ELATINACEAE

Elatine

Elatine triandra Schkuhr

Sinónimos: *Elatine chilensis* Naudin, *Elatine nivalis* Speg., *Elatine hydropiper* L. var. *triandra* (Schkuhr) Fiori

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Yerbilla, hierbilla.

ERICACEAE

Empetrum

Empetrum rubrum Vahl ex Willd.

Sinónimos: *Empetrum nigrum* L. var. *andinum* DC., *Empetrum maclovianum* Gand.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Brecillo, murtilla de Magallanes.

Gaultheria

Gaultheria antarctica Hook.f.

Sinónimos: *Pernettya serpyllifolia* (Lam.) DC., *Arbutus serpyllifolia* Lam., *Gaultheria microphylla* Hook.f., *Gaultheria serpyllifolia* (Lam.) Skotts., *Pernettya hookeri* Nied.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gaultheria caespitosa Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Pernettya minima* Phil., *Gaultheria minima* (Phil.) Sandwith

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gaultheria insana (Molina) D.J. Middleton

Sinónimos: *Hippomanica insana* Molina, *Pernettya furiens* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya insana* (Molina) Gunckel, *Gaultheria furiens* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Arbutus furiens* Hook. & Arn., *Arbutus punctata* Hook. & Arn., *Gaultheria punctata* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.,

Pernettya punctata (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Arbutus vernalis* Poepp. & Endl., *Gaultheria vernalis* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Pernettya vernalis* (Poepp. & Endl.) Phil., *Pernettya melanocarpa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hued-hued.

Gaultheria linifolia (Phil.) Teillier & R.A. Rodr.

Sinónimos: *Pernettya linifolia* Phil., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *linifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *linifolia* (Phil.) Kausel, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Gaultheria poeppigii* DC. var. *linifolia* (Phil.) D.J. Middleton

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME, ARA, LRI, LLA.

Gaultheria marticorenae Teillier & P.W. Fritsch

Sinónimos: *Pernettya angustifolia* Lindl., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *angustifolia* (Lindl.) Reiche, *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. var. *angustifolia* (Lindl.) D.J. Middleton, *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, *Gaultheria angustifolia* (Lindl.) Teillier

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Gaultheria mucronata* (L.f.) Hook. & Arn. var. *microphylla* (Hombr.) D.J. Middleton, *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *microphylla* Decne., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng., *Pernettya mucronata* (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var. *parvifolia* (Phil.) Skotts., *Pernettya rupicola* Phil., *Arbutus mucronata* L.f., *Arbutus rigida* Banks & Sol. ex Hook.f., *Pernettya ovalifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya oblongifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya mucronata* DC. var. *rupicola* (Phil.) Reiche, *Pernettya litoralis* Phil., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Pernettya parvifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

Gaultheria nubigena (Phil.) B.L. Burt & Sleumer

Sinónimos: *Pernettya nubigena* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gaultheria phillyreifolia (Pers.) Sleumer

Sinónimos: *Pernettya palenae* Phil., *Pernettya philippii*

Gand., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC., *Arbutus*

phillyreifolia Pers., *Gaultheria florida* Phil., *Gaultheria*

myrtilloides Hook. & Arn., *Gaultheria phillyreifolia* (Pers.)

Sleumer var. *florida* (Phil.) Kausel, *Gaultheria lanceolata*

Phil., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *racemosa*

Phil. ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura.

Gaultheria poeppigii DC.

Sinónimos: *Gaultheria poeppigii* DC. var. *nana* (Sleumer)

D.J. Middleton, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud.

var. *myrtilloides*, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud.

var. *nana* (Sleumer) Sleumer, *Pernettya poeppigii* (DC.)

Klotzsch, *Gaultheria myrtilloides* Poepp. & Endl., nom.

illeg., *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *nana*

Sleumer, *Pernettya buxifolia* Phil., *Pernettya leucocarpa*

DC. var. *buxifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya phillyreifolia*

(Pers.) DC. var. *araucana* Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura, chal, cheúkk, gus, amain-ngush.

Gaultheria pumila (L.f.) D.J. Middleton var. ***leucocarpa***
(DC.) D.J. Middleton

Sinónimos: *Gaultheria pumila* (L.f.) D.J. Middleton var.

crassifolia (Phil.) D.J. Middleton, *Pernettya pumila* (L.f.)

Hook. var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya pumila*

(L.f.) Hook. var. *leucocarpa* (DC.) Kausel, *Pernettya*

breviflora Phil., *Pernettya crassifolia* Phil., *Pernettya*

empetrifolia (Lam.) Gaudich. var. *leucocarpa* (DC.) Wedd.,

Pernettya leucocarpa DC., *Pernettya trinervia* Gand.,

Pernettya leucocarpa DC. var. *gayana* DC., *Pernettya*

gayana (DC.) Decne.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 600-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gaultheria pumila (L.f.) D.J. Middleton var. ***pumila***

Sinónimos: *Pernettya pumila* (L.f.) Hook., *Arbutus pumila*

L.f., *Arbutus empetrifolia* Lam., *Pernettya empetrifolia*

(Lam.) Gaudich., *Pernettya pumila* (L.f.) Hook. var.

empetrifolia (Lam.) Hook.f.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,

LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chaura, chal, chan ámain.

Gaultheria racemulosa (DC.) D.J. Middleton

Sinónimos: *Pernettya rigida* (Bertero ex Colla) DC.,

Pernettya mucronata (L.f.) Gaudich. ex Spreng. var.

mutica Hook. & Arn., *Pernettya bridgesii* Phil., *Pernettya*

racemulosa DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

Nombre vulgar: Murtillo de Juan Fernández.

Gaultheria renjifoana Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

Gaultheria tenuifolia (Phil.) Sleumer

Sinónimos: *Pernettya elegans* Phil., *Pernettya reticulata*

Phil., *Pernettya tenuifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia*

(Phil.) Sleumer var. *elegans* (Phil.) Kausel, *Pernettya*

promaucana Phil., *Gaultheria elegans* (Phil.) Reiche,

Gaultheria salicifolia Phil., *Gaultheria tenuifolia* (Phil.)

Sleumer var. *promaucana* (Phil.) Kausel

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lebetanthus

Lebetanthus myrsinites (Lam.) Dusén

Sinónimos: *Prionotes americana* Hook., *Lebetanthus*

americanus (Hook.) Endl., *Jacquinotia myrsinites* Hombr.

& Jacq., *Jacquinotia prostrata* Hombr. & Jacq., *Jacquinotia*

volubilis Hombr. & Jacq., *Prionotes myrsinites* (Lam.)

Skotts.

Subarbusto epífita o terrestre. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

ESCALLONIACEAE

Escallonia

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. *alpina*

Sinónimos: *Escallonia araucana* Phil., *Escallonia fonckii* Phil., *Escallonia fonckii* Phil. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *glaberrima* Phil., *Escallonia sparsiflora* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. *carmelitana* (Meyen) Acevedo & Kausel

Sinónimos: *Escallonia carmelitana* Meyen, *Escallonia flavescens* C. Presl

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. *glabrata* (Phil.) Sleumer

Sinónimos: *Escallonia glabrata* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 600-2000 m.

Escallonia angustifolia C. Presl

Sinónimos: *Escallonia coquimbensis* J. Remy, *Escallonia angustifolia* C. Presl var. *coquimbensis* (J. Remy) Acevedo & Kausel, *Escallonia coquimbensis* J. Remy var. *salicifolia* Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, MAU.

Rango altitudinal: 0-3300 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Ñipa, q'ero.

Escallonia callcottiae Hook. & Arn.

Sinónimos: *Escallonia callcottiae* Hook. & Arn. var. *fernandeziana* (Phil.) Engl., *Escallonia rubricaulis* Colla, *Escallonia fernandeziana* Phil.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Escallonia florida Poepp. ex DC.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Nombre vulgar: Saucó cimarrón.

Escallonia gayana Acevedo & Kausel

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Escallonia illinita C. Presl var. *illinita*

Sinónimos: *Escallonia glandulosa* Lodd. non Sm., *Escallonia rubra* Bertero non Ruiz & Pav., *Escallonia grahamiana* Hook. & Arn., *Escallonia viscosa* Forbes

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Nombre vulgar: Corontillo, ñipa, barraco, siete camisas.

Escallonia illinita C. Presl var. *pubicalycina* Briq.

Sinónimos: *Escallonia illinita* C. Presl var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo & Kausel, *Escallonia stenopetala* Kunze, *Escallonia illinita* C. Presl var. *beta* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Escallonia leucantha J. Remy

Sinónimos: *Escallonia bellidifolia* Phil., *Escallonia pycnantha* Briq., *Escallonia modesta* Briq.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Luncillo, siete camisas.

Escallonia myrtoidea Bertero ex DC.

Sinónimos: *Escallonia arguta* C. Presl, *Escallonia reflexa* Gillies, *Escallonia andina* Phil., *Escallonia illinita* C. Presl var. *andina* (Phil.) Reiche, *Escallonia claudii* Killip, *Escallonia microcarpa* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Luncalun.

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabra* Engl.

Sinónimos: *Escallonia resinosa* auct. non Ruiz & Pav., *Escallonia berteriana* DC., *Escallonia resiniflua* Walp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteriana* (DC.) Pamp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *resiniflua* (Walp.) Pamp.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Corontillo, mardoño.

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***pulverulenta***

Sinónimos: *Stereoxylon pulverulentum* Ruiz & Pav., *Escallonia spinulosa* Kunth ex Engl., nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Corontillo, mardoño.

Escallonia revoluta (Ruiz & Pav.) Pers.

Sinónimos: *Stereoxylon revolutum* Ruiz & Pav., *Escallonia thyrsoides* Bertero, nom. nud., *Escallonia hirsuta* C. Presl, *Escallonia affinis* Rupr. ex A. Gray, nom. nud.

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Nombre vulgar: Lun, siete camisas.

Escallonia rosea Griseb.

Sinónimos: *Escallonia pterocladon* Hook., *Escallonia rupestris* Phil., *Escallonia chonotica* Phil., *Escallonia montana* Phil., *Escallonia longidens* Phil., *Escallonia rosea* Griseb. var. *rupestris* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Siete camisas, siete camisas colorado.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***dumetorum*** (Phil.) Acevedo & Kausel

Sinónimos: *Escallonia berberifolia* auct. non (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Escallonia dumetorum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***glutinosa*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Escallonia glutinosa* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-2100 m.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***macrantha*** (Hook. & Arn.) Reiche

Sinónimos: *Escallonia macrantha* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***rubra***

Sinónimos: *Stereoxylon rubrum* Ruiz & Pav., *Escallonia poeppigiana* DC., *Escallonia poeppigiana* DC. var. *longifolia* DC., *Escallonia punctata* DC., *Escallonia duplicato-serrata* J. Remy, *Escallonia littoralis* Phil., *Escallonia littoralis* Phil. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia concinna* Phil., *Escallonia macrantha* Hook. & Arn. var. *duplicato-serrata* (J. Remy) Engl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *punctata* (DC.) Hook.f., *Escallonia rahmeri* Phil., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabriuscula* Hook. & Arn., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *uniflora* Poepp. & Endl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *multiflora* Poepp. & Endl., *Escallonia commutata* Regel

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ñipa, siete camisas colorado, möki, müki.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. ***thalassica*** Kausel

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Escallonia serrata Sm.

Sinónimos: *Celastrus venustus* Banks & Sol. ex Hook.f., *Stereoxylon serratum* (Sm.) Poir.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.

Sinónimos: *Stereoxylon virgatum* Ruiz & Pav., *Escallonia stricta* J. Remy, *Escallonia patagonica* Gand., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *philippiana* Engl., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pavoniana* Pamp., *Escallonia philippiana* (Engl.) Mast., *Escallonia stenophylla* Phil., *Escallonia angustifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mata negra, meki.

Tribeles

Tribeles australis Phil.

Sinónimos: *Chalepoa magellanica* Hook.f., *Tribeles philippii* Macloskie

Subarbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Valdivia

Valdivia gayana J. Remy
Sinónimos: *Valdivia gayana* Remy var. *hollermayeri* Gunckel, *Valdivia gayana* Remy var. *robusta* Gunckel
Subarbusto. Endémico.
Distribución: LRI.
Rango altitudinal: 0-300 m.

EUPHORBIACEAE

Adenopeltis

Adenopeltis serrata (W.T. Aiton) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Excoecaria marginata* (Baill.) Griseb., *Adenopeltis colliguaya* Bertero ex A. Juss., *Excoecaria serrata* W.T. Aiton, *Excoecaria colliguaya* (Bertero ex A. Juss.) Baill., *Stillingia glandulosa* Dombey ex Baill.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Nombre vulgar: Colliguay macho, lechón.

Avellanita

Avellanita bustillosii Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 300-800 m.
Nombre vulgar: Avellanita.

Chiropetalum

Chiropetalum berterianum Schltld. var. *berterianum*
Sinónimos: *Argythamnia berteriana* (Schltld.) Müll. Arg., *Chiropetalum berterianum* Schltld. fma. *macrantha* Skotts.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 200-1800 m.

Chiropetalum berterianum Schltld. var. *psiladenium* Skotts.
Sinónimos: *Argythamnia berteriana* (Schltld.) Müll. Arg. var. *psiladenia* (Skotts.) J.W. Ingram
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 600 m.

Chiropetalum canescens Phil.

Sinónimos: *Argythamnia canescens* (Phil.) F. Phil., *Argythamnia sponiella* Müll. Arg., *Chiropetalum gigouxii* Espinosa, *Chiropetalum sponiella* (Müll. Arg.) Pax
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Chiropetalum cremnophilum I.M. Johnst.

Sinónimos: *Argythamnia cremnophila* (I.M. Johnst.) J.W. Ingram
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 200 m.

Chiropetalum tricuspdatum (Lam.) A. Juss.

Sinónimos: *Croton tricuspdatum* Lam., *Argythamnia tricuspdata* (Lam.) Müll. Arg. var. *lanceolata* (Cav.) Müll. Arg., *Chiropetalum lanceolatum* (Cav.) A. Juss., *Croton lanceolatum* Cav., *Chiropetalum tricuspdatum* (Lam.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Cav.) Pax & K. Hoffm., *Chiropetalum ovatum* Phil., *Argythamnia tricuspdata* (Lam.) Müll. Arg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ventosilla.

Colliguaja

Colliguaja dombeyana A. Juss.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Nombre vulgar: Colliguay.

Colliguaja integerrima Gillies & Hook.

Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Colliguay.

Colliguaja odorifera Molina

Sinónimos: *Colliguaja triquetra* Gillies & Hook., *Colliguaja obtusa* Regel, *Croton colliguay* Molina
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Nombre vulgar: Colliguay.

Colliguaja salicifolia Gillies & Hook.

Sinónimos: *Colliguaja dombeyana* Gay, nom. illeg.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 200-1800 m.
Nombre vulgar: Colliguay.

Croton

Croton chilensis Müll. Arg.

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 300-800 m.
Nombre vulgar: Higuerrilla.

Croton setiger Hook

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO.

Dysopsis

Dysopsis glechomoides (A. Rich.) Müll. Arg.

Sinónimos: *Hydrocotyle glechomoides* A. Rich., *Dysopsis gayana* Baill., *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., *Molina chilensis* Gay
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Dysopsis hirsuta (Müll. Arg.) Skottsbo.

Sinónimos: *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *hirsuta* Müll. Arg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.

Euphorbia

Euphorbia amandi Oudejans

Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *dentata* R.E. Fr.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: J'alpa.

Euphorbia araucana Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.

Euphorbia besseri (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Sinónimos: *Anisophyllum besseri* Klotzsch & Garcke
Hierba. Perenne. Endémica.

Nota: Distribución desconocida.

Euphorbia collina Phil. var. *andina* (Phil.) Subils

Sinónimos: *Euphorbia andina* Phil., *Euphorbia dasyclada* Dusén, *Euphorbia portulacoides* L. var. *andensis* Croizat
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia collina Phil. var. *collina*

Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *collina* (Phil.) Croizat
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.
Rango altitudinal: 0-3100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia collina Phil. var. *minor* (Hicken) Subils

Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. var. *minor* Hicken
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia collina Phil. var. *spathulata* (Chodat & Wilczek) Subils

Sinónimos: *Euphorbia portulacoides* L. var. *spathulata* Chodat & Wilczek
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia copiapina Phil.

Sinónimos: *Euphorbia calderensis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.

Euphorbia cyathophora Murray

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT.

Euphorbia elquiensis Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.

Euphorbia engelmannii Boiss.

Sinónimos: *Euphorbia rotundifolia* Hook. & Arn., nom. illeg., *Euphorbia hortensis* Engelm. ex Boiss., nom. nud., *Euphorbia engelmannii* Boiss. var. *depressa* Boiss., *Euphorbia inclinata* Boiss., nom. nud., *Chamaesaracha engelmannii* (Boiss.) Soják

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 900-2000 m.

***Euphorbia falcata* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME.

***Euphorbia germainii* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 1600-3200 m.

***Euphorbia helioscopia* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LLA.

***Euphorbia hirta* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, IPA.

***Euphorbia hypericifolia* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, IPA.

***Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *argentina* (Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans**

Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *argentina* Müll. Arg. ex Griseb.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *klotzschii

Sinónimos: *Anisophyllum ovalifolium* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Croizat
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

***Euphorbia klotzschii* Oudejans var. *schizosepala* (Engelm. ex Boiss.) Oudejans**

Sinónimos: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *schizosepala* Engelm. ex Boiss.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

***Euphorbia lactiflua* Phil.**

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Lechero.

***Euphorbia lathyris* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

***Euphorbia macraulonia* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

***Euphorbia maculata* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

***Euphorbia meyeniana* Klotzsch**

Sinónimos: *Chamaesyce meyeniana* (Klotzsch) Croizat
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Bolivia.

***Euphorbia ovalleana* Phil.**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

***Euphorbia peplus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

***Euphorbia philippiana* (Klotzsch & Garcke) Boiss.**

Sinónimos: *Tithymalus philippianus* Klotzsch & Garcke
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: BIO.

***Euphorbia platyphyllos* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

***Euphorbia porphyrantha* Phil.**

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Países limítrofes: Perú.

***Euphorbia portulacoides* L.**

Sinónimos: *Euphorbia chilensis* Gay, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *normalis* (Kuntze) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *normalis* Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Euphorbia raphilippii Oudejans

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Euphorbia serpens Kunth

Sinónimos: *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU,
NUB, BIO, ARA, IPA.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Pato (Rapa Nui).
Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

Euphorbia tarapacana Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 100-1300 m.

Euphorbia terracina L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL.

Euphorbia thinophila Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Euphorbia verna Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Ficus

Ficus carica L.

Árbol. Introducido.
Distribución: ANT, JFE.
Nombre vulgar: Higuera.

Mercurialis

Mercurialis annua L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, VAL.

Ricinus

Ricinus communis L.

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO,
LLA, JFE, IPA.

FABACEAE

Acacia

Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: AYP, TAR.

Acacia caven (Molina) Molina

Sinónimos: *Acacia cavenia* (Molina) Hook. & Arn., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. fma. *cavenia* (Molina) E.C. Clos, *Mimosa cavenia* Molina, *Mimosa caven* Molina, *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger, *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger var. *caven* (Molina) Molina, *Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger var. *dehiscens* Ciald., *Acacia caven* (Molina) Molina var. *dehiscens* Burkart ex Ciald.

Árbol. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Espino.

Acacia dealbata Link

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Aromo.

Acacia horrida (L.) Willd.

Árbol. Introducido.

Distribución: ATA, RME.

Acacia karroo Hayne

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: TAR, RME.

Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Acacia melanoxylon R. Br.

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Aromo australiano.

***Acacia paradoxa* DC.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL.

***Acacia visco* Lorentz ex Griseb.**

Sinónimos: *Acacia concinna* Phil., hom. illeg.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Adesmia

***Adesmia aegiceras* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia glanduligera* I.M. Johnst., *Adesmia remyana* Phil., *Adesmia subumbellata* Phil., *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *remyana* (Phil.) Burkart, *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *robustior* Hook. & Arn., *Patagonium aegiceras* (Phil.) Kuntze, *Patagonium aegiceras* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *remyanum* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra, jarilla.

***Adesmia aphylla* Clos**

Sinónimos: *Patagonium aphyllum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1800-3000 m.

Nombre vulgar: Panza de burro.

***Adesmia arachnipes* Clos**

Sinónimos: *Adesmia oresigena* Phil., *Patagonium arachnipes* (Clos) Kuntze, *Patagonium oresigenum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1600-3500 m.

***Adesmia araucana* Phil.**

Sinónimos: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

***Adesmia argentea* Meyen**

Sinónimos: *Adesmia cinerea* Clos, *Patagonium argenteum*

(Meyen) Kuntze, *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Nombre vulgar: Jarilla, varilla blanca, varilla mansa.

***Adesmia argyrophylla* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia kingii* Phil., *Adesmia sessiliflora* Phil., *Adesmia furcata* Phil., *Adesmia divaricata* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Patagonium argyrophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium kingii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sessiliflorum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-2800 m.

***Adesmia aromatica* Burkart**

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1100-1300 m.

***Adesmia aspera* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Patagonium asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia atacamensis* Phil.**

Sinónimos: *Adesmia glandulosa* Phil., *Patagonium atacamense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glandulosum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Nombre vulgar: Allaval, jarilla, pasto de huanaco.

***Adesmia aurantiaca* (Dusén) Burkart**

Sinónimos: *Adesmia pumila* Hook.f. var. *aurantiaca* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Adesmia balsamica* Bertero ex Colla**

Sinónimos: *Patagonium balsamicum* (Bertero ex Colla) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Jarilla.

Adesmia bedwellii Skottsbo.

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 200-700 m.
Nombre vulgar: Varilla brava.

Adesmia bicolor (Poir.) DC.

Sinónimos: *Hedysarum bicolorum* Poir., *Hedysarum pendulum* Poir., *Adesmia glabriuscula* Vogel, *Adesmia pendula* Poir., *Adesmia radicans* Clos, *Patagonium glabriusculum* (Vogel) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze, *Patagonium bicolor* (Poir.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia bijuga Phil.

Sinónimos: *Patagonium bijugum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU.

Adesmia boronioides Hook.f.

Sinónimos: *Patagonium boronioides* (Hook.f.) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Paramela.

Adesmia brachysemeon Phil.

Sinónimos: *Patagonium bracteatum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-2200 m.

Adesmia bracteata Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1200-2600 m.

Adesmia brevixillata Burkart

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Adesmia burkartii M.N. Correa

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1200-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia calycicomosa Burkart

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1100-1400 m.

Adesmia capitellata (Clos) Hauman

Sinónimos: *Adesmia oligophylla* Phil., *Lotus capitellatus* Clos, *Patagonium oligophyllum* (Phil.) Kuntze, *Hosackia capitellata* (Clos) Brand
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2300-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia colinensis (Phil. ex Reiche) Martic.

Sinónimos: *Patagonium colinense* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Adesmia concinna Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-1400 m.

Adesmia conferta Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia brachycarpa* Phil., *Adesmia izquierdi* Phil. ex Reiche, *Adesmia stipulacea* Clos, *Adesmia venosa* Phil., *Patagonium brachycarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium stipulaceum* (Clos) Kuntze, *Patagonium venosum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 100-1800 m.

Adesmia confusa Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium arboreum* (Bertero ex Clos) Kuntze, *Adesmia arborea* Bertero ex Clos, hom. illeg., *Adesmia berteroniana* Steud., nom. nud.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Nombre vulgar: Palhuén, espinillo, varilla brava.

Adesmia coquimbensis Burkart

Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1900 m.

Adesmia coronilloides Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia codonocalyx* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia germainii* Phil., *Adesmia glauca* Phil., *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium germainii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium germainii* (Phil.) Reiche, comb. illeg.,

Patagonium coronilloides (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
var. *glaucum* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium
glaucum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU.
Rango altitudinal: 2200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia corymbosa Clos
Sinónimos: *Adesmia palenae* Phil., *Adesmia fernandezii*
Phil., *Adesmia tenuis* Phil., *Adesmia vallis-pulchrae* Phil.,
nom. nud., *Patagonium vallis-pulchrae* Reiche, *Patagonium
corymbosum* (Clos) Kuntze, *Patagonium palenae* (Phil.)
Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 200-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia cuneata Meyen ex Vogel
Sinónimos: *Patagonium cuneatum* (Meyen ex Vogel)
Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 2100-2800 m.

Adesmia curvifolia Clos
Sinónimos: *Patagonium curvifolium* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Adesmia darapskyana (Phil. ex Reiche) Martic.
Sinónimos: *Patagonium darapskyanum* Phil. ex Reiche
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2300-2800 m.

Adesmia davilae Phil.
Sinónimos: *Patagonium davilae* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000 m.

Adesmia denticulata Clos
Sinónimos: *Patagonium denticulatum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1600 m.

Adesmia denudata Phil.
Sinónimos: *Patagonium denudatum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2300 m.

Adesmia dessaueri (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Sinónimos: *Patagonium dessaueri* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, LBO.

Adesmia dichotoma Clos
Sinónimos: *Patagonium dichotomum* (Clos) Kuntze,
Patagonium cinereum (Clos) Kuntze var. *dichotomum*
(Clos) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 900-2800 m.

Adesmia disperma Phil.
Sinónimos: *Patagonium disperpum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Adesmia dumosa Phil.
Sinónimos: *Patagonium dumosum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, RME.

Adesmia echinus C. Presl
Sinónimos: *Adesmia gayana* Phil., *Patagonium echinus* (C.
Presl) Kuntze, *Patagonium gayanum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.
Rango altitudinal: 2800-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia elata Clos
Sinónimos: *Patagonium elatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium
leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elatum* (Clos)
Reiche, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze
var. *macrostachyum* Phil. ex Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
AIS.
Rango altitudinal: 700-1300 m.

Adesmia elegans Clos
Sinónimos: *Patagonium elegans* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.

Adesmia emarginata Clos
Sinónimos: *Patagonium emarginatum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 200-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Paramela, paramilla.

Adesmia eremophila Phil.

Sinónimos: *Adesmia latistipula* Phil. ex Reiche, *Patagonium eremophilum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium latistipula* Phil. ex Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Adesmia erinacea Phil.

Sinónimos: *Adesmia senticula* Phil., *Patagonium erinaceum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium erinaceum* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Patagonium senticulum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA, MAU.
Rango altitudinal: 2500-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia exilis Clos

Sinónimos: *Adesmia berteroi* Phil. ex Kuntze, nom. nud., *Adesmia decumbens* Phil., *Adesmia decumbens* Phil. var. *berteroi* Phil. ex G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia humifusa* Phil., *Adesmia valdesia* Clos, *Patagonium decumbens* (Phil.) Kuntze, *Adesmia inconspicua* Phil., *Patagonium exile* (Clos) Kuntze, *Patagonium inconspicuum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium valdesium* (Clos) Kuntze, *Patagonium humifusum* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1400-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia filicaulis Phil.

Sinónimos: *Patagonium filicaule* (Phil.) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze var. *filicaule* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB, ARA.
Rango altitudinal: 500-1500 m.

Adesmia filifolia Clos

Sinónimos: *Patagonium filifolium* (Clos) Kuntze
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Adesmia frigida Phil.

Sinónimos: *Adesmia adenophora* Phil., *Patagonium frigidum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium adenophorum* (Phil.) Reiche
Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1900-4500 m.

Adesmia fuentesii G.F. Grandjot

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.

Adesmia glaucescens Phil.

Sinónimos: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze var. *glaucescens* (Phil.) Reiche, *Patagonium glaucescens* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Adesmia glomerula Clos var. *australior* Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1700-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia glomerula Clos var. *glomerula*

Sinónimos: *Adesmia compacta* Phil., *Adesmia humilis* Phil., *Patagonium compactum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glomerulum* (Clos) Kuntze, *Patagonium humile* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia glutinosa Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium glutinosum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 700-3000 m.

Adesmia godoyae (Phil. ex Reiche) Martic.

Sinónimos: *Patagonium godoyae* Phil. ex Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, RME.
Rango altitudinal: 700-1000 m.

Adesmia gracilis Meyen ex Vogel

Sinónimos: *Patagonium gracile* (Meyen ex Vogel) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, RME, MAU.
Rango altitudinal: 200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia gracillima I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, RME.

Adesmia hemisphaerica Hauman

Subarbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, COQ, RME.

Rango altitudinal: 3200-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia hirsuta Phil.

Sinónimos: *Patagonium hirsutum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.

Adesmia horrida Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia leucopogon* Phil., *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium leucopogon* (Phil.) Kuntze, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *minor* Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2800-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

Adesmia hystrix Phil.

Sinónimos: *Adesmia sentis* Phil., *Adesmia villanuevae* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium hystrix* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sentis* (Phil.) Reiche, *Patagonium villanuevae* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-4100 m.

Adesmia jilesiana Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 3000-4200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia lanata Hook.f.

Sinónimos: *Patagonium lanatum* (Hook.f.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, MAG.

Rango altitudinal: 100-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia landbecki Phil.

Sinónimos: *Patagonium landbecki* (Phil.) Kuntze, *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze var. *landbeckii* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Adesmia laxa Clos

Sinónimos: *Patagonium laxum* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Adesmia leiocarpa Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia psilocarpa* Phil., *Patagonium psilocarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Adesmia littoralis Burkart

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Adesmia longipes Phil.

Sinónimos: *Patagonium longipes* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1300-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia longiseta DC.

Sinónimos: *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, ARA.

Rango altitudinal: 2000-3200 m.

Adesmia lotoides Hook.f.

Sinónimos: *Adesmia lotoides* Hook.f. var. *vaginata* Hook.f., *Adesmia unifoliolata* Skotts., *Patagonium lotoides* (Hook.f.) Kuntze, *Patagonium lotoides* (Hook.f.) Reiche, comb. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia loudonia Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Adesmia medinae (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium medinae* (Phil. ex Reiche) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Adesmia melanocaulos Phil.

Sinónimos: *Adesmia diaziana* I.M. Johnst., *Patagonium melanocaulon* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Adesmia melanthes Phil.

Sinónimos: *Patagonium melanthes* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3700-4200 m.

Países limítrofes: Perú.

Adesmia micrantha Phil.

Sinónimos: *Patagonium micranthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *micranthum* (Phil.) Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Adesmia microcalyx Phil. var. *calvescens* Burkart

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Adesmia microcalyx Phil. var. *microcalyx*

Sinónimos: *Patagonium microcalyx* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Adesmia microphylla Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia spinosa* A. Lesson, *Patagonium microphyllum* (Hook. & Arn.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Palhuén.

Adesmia minor (Hook. & Arn.) Burkart var. *caespitosa* (Phil.) Ulibarri & Burkart

Sinónimos: *Adesmia caespitosa* Phil., *Patagonium caespitosum* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 3800-4400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

Adesmia monosperma Clos

Sinónimos: *Adesmia calycosa* Phil., *Patagonium monospermum* (Clos) Kuntze, *Patagonium calycosum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-2600 m.

Adesmia montana Phil.

Sinónimos: *Patagonium montanum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2100-2800 m.

Adesmia mucronata Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia closii* Phil., *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium closii* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Adesmia multicuspis Clos

Sinónimos: *Adesmia oxalidophylla* Phil., *Adesmia melanocarpa* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium multicuspe* (Clos) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze var. *melanocarpum* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1100-2300 m.

Adesmia obcordata Clos

Sinónimos: *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obcordatum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia obovata Clos

Sinónimos: *Adesmia leptacantha* Phil., *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium leptacanthum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, AIS.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cuerno de cabra, jarilla.

Adesmia obscura Clos

Sinónimos: *Adesmia graveolens* Phil., *Adesmia villosa* Phil., hom. illeg., *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze, *Patagonium graveolens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze var. *graveolens* (Phil.) Reiche, *Patagonium villosum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 2000-3400 m.

Adesmia occulta (R.E. Fr.) Burkart

Sinónimos: *Patagonium occultum* R.E. Fr.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3000-4400 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Adesmia odontophylla Phil.

Sinónimos: *Patagonium odontophyllum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Adesmia ovalensis Ulibarri

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 200-300 m.

Adesmia papposa (Lag.) DC. var. ***papposa***

Sinónimos: *Adesmia arvensis* Phil., *Adesmia chillanensis* Phil., *Adesmia elongata* Phil., *Aeschynomene papposa* Lag., *Patagonium papposum* (Lag.) Kuntze, *Patagonium chillanense* (Phil.) Reiche, *Patagonium arvense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium elongatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elongatum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia papposa (Lag.) DC. var. ***radicifolia*** (Clos) M.N.

Correa

Sinónimos: *Adesmia radicifolia* Clos, *Patagonium radicifolium* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia parviflora Clos

Sinónimos: *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *diffusum* Bertero ex Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Adesmia parvifolia Phil.

Sinónimos: *Adesmia axillaris* Phil., *Adesmia parvifolia* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche var. *axillare* (Phil.) Reiche, *Patagonium axillare* (Phil.) Kuntze, *Patagonium lanatum* (Hook.f.) Kuntze var.

axillaris (Phil.) Speg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia pauciflora Vogel

Sinónimos: *Patagonium pauciflorum* (Vogel) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Adesmia pearcei Phil.

Sinónimos: *Patagonium pearcei* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO.

Adesmia pedicellata Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia genistoides* C. Presl, *Adesmia ulicina* C. Presl, *Adesmia calopogon* Phil., *Adesmia deserticola* Phil., *Patagonium pedicellatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium deserticum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Reiche, comb. illeg., *Patagonium ulicinum* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium calopogon* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Adesmia pentaphylla Phil.

Sinónimos: *Patagonium pentaphyllum* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2200-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Adesmia peraltae (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium peraltae* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Nombre vulgar: Varilla.

Adesmia phylloidea Clos

Sinónimos: *Adesmia virgata* Bertero ex Steud., nom. nud., *Patagonium phylloideum* (Clos) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 100-1400 m.

Adesmia pinifolia Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium pinifolium* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1500-3700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Leña amarilla.

Adesmia pirionii I.M. Johnst.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 100-900 m.

Adesmia polyphylla Phil.
Sinónimos: *Patagonium polyphyllum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4500 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Adesmia propinqua Clos
Sinónimos: *Adesmia dendroides* Phil., *Patagonium propinquum* (Clos) Kuntze, *Patagonium dendroides* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 100-1500 m.

Adesmia prostrata Clos var. *eglandulosa* Burkart
Sinónimos: *Adesmia coluteoides* Phil., *Patagonium coluteoides* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 500-1500 m.

Adesmia prostrata Clos var. *prostrata*
Sinónimos: *Patagonium prostratum* (Clos) Kuntze, *Adesmia meyeniana* Phil., *Patagonium meyenianum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Adesmia pumila Hook.f.
Sinónimos: *Patagonium pumilum* (Hook.f.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia pungens Clos
Sinónimos: *Adesmia intricata* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium intricatum* Phil., *Patagonium pungens* (Clos) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2100 m.

Adesmia pusilla Phil.
Sinónimos: *Patagonium pusillum* (Phil.) Kuntze

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Adesmia quadripinnata (Hicken) Burkart
Sinónimos: *Adesmia oligophylla* Phil. var. *quadripinnata* Hicken
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 800-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia rahmeri Phil.
Sinónimos: *Patagonium rahmeri* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2600-4400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia ramosissima Phil.
Sinónimos: *Patagonium ramosissimum* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, LBO.
Rango altitudinal: 500-1000 m.

Adesmia reclinata Muñoz
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Lentejilla.

Adesmia renjifoana (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Sinónimos: *Adesmia renjifoana* Phil., nom. nud., *Patagonium renjifoanum* Phil. ex Reiche
Arbusto. Nativo.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 1500-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia resinosa (Phil. ex Reiche) Martic.
Sinónimos: *Patagonium resinosum* Phil. ex Reiche
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1700-2000 m.

Adesmia retusa Griseb.
Sinónimos: *Adesmia grisebachii* Phil., *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze var. *grisebachii* (Phil.) Reiche, *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia rubroviridis Burkart

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2200-2600 m.

Adesmia salicornioides Speg.

Sinónimos: *Patagonium salicornioides* (Speg.) Speg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia sandwithii Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia schneideri Phil.

Sinónimos: *Adesmia rigida* Skottsbl., *Patagonium schneideri* (Phil.) Kuntze, *Patagonium schneideri* (Phil.) Reiche, comb. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, RME, LBO.
Rango altitudinal: 200-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia spinosissima Meyen

Sinónimos: *Adesmia rupicola* Wedd., *Patagonium spinosissimum* (Meyen) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2700-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Adesmia spuma Werderm. ex Burkart

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia subterranea Clos

Sinónimos: *Patagonium subterraneum* (Clos) Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1200-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cuerno de cabra.

Adesmia tenella Hook. & Arn. var. *macrocarpa* Ulibarri

Sinónimos: *Patagonium angustifolium* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.

Adesmia tenella Hook. & Arn. var. *misera* (Phil.) Skottsbl.

Sinónimos: *Adesmia smithiae* DC. var. *misera* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Adesmia tenella Hook. & Arn. var. *tenella*

Sinónimos: *Adesmia angustifolia* Hook. & Arn., *Adesmia vesicaria* Bertero ex Colla, *Adesmia parvula* Phil., *Adesmia tenuicaulis* Phil., *Patagonium parvulum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium tenuicaule* (Phil.) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Kuntze, comb. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Adesmia tomentosa Meyen

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, MAU.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Adesmia torcaea Phil.

Sinónimos: *Patagonium torcaeum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 200-3200 m.

Adesmia trifoliata Phil.

Sinónimos: *Adesmia philippiana* (Hosseus) Burkart, *Patagonium philippianum* Hosseus, *Patagonium triphyllum* Speg., *Patagonium trifoliatum* (Phil.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000 m.

Adesmia trifoliolata Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium trifoliolatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 200-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia uspallatensis Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Patagonium uspallatense* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1900-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia verrucosa Meyen

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 1700-3600 m.
Países limítrofes: Perú.

Adesmia villosa Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia viscida Bertero ex Colla

Sinónimos: *Adesmia aprica* Phil., *Adesmia simonsi* Phil., *Patagonium apricum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Patagonium simonsii* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.

Adesmia viscidissima I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 700-800 m.

Adesmia viscosa Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Adesmia pulchra* Phil., *Patagonium pulchrum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium viscosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, ARA.
Rango altitudinal: 300-800 m.

Adesmia volckmannii Phil.

Sinónimos: *Patagonium campestre* Rendle, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Kuntze, *Adesmia quadrijuga* Phil., *Patagonium quadrijugum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Reiche, comb. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Adesmia zoellneri Ulibarri

Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.

Albizia

Albizia lophantha (Willd.) Benth.

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, JFE.

Anarthrophyllum

Anarthrophyllum andicolum (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Anarthrophyllum andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil. var. *bridgesii* Chodat & Wilcz., *Anarthrophyllum juniperinum* (Meyen) F. Phil., *Genista andicola* Gillies ex Hook. & Arn., *Genista juniperina* Meyen
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Nombre vulgar: Pichi-romero.

Anarthrophyllum cumingii (Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Genista cumingii* Hook. & Arn., *Anarthrophyllum cumingii* (Hook. & Arn.) F. Phil. var. *angustifolia* Chodat & Wilcz.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1800-3000 m.

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. ***desideratum***

Sinónimos: *Genista desiderata* DC., *Anarthrophyllum desideratum* Neger, nom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. ***morenonis*** (Kuntze) Speg.

Sinónimos: *Anarthrophyllum morenonis* Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anarthrophyllum elegans (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Genista elegans* Gillies ex Hook. & Arn., *Anarthrophyllum pungens* Chodat
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anarthrophyllum gayanum (A. Gray) B.D. Jacks.

Sinónimos: *Genista gayana* A. Gray, *Genista umbellata* Clos, *Anarthrophyllum umbellatum* (Clos) F. Phil.
Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 2000-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Anarthrophyllum rigidum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.

Sinónimos: *Genista rigida* Gillies ex Hook. & Arn., *Anarthrophyllum brevistipula* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, MAG.
Rango altitudinal: 200-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus

Astragalus amatus Clos

Sinónimos: *Astragalus procumbens* Hook. & Arn., *Phaca tricolor* Clos, *Astragalus tricolor* (Clos) Reiche, *Astragalus ferrugineus* Clos, *Astragalus leucomallus* Phil., *Phaca brachyptera* Phil., *Astragalus brachypterus* (Phil.) Reiche, *Astragalus litoreus* Phil., *Tragacantha breviaolata* Kuntze, *Astragalus subandinus* Speg., *Astragalus chilensis* E. Sheld.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2-2600 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Astragalus arequipensis Vogel

Sinónimos: *Astragalus bolivianus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 450-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Astragalus arnottianus (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche

Sinónimos: *Phaca arnottiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca uspallatensis* Phil., *Phaca reedi* Phil., *Astragalus reedii* (Phil.) Hauman, *Phaca nana* Phil., *Astragalus nanus* (Phil.) Reiche, *Astragalus philippi* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1620-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus bellus (Kuntze) R.E. Fr.

Sinónimos: *Phaca pulchella* Clos, *Astragalus pulchellus* (Clos) Reiche, *Tragacantha bella* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus berteri Colla

Sinónimos: *Astragalus prostratus* Hook. & Arn., *Astragalus*

alberjilla Steud., *Phaca grata* Clos, *Astragalus gratus* (Clos) Reiche, *Astragalus filifolius* Clos, *Astragalus elongatus* (Phil.) Reiche, *Phaca concinna* Phil., *Astragalus concinnus* (Phil.) Reiche, *Astragalus cauquenensis* Phil., *Astragalus pencanus* Phil., *Tragacantha longior* Kuntze, *Astragalus rhudolphi* Speg., *Phaca elongata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Astragalus berterianus (Moris) Reiche

Sinónimos: *Phaca berteriana* Moris, *Phaca canescens* Hook. & Arn., *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus oblongifolius* Clos, *Astragalus sphaerocarpus* Clos, *Astragalus placens* Clos var. *oblongifolius* (Clos) Reiche, *Phaca laxiflora* Phil., *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche, *Phaca dolichostachya* Phil., *Astragalus dolichostachys* (Phil.) Reiche, *Phaca dissitiflora* Phil., *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche var. *dissitiflora* (Phil.) Reiche, *Astragalus aconcaguensis* Speg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-3000 m.

Astragalus bustillosii Clos

Sinónimos: *Phaca depauperata* Phil., *Astragalus depauperatus* (Phil.) Reiche, *Phaca saxifraga* Phil., *Astragalus brachycalyx* Phil., *Tragacantha atacamensis* Kuntze, *Astragalus atacamensis* (Kuntze) R.E. Fr., *Astragalus tarapacanus* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1900-4870 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Garbanzo silvestre.

Astragalus cachinalensis Phil.

Sinónimos: *Tragacantha cachinalensis* (Phil.) Kuntze
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 800-800 m.

Astragalus chamissonis (Vogel) Reiche

Sinónimos: *Phaca chamissonis* Vogel, *Phaca ochroleuca* Hook. & Arn., *Astragalus ochroleucus* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus ovalensis* Clos, *Astragalus chilensis* (Nees) Reiche, hom. illeg., *Astragalus placens* Clos, *Astragalus volckmannii* Phil., *Astragalus araucanus* (F. Phil.) Reiche, *Astragalus monospermus* Phil., *Astragalus laetevirens* Phil., *Phaca chilensis* Nees, *Phaca araucana* F. Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 10-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba loca.

Astragalus confinis I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Países limítrofes: Perú.

Astragalus coquimbensis (Hook. & Arn.) Reiche
Sinónimos: *Phaca coquimbensis* Hook. & Arn., *Astragalus vasticola* I.M. Johnst., *Phaca carrizalensis* Phil., *Phaca atacamensis* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-510 m.

Astragalus cruckshanksii (Hook. & Arn.) Griseb.
Sinónimos: *Phaca cruckshanksii* Hook. & Arn., *Astragalus amunategui* Phil., *Tragacantha cruckshanksii* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kuntze, *Astragalus landbecki* (Phil.) Reiche, *Phaca landbecki* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1200-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus cryptanthus Wedd.
Sinónimos: *Phaca clandestina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3850-4150 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Astragalus cryptobotrys I.M. Johnst.
Sinónimos: *Phaca cryptantha* Phil., *Astragalus clandestinus* (Phil.) Hieron.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3815-4550 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus curvicaulis (Clos) Reiche
Sinónimos: *Phaca curvicaulis* Clos, *Astragalus elatus* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. illeg., *Phaca elata* Hook. & Arn., *Tragacantha curvicaulis* (Clos) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1900-2800 m.
Nombre vulgar: Hierba loca.

Astragalus darumbium (Bertero ex Colla) Clos
Sinónimos: *Sutherlandia darumbium* Bertero ex Colla, *Phaca macrophysa* Phil., *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche,

Phaca robusta Phil., *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche var. *robustus* (Phil.) Reiche, *Tragacantha firma* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 900-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus diminutivus (Phil.) Gómez-Sosa
Sinónimos: *Astragalus deminutivus* I.M. Johnst., *Phaca diminutiva* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Astragalus dodtii Phil.
Sinónimos: *Astragalus rengifoii* Phil., *Astragalus melanogonatus* I.M. Johnst., *Tragacantha dodtii* (Phil.) Kuntze
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Astragalus domeykoanus (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Phaca domeykoana* Phil., *Phaca orites* Phil., *Astragalus orites* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1380-1380 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus edmonstonei (Hook.) B.L. Rob.
Sinónimos: *Phaca edmonstonei* Hook., *Astragalus flavus* (Hook. & Arn.) E. Sheld., *Astragalus chrysanthus* (Moris) Reiche, nom. illeg., *Phaca flava* Hook. & Arn., *Phaca chrysantha* Moris, *Astragalus affinis* Steud., *Phaca podocarpa* Phil., *Phaca acutidens* Phil., *Astragalus hohenacheri* Spæg., *Tragacantha flava* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Tragacantha chrysantha* (Moris) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 5-200 m.
Nombre vulgar: Hierba loca.

Astragalus germainii Phil.
Sinónimos: *Astragalus segethi* Phil., *Astragalus dilectus* Phil., *Astragalus closianus* Phil., *Astragalus dessaueri* Phil., *Astragalus alfalfalis* Phil., *Astragalus azureus* Phil. ex Reiche, *Astragalus germaini* Phil. var. *azureus* Phil. ex Fr., *Tragacantha germaini* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha closiana* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha dilecta* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha segethii* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2200-2950 m.

Astragalus johnstonii Gómez-Sosa

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1250-1350 m.

Astragalus limariensis Muñoz

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 0-3960 m.
Nombre vulgar: Tetilla.

Astragalus looseri I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus magellanicus Gómez-Sosa

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 250-250 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus maulensis Speg.

Sinónimos: *Phaca brachytopis* Phil., hom. illeg.,
Astragalus brachytopis (Phil.) Reiche, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Astragalus micranthellus Wedd.

Sinónimos: *Tragacantha micranthella* (Wedd.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-4250 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Astragalus minimus Vogel

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4300-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Astragalus minutissimus Wedd.

Sinónimos: *Tragacantha minutissima* (Wedd.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3720-4400 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Astragalus monteroi I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA.
Rango altitudinal: 1-3 m.

Astragalus monticola Phil.

Sinónimos: *Astragalus barceloi* Phil., *Tragacantha monticola* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2500-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus nivicola Gómez-Sosa

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 90-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus nudus Clos

Sinónimos: *Tragacantha nuda* (Clos) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2-1350 m.
Nombre vulgar: Alfalfillo.

Astragalus orthocarpus I.M. Johnst.

Sinónimos: *Astragalus oliganthus* (Phil.) Reiche, nom. illeg.,
Phaca oligantha Phil., *Tragacantha oligantha* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 380-1750 m.

Astragalus palenae (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Phaca palenae* Phil., *Phaca rahmeri* Phil.,
Astragalus rahmeri (Phil.) Reiche, *Astragalus pallens* Reiche,
Phaca oreophila Phil., *Tragacantha oreophila* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 10-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus paposanus I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 100-2600 m.

Astragalus patagonicus (Phil.) Speg.

Sinónimos: *Phaca patagonica* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 150-380 m.
Países limítrofes: Argentina.

Astragalus pehuenches Niederl.

Sinónimos: *Phaca inflata* Gillies ex Hook. & Arn.,
Astragalus inflatus (Gillies ex Hook. & Arn.) Steud., *Phaca*

striata Clos, *Astragalus striatus* (Clos) Reiche, *Phaca macrocarpa* Phil., *Astragalus macrocarpus* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Tragacantha bisinflata* Kuntze, *Tragacantha grandis* Kuntze, *Astragalus grandis* (Kuntze) Speg., *Tragacantha striata* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 700-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Astragalus pissisii (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Reiche var. *pissisii* (Phil.) Reiche, *Phaca pissisii* Phil., *Tragacantha pissisii* (Phil.) Kuntze

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 350-3100 m.

Astragalus pusillus Vogel

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3650-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Astragalus reichei Speg.

Sinónimos: *Phaca compacta* Phil., *Astragalus compactus* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Países limítrofes: Bolivia.

Astragalus schinectorum Barneby

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2800-2800 m.

Astragalus tacorensis Gómez-Sosa

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Países limítrofes: Argentina.

Astragalus triflorus (DC.) A. Gray

Sinónimos: *Phaca triflora* DC., *Tragacantha triflora* (DC.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 100-700 m.

Países limítrofes: Perú.

Astragalus trifoliatus Phil.

Sinónimos: *Astragalus valparadisiensis* Speg., *Tragacantha trifoliata* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 5-5 m.

Astragalus vagus (Clos) Reiche

Sinónimos: *Phaca vaga* Clos, *Astragalus san-romani* (Phil.) Reiche, *Phaca san-romani* Phil., *Tragacantha vaga* (Clos) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 450-4300 m.

Astragalus valerianensis I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Astragalus verticillatus (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Phaca verticillata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 250-1800 m.

Astragalus vesiculosus Clos

Sinónimos: *Phaca nubigena* Meyen ex Vogel, *Astragalus nubigenus* (Meyen ex Vogel) Taub., *Astragalus meyenianus* Speg., *Phaca bustilloi* Phil., *Tragacantha andina* Kuntze, *Astragalus rupestris* Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2250-3410 m.

Países limítrofes: Argentina.

Astragalus werdermannii I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Balsamocarpon

Balsamocarpon brevifolium Clos

Sinónimos: *Caesalpinia brevifolia* (Clos) Benth.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1900 m.

Nombre vulgar: Algarrobilla.

Caesalpinia

Caesalpinia angulata (Hook. & Arn.) Baill.

Sinónimos: *Caesalpinia angulicaulis* Clos, *Zuccagnia angulata* Hook. & Arn., *Sophora angulata* (Hook. & Arn.) Ravenna

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1900 m.

Nombre vulgar: Retamo.

Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr.
Sinónimos: *Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook., *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) Benth., nom. illeg., *Erythrostemon gilliesii* (Wall. ex Hook.) Klotzsch
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Caesalpinia major (Medik.) Dandy & Exell
Arbusto. Nativo.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Ngaoho, naoho (Rapa Nui).

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze
Sinónimos: *Poinciana spinosa* Molina, *Caesalpinia tinctoria* (Kunth) Benth. ex Reiche, *Tara spinosa* (Molina) Britton & Rose, *Caesalpinia chilensis* DC.
Árbol. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tara.

Calliandra

Calliandra chilensis Benth.
Sinónimos: *Feuillea chilensis* (Benth.) Kuntze, *Acacia nigra* Clos
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1100 m.

Crotalaria

Crotalaria grahamiana Wight & Arn.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Crotalaria incana L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 40-60 m.

Crotalaria pallida Aiton
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Nga ehe ehe (Rapa Nui).

Cytisus

Cytisus scoparius (L.) Link
Arbusto. Introducido.
Distribución: MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Cytisus striatus Rothm.
Arbusto. Introducido.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Dalea

Dalea azurea (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Parosela azurea* (Phil.) J.F. Macbr., *Psoralea azurea* Phil., *Lotodes azureum* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Dalea moquehuana J.F. Macbr.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 1900-2700 m.
Países limítrofes: Perú.

Dalea pennellii (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. var. *chilensis*
Barneby
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2500-3300 m.

Desmanthus

Desmanthus virgatus (L.) Willd.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP.

Dipogon

Dipogon lignosus (L.) Verdc.
Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: TAR.

Errazurizia

Errazurizia multifoliolata (Clos) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Errazurizia glandulifera* Phil., *Psoralea multifoliolata* Clos, *Dalea multifoliolata* (Clos) Reiche, *Parosela multifoliolata* (Clos) J.F. Macbr.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

Galega

Galega officinalis L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Geoffroea

Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Sinónimos: *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn.,
Lucuma spinosa Molina, *Gourliea chilensis* Clos, *Gourliea spinosa* (Molina) Skeels
Árbol. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-2600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Chañar.

Glycyrrhiza

Glycyrrhiza astragalina Gillies ex Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: VAL, BIO.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hoffmannseggia

Hoffmannseggia aphylla (Phil.) G.P. Lewis & Sotuyo
Sinónimos: *Caesalpinia aphylla* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 0-3200 m.

Hoffmannseggia doellii Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2300-3500 m.

Hoffmannseggia eremophila (Phil.) Burkart ex Ulibarri
Sinónimos: *Hoffmannseggia andina* Miers var. *eremophila* (Phil.) Reiche, *Hoffmannseggia andina* Miers, nom. nud.,
Hoffmannseggia andina Phil., *Zuccagnia eremophila* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert
Sinónimos: *Hoffmannseggia falcaria* Cav., nom. illeg.,
Larrea glauca Ortega, *Caesalpinia glauca* (Ortega) Kunth,
Caesalpinia falcaria (Cav.) L. Fisher
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Porotillo, culchao.

Hoffmannseggia minor (Phil.) Ulibarri
Sinónimos: *Hoffmannseggia doellii* Phil. var. *minor* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 800-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hoffmannseggia prostrata Lag. ex DC.
Sinónimos: *Hoffmannseggia gracilis* (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn.,
Caesalpinia prostrata (Lag. ex DC.) J.F. Macbr.,
Larrea gracilis Ruiz & Pav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Ají.

Hoffmannseggia trifoliata Cav.
Sinónimos: *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var. *microphylla* Speg.,
Hoffmannseggia trifoliata Cav. var. *glandulosa* Speg.,
Hoffmannseggia trifoliata Cav. fma. *normalis* Speg.,
Hoffmannseggia trifoliata Cav. fma. *microphylla* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook.
Sinónimos: *Caesalpinia ternata* (Phil.) J.F. Macbr., *Larrea viscosa* Ruiz & Pav.,
Caesalpinia viscosa (Ruiz & Pav.) Fisch., *Hoffmannseggia ternata* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 1500-3000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Indigofera

Indigofera truxillensis Kunth
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Países limítrofes: Perú.

Lablab

Lablab purpureus (L.) Sweet
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: IPA.

Lathyrus

Lathyrus berterioanus Colla ex Savi
Sinónimos: *Lathyrus gracilis* Phil., *Lathyrus debilis* Vogel
var. *berterioanus* (Colla ex Savi) Reiche
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Lathyrus cabrerianus Burkart

Sinónimos: *Lathyrus pubescens* Clos, hom. illeg., *Lathyrus dumetorum* Burkart, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus campestris Phil.

Sinónimos: *Lathyrus debilis* Vogel var. *campestris* (Phil.)

Reiche, *Lathyrus gracillimus* Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus cicera L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, BIO, LLA.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus hookeri G. Don

Sinónimos: *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn., *Lathyrus chilensis* Steud., *Lathyrus petiolaris* Clos, *Lathyrus pisaster* Clos, *Lathyrus roseus* Phil., *Lathyrus litoralis* Phil., *Lathyrus ovalifolius* Phil., *Lathyrus trichocalyx* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *araucanus* Phil., *Lathyrus heterocirrus* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *heterocirrus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn. fma. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus hookeri* G. Don var. *trichocalyx* (Phil.) Burkart

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, BIO.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus japonicus Willd. var. *aleuticus* (Greene) Fernald

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS.

Lathyrus japonicus Willd. var. *japonicus*

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO, ARA, LLA.

Lathyrus lomanus I.M. Johnst.

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Lathyrus macropus Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lathyrus linearifolius* Griseb., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus magellanicus Lam. var. *glaucescens* Speg.

Sinónimos: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *oxyphylla* Speg., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *campestris* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Arvejilla.

Lathyrus magellanicus Lam. var. *longipes* (Phil.) Burkart

Sinónimos: *Lathyrus longipes* Phil., *Lathyrus dumetorum* Phil. var. *longipes* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Arvejilla.

Lathyrus magellanicus Lam. var. *magellanicus*

Sinónimos: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze, *Lathyrus magellanicus* D. Don, nom. illeg., *Lathyrus patagonicus* Hauman, *Lathyrus pterocaulos* Phil.

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Arvejilla.

Lathyrus magellanicus Lam. var. *tucumanensis* Burkart

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus multiceps Clos

Sinónimos: *Lathyrus multiceps* Clos var. *setiger* (Phil.) Acevedo, *Lathyrus setiger* Phil., *Lathyrus eurypetalus* Phil., *Lathyrus setiger* Phil. var. *eurypetalus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus ecirrhosus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus nervosus Lam.

Sinónimos: *Lathyrus trigonus* Vogel, *Lathyrus ovalifolius* Phil. var. *mucronatus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Lathyrus pubescens Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lathyrus petiolaris* Vogel, *Lathyrus acutifolius* Vogel, *Lathyrus andicolus* Gand., *Lathyrus dumetorum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Lathyrus pusillus Elliott
Sinónimos: *Lathyrus stipularis* J. Presl, *Lathyrus montevidensis* Vogel, *Lathyrus arvensis* Phil., *Lathyrus debilis* Vogel var. *arvensis* (Phil.) Reiche, *Lathyrus crassipes* Phil., nom. illeg., *Lathyrus dicirrhus* Clos
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LLA.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Lathyrus sativus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Lathyrus subandinus Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Leucaena

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: IPA.

Lotus

Lotus corniculatus L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Lotus pedunculatus Cav.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, IPA.

Lotus subpinnatus Lag.
Sinónimos: *Hosackia subpinnata* (Lag.) Torr. & A. Gray
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2300 m.

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LLA.

Lupinus

Lupinus albus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: BIO, ARA.

Lupinus angustifolius L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: NUB, BIO.

Lupinus arboreus Sims
Arbusto. Introducido.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Lupinus luteus L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL.

Lupinus microcarpus Sims
Sinónimos: *Lupinus comberanus* C.P. Sm., *Lupinus fischeranus* C.P. Sm., *Lupinus verticillatus* C.P. Sm.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Altramuz, hierba del traro.

Lupinus oreophilus Phil.
Sinónimos: *Lupinus oreophilus* Greene, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2700-4400 m.

Lupinus polyphyllus Lindl.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA, AIS, MAG.

Lupinus subcaulis Griseb.
Sinónimos: *Lupinus chilensis* C.P. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Lupinus subinflatus C.P. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Lupinus tarapacensis C.P. Sm.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Países limítrofes: Perú.

Lupinus werdermannianus C.P. Sm.
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR.

Macroptilium

Macroptilium lathyroides (L.) Urban

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: IPA.

Medicago

Medicago arabica (L.) Huds.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Medicago arborea L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: RME, MAU.

Medicago lupulina L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA.

Medicago minima (L.) Bartal.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, ARA, MAG.

Medicago polymorpha L. var. *confinis* (Koch) Ooststr. & B. Reichg.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Medicago polymorpha L. var. *polymorpha*

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Medicago polymorpha L. var. *vulgaris* (Benth.) Shinnery

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Medicago sativa L.

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Melilotus

Melilotus albus Medik.

Hierba o subarbusto. Bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, AIS, MAG.

Melilotus indicus (L.) All.

Hierba o subarbusto. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Melilotus officinalis (L.) Lam.

Hierba o subarbusto. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAG.

Ornithopus

Ornithopus compressus L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: BIO.

Ornithopus sativus Brot.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

Otholobium

Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes

Sinónimos: *Psoralea glandulosa* L., *Lotodes glandulosum* (L.) Kuntze, *Hoita glandulosa* (L.) Rydb.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 600-1400 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Prosopis

Prosopis alba Griseb.

Sinónimos: *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC. var. *longisiliqua* Phil., *Prosopis atacamensis* Phil.

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Algarrobo blanco.

Prosopis burkartii Muñoz

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart

Sinónimos: *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC., *Ceratonia chilensis* Molina, *Acacia siliquastrum* Cav. ex Lag., *Prosopis schinopoma* Stuck.

Árbol. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Algarrobo del centro.

Prosopis flexuosa DC. var. *flexuosa*

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Prosopis flexuosa DC. var. *fruticosa* (Meyen) F.A. Roig

Sinónimos: *Prosopis fruticosa* Meyen

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-800 m.

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth.

Sinónimos: *Strombocarpa strombulifera* (Lam.) A. Gray, *Acacia strombulifera* (Lam.) Willd., *Spirolobium australe* Orb., *Mimosa circinalis* Cav., nom. illeg., *Mimosa strombulifera* Lam., *Prosopis reptans* Benth. var. *chilensis* Zoellner

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, LBO.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Espinillo, retortón.

Prosopis tamarugo Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rhynchosia

Rhynchosia minima (L.) DC.

Arbusto trepador. Introducido.

Distribución: AYP.

Robinia

Robinia pseudoacacia L.

Árbol. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.

Senna

Senna arnottiana (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook., *Cassia andina* Phil., *Cassia arnottiana* Gillies ex Hook. var. *andina* (Phil.) Reiche

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 800-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby

var. *arequipensis* (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia arequipensis* Meyen ex Vogel, *Cassia tarapacana* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-3900 m.

Países limítrofes: Perú.

Senna brongniartii (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia misera* Phil., *Cassia brongniartii* Gaudich.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 100-1100 m.

Países limítrofes: Perú.

Senna candolleana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia closiana* Phil., *Cassia obtusa* Clos, *Cassia candolleana* Vogel, *Cassia emarginata* Clos, nom. illeg., *Cassia bicapsularis* L. var. *chilensis* Benth.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Senna cruckshanksii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia stipulacea* Aiton var. *tenuistipula* Bertero ex Vogel, *Cassia campanae* Phil., *Cassia confusa* Phil. var. *campanae* (Phil.) Reiche, *Cassia cruckshanksii* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 400-600 m.

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby

var. *alcaparra* (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia alcaparra* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby

var. *coquimbensis* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia coquimbensis* Vogel, *Cassia flaccida* Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. ***cumingii***

Sinónimos: *Cassia cumingii* Hook. & Arn.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Senna cumingii (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. ***eremobia*** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia eremobia* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Senna huidobriana (Phil.) Zoellner & San Martin

Sinónimos: *Cassia huidobriana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Senna paposana (Phil.) Zoellner & San Martin

Sinónimos: *Cassia paposana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Senna septemtrionalis (Viv.) H.S. Irwin & Barneby

Árbol. Introducido.

Distribución: LBO.

Senna stipulacea (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. ***anglorum*** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Senna stipulacea (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. ***stipulacea***

Sinónimos: *Cassia stipulacea* Aiton, *Cassia foetida* Ruiz & Pav. ex G. Don, *Cassia myrtifolia* Phil. ex Reiche, *Cassia stipulacea* Willd., nom. illeg., *Cassia pencana* Phil. ex sched.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Quebracho, alcaparra.

Senna urmenetae (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Sinónimos: *Cassia urmenetae* Phil., *Cassia glaucescens* Benth., *Cassia oreades* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Sophora

Sophora cassioides (Phil.) Sparre

Sinónimos: *Edwardsia cassioides* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Pilo, pelú.

Sophora fernandeziana (Phil.) Skotts. var. ***fernandeziana***

Sinónimos: *Sophora tetraptera* J.S. Muell. subsp. *fernandeziana* Skotts.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Mayu-monte, mayu del monte.

Sophora fernandeziana (Phil.) Skotts. var. ***reediana*** (Phil.) Skotts.

Sinónimos: *Edwardsia reediana* Phil., *Sophora reediana* (Phil.) Yakovlev

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Sophora macrocarpa Sm.

Sinónimos: *Sophora donihuensis* Ravenna

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Nombre vulgar: Mayu, mayo.

Sophora masafuerana (Phil.) Skotts.

Sinónimos: *Edwardsia masafuerana* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Pelú de Juan Fernández, leña dura, madera dura.

Sophora toromiro (Phil.) Skotts.

Sinónimos: *Edwardsia toromiro* Phil., *Sophora tetraptera* auct., non J. Mill.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Toromiro.

Nota: Extinto en estado silvestre.

Spartium

Spartium junceum L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: AYP, ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Teline

Teline monspessulana (L.) K. Koch

Arbusto. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Retamilla.

Trifolium

Trifolium angustifolium L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Trifolium antucoense D. Heller

Sinónimos: *Trifolium circumdatum* Kunze, nom. illeg., *Lupinaster circumdatus* (Kunze) C. Presl, *Trifolium inconspicuum* Poepp. ex D. Heller, nom. nud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO, BIO, LLA.

Trifolium arvense L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG.

Trifolium aureum Pollich

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: MAG.

Trifolium campestre Schreb.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Trifolium cernuum Brot.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LBO, MAU.

Trifolium chilense Hook. & Arn.

Sinónimos: *Lupinaster ochreatus* (Kunze ex Steud.) C. Presl, *Trifolium ochreatum* Kunze ex Steud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 600-900 m.

Trifolium depauperatum Desv.

Sinónimos: *Lupinaster depauperatus* (Desv.) C. Presl

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Perú.

Trifolium dubium Sibth.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Trifolium fragiferum L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Trifolium glomeratum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Trifolium hybridum L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: BIO, LLA, MAG.

Trifolium incarnatum L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.

Trifolium macraei Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trifolium bicephalum* Elmer, *Trifolium catalinae* S. Watson, *Trifolium mercedense* P.B. Kenn, *Trifolium traskae* P.B. Kenn

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nota: Se encuentra también en California.

Trifolium microdon Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trifolium lechleri* Phil., *Trifolium chrysanthum* Hook. & Arn., *Trifolium microdon* Hook. & Arn. var. *pilosum* Eastw., *Trifolium tricuspdatum* Bertero ex Steud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nota: Se encuentra también en Estados Unidos y Canadá.

Trifolium phyanthum Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trifolium valdivianum* Phil. ex D. Heller & Zohary, nom. nud.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, BIO, LLA.

Trifolium polymorphum Poir. var. *grandiflorum* Parodi

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Trifolium polymorphum Poir. var. *polymorphum*

Sinónimos: *Trifolium grandiflorum* Hook. & Arn., *Amoria*

polymorpha (Poir.) C. Presl, *Trifolium rivale* Closs, non Steud., *Trifolium crosnierii* Clos, *Trifolium indecorum* Clos, *Trifolium simplex* Clos, *Trifolium brevipes* Phil., *Trifolium concinum* Phil., *Trifolium amhicarpum* Phil., *Trifolium rubrum* Larrañaga

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Trifolium pratense* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

***Trifolium repens* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Trifolium spadiceum* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: MAG.

***Trifolium striatum* L.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

***Trifolium subterraneum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, LBO, MAU, BIO, ARA.

***Trifolium suffocatum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO.

***Trifolium tomentosum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO.

***Trifolium triaristatum* Bertero ex Colla**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, BIO, LLA.

Nota: Se encuentra también en México y Estados Unidos.

***Trifolium vernalis* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL, LBO.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

***Trifolium vestitum* D. Heller & Zohary**

Sinónimos: *Trifolium volekmanni* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Trigonella

***Trigonella monspeliaca* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Ulex

***Ulex europaeus* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Vicia

***Vicia araucana* Phil.**

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: MAU, NUB.

***Vicia benghalensis* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG.

***Vicia berteriana* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, LBO.

***Vicia bijuga* Gillies ex Hook. & Arn.**

Sinónimos: *Lathyrus anomalus* Phil., *Vicia solisii* Phil., *Vicia saffordii* Phil., *Vicia sericella* Speg., *Vicia sericella* Speg. var. *glabrata* Speg.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME, NUB, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Vicia coquimbensis* Martic.**

Sinónimos: *Vicia truncata* Phil., hom. illeg.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

***Vicia diversifolia* Phil.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LLA.

***Vicia graminea* Sm.**

Sinónimos: *Vicia graminea* Sm. var. *heterophylla* Kuntze, *Vicia graminea* Sm. var. *multiflora* Hook. & Arn., *Vicia grata* Phil.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Vicia hirsuta (L.) Gray
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Vicia inconspicua Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Vicia lanceolata Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: MAU.

Vicia linearifolia Hook. & Arn.
Sinónimos: *Vicia hookeri* G. Don, *Vicia micrantha* Hook. & Arn.
Hierba trepadora. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Vicia magellanica Hook.f. var. *dianthes* (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Vicia dianthes* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ARA.

Vicia magellanica Hook.f. var. *magellanica*
Sinónimos: *Vicia graminea* auct. non Sm., *Vicia kingii* Hook.f., *Vicia patagonica* Hook.f., *Vicia depauperata* Clos, *Vicia patagonica* Hook.f. var. *depauperata* (Clos) Speg., *Vicia andicola* Phil. non Kunth
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Vicia modesta Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: ANT, VAL.

Vicia mucronata Clos
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Vicia nana Vogel
Sinónimos: *Vicia dentata* Gillies ex Hook. & Arn., *Vicia valdiviana* Phil., *Vicia leptantha* Phil.

Hierba trepadora. Anual. Nativa.
Distribución: BIO, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Vicia nigricans Hook. & Arn.
Sinónimos: *Vicia macraei* Hook. & Arn., *Vicia coxii* Phil., *Vicia darapskiana* Phil., *Vicia andina* Phil., *Vicia leyboldii* Phil., *Vicia magnifolia* Clos, *Vicia moorei* Phil., *Vicia speciosa* Phil., *Vicia commutata* Phil., *Vicia fodinarum* Phil., *Vicia apiculata* Phil., *Vicia apiculata* Phil. var. *parvifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Vicia pallida Hook. & Arn.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Vicia parviflora Cav.
Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: ARA.

Vicia sativa L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, BIO, ARA, LLA.

Vicia sativa L. subsp. *sativa*
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Vicia sessiliflora Clos
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: LLA.

Vicia setifolia Kunth
Sinónimos: *Vicia graminea* Sm. var. *setifolia* (Kunth) Kuntze, *Vicia acerosa* Clos, *Vicia acerosa* Clos var. *angustifolia* (Clos) Reiche, *Vicia angustifolia* Clos, hom. illeg.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, LLA.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Vicia subserrata Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 100-200 m.

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG.

Vicia vicina Clos

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Vicia villosa Roth

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Weberbauerella

Weberbauerella chilensis Faúndez & Saldivia

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 2500-3600 m.

FAGACEAE

Quercus

Quercus robur L.

Árbol. Introducido.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Nombre vulgar: Encino, roble europeo.

FRANCOACEAE

Araeoandra

Araeoandra tenuicaulis (Barnéoud) Lefor

Sinónimos: *Viviania tenuicaulis* Barnéoud

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Balbisia

Balbisia gracilis (Meyen) Hunz. & Ariza

Sinónimos: *Wendtia gracilis* Meyen, *Wendtia gracilis* Meyen var. *typica* Knuth, nom. illeg., *Wendtia reynoldsii* Endl. ex Walp., *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze, *Wendtia trigyna* (Kunze) Kuntze var. *poepigiana* Kuntze

Subarbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Balbisia microphylla (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Ledocarpon microphylla* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ATA.

Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Nombre vulgar: Purisa, pupuña.

Balbisia peduncularis (Lindl.) D. Don

Sinónimos: *Ledocarpon pedunculare* Lindl., *Cruckshanksia cistiflora* Hook. & Arn., *Ledocarpon cistiflorum* Meyen, nom. nud.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Flor de San José, amancai, palo negro, copa de oro, mancay.

Balbisia stichkinii Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3800-4000 m.

Cissarobryon

Cissarobryon elegans Kunze ex Poepp.

Sinónimos: *Cissarobryon aristulatum* Phil., *Cissarobryon macrophyllum* Phil., *Cissarobryon parvifolium* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 200-2500 m.

Francoa

Francoa appendiculata Cav. var. *appendiculata*

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 800-1500 m.

Francoa appendiculata Cav. var. *ramosa* (D. Don) Rolfe

Sinónimos: *Francoa ramosa* D. Don

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Francoa appendiculata Cav. var. *sonchifolia* (Cav.) Rolfe

Sinónimos: *Francoa sonchifolia* Cav.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Hierba del pasmo, llaupangue.

Tetilla

Tetilla hydrocotylifolia DC.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.

Viviania

Viviania crenata (Hook.) G. Don

Sinónimos: *Macraea crenata* Hook.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Nombre vulgar: Oreganillo.

Viviania marifolia Cav.

Sinónimos: *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch, *Macraea rosea* Lindl., *Viviania brevipedunculata* Phil., *Viviania laxa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 3200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Oreganillo, té de burro.

Viviania ovata Phil.

Sinónimos: *Viviania bernalessii* Phil., *Viviania rosea* (Lindl.) Klotzsch var. *ovata* (Phil.) Reiche, *Viviania viridis* Phil. ex Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

FRANKENIACEAE

Frankenia

Frankenia chilensis K. Presl

Sinónimos: *Frankenia campestris* Schauer, *Frankenia chilensis* K. Presl var. *campestris* (Schauer) Gunckel, *Frankenia erecta* Gay, *Frankenia nicolletiana* Gay, *Frankenia farinosa* J. Remy, *Frankenia aspera* Phil., *Frankenia chilensis* K. Presl var. *aspera* (Phil.) I.M. Johnst., *Frankenia florida* Phil., *Frankenia nicolletiana* Gay var. *florida* (Phil.) Reiche, *Frankenia glabrata* Phil., *Frankenia chilensis* K. Presl var. *florida* (Phil.) Gunckel, *Coldenia glabra* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.

Países limítrofes: Perú.

Frankenia microphylla Cav.

Sinónimos: *Franca microphylla* (Cav.) Vis., *Frankenia microphylla* Cav. var. *relaxata* Speg., *Niederleinia microphylla* (Cav.) Hieron. ex Nied.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Frankenia salina (Molina) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Frankenia berteriana* Gay, *Frankenia micrantha* Gay, *Frankenia salina* (Molina) I.M. Johnst. var. *micrantha* (Gay) Gunckel, *Franca grandifolia* (Cham. & Schltdl.) Greene, *Frankenia campestris* (Gay) Tidestrom, *Frankenia grandifolia* Cham. & Schltdl. var. *micrantha* (Gay) W.L. Bray, *Frankenia grandifolia* Cham. & Schltdl., *Frankenia grandifolia* Cham. & Schltdl. var. *campestris* Gray, *Frankenia latifolia* K. Presl, *Frankenia micrantha* Gay var. *berteroana* (Gay) W.L. Bray, *Ocymum salinum* Molina, *Velesia latifolia* Eschsch.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Hierba del salitre, salitre, vichilla, dichilla.

Frankenia triandra J. Remy

Sinónimos: *Anthobryum triandrum* (J. Remy) Surgis, *Anthobryum aretioides* Phil., *Anthobryum clarenii* (R.E. Fr.) Cabrera, *Anthobryum tetragonum* Phil., *Frankenia clarenii* R.E. Fries, *Pycnophyllum sulcatum* Griseb., *Anthobryum aretioides* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Llaretilla.

Frankenia vidalii F. Phil.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 200-500 m.

GENTIANACEAE

Centaurium

Centaurium cathanlahuen (Molina) B.L. Rob.

Sinónimos: *Gentiana cathanlahuen* Molina, *Gentiana peruviana* Lam., *Chironia chilensis* Willd., nom. illeg., *Erythraea chilensis* (Willd.) Pers., *Centaurium chilense* (Willd.) Druce, nom. illeg., *Erythraea chilensis* (Willd.) Pers. var. *humilis* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Canchanlahue, canchanlahuen, cachén, canchanlahua.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Centaurium erythraea Rafn

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

Centaurium littorale (Turner) Gilmour

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ARA, LLA, AIS.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: LRI, LLA.

Centaurium spicatum (L.) Fritsch ex Janch.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Cicendia

Cicendia quadrangularis (Lam.) Griseb.

Sinónimos: *Microcala quadrangularis* (Dombey ex Lam.) Griseb., *Gentiana quadrangularis* Lam., *Exacum quadrangulare* (Lam.) Willd., *Exacum chilense* Bertero, nom. nud., *Exacum inflatum* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Gentiana

Gentiana prostrata Haenke

Sinónimos: *Gentiana sedifolia* Kunth, *Gentiana gayi* Griseb., *Gentiana podocarpa* (Phil.) Griseb., *Gentiana prostrata* Haenke var. *podocarpa* (Phil.) Kusn., *Gentiana ramosissima* Phil., *Varasia podocarpa* Phil., *Gentiana sedifolia* Kunth var. *lineata* Phil., *Gentiana minima* Phil., *Varasia sessilis* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 1800-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Mamañika.

Gentianella

Gentianella coquimbensis (Briq.) Martic. & Quezada

Sinónimos: *Gentiana coquimbensis* Briq., *Gentianella coquimbensis* (Briq.) T.N. Ho & S.W. Liu, comb. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1600-3500 m.

Gentianella magellanica (Gaudich.) Fabris ex D.M. Moore

Sinónimos: *Gentiana lactea* Phil., *Gentiana pearcei* Phil., *Gentiana valdiviana* Phil., *Gentiana magellanica* Gaudich., *Gentiana araucana* Phil., *Gentiana modesta* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gentianella multicaulis (Gillies ex Griseb.) Fabris

Sinónimos: *Gentianella gilliesii* (Gilg) Martic. & Arroyo, nom. illeg., *Gentiana gilliesii* Gilg, nom. illeg.

Hierba. Bienal. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Gentianella ottonis (Phil.) Muñoz

Sinónimos: *Gentiana ottonis* Phil., *Gentiana hexamera* Phil., *Gentiana ottonis* Phil. var. *hexamera* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 2400-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gentianella tarapacana (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu

Sinónimos: *Gentiana tarapacana* Gilg

Hierba. Bienal. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3800 m.

GERANIACEAE

Erodium

Erodium botrys (Cav.) Bertol.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Erodium geoides A. St.-Hil.

Sinónimos: *Erodium botrys* auct. non (Cav.) Bertol.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, ARA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton var. *malacoides*

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Erodium malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton var. *ribifolium* (Jacq.) DC.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME.

Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton

Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Geranium

Geranium bertereanum Colla

Sinónimos: *Geranium andinum* Phil., *Geranium proximum* Steud., *Geranium patagonicum* Hook.f., *Geranium apricum* Phil., *Geranium chilense* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium collae* Aedo, Muñoz Garm. & Pando, *Geranium neohispidium* Aedo & Muñoz Garm., *Geranium submolle* Steud., *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium bertereanum* Colla var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *caespitosum* Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *hispidum* Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Geranium core-core Steud.

Sinónimos: *Geranium argentinum* R. Knuth, *Geranium moorei* Phil., *Geranium commutatum* Steud., *Geranium ochsenii* Phil., *Geranium squamosum* Phil., *Geranium subsericeum* R. Knuth, *Geranium rapulum* A. St.-Hil. & Naudin, *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium commutatum* Steud. var. *oschenii* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Core-core.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Geranium dissectum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Geranium magellanicum Hook.f.

Sinónimos: *Geranium magellanicum* Hook.f. var. *typicum* R. Knuth, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Geranium molle L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Geranium purpureum Vill.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Geranium pusillum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, MAU, AIS, MAG, JFE.

Geranium robertianum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Geranium sessiliflorum Cav.

Sinónimos: *Geranium acaule* auct. non Willd., *Geranium sessiliflorum* Cav. fma. *albiflorum* Kuntze, nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Geranium skottsbergii R. Knuth

Sinónimos: *Geranium columbinum* auct. non L., *Geranium philippii* J.F. Macbr., *Geranium bertereanum* Colla var. *ciliatum* Reiche, *Geranium bertereanum* Colla var. *philippii* (J.F. Macbr.) L.E. Navas
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

GESNERIACEAE

Asteranthera

Asteranthera ovata (Cav.) Hanst.

Sinónimos: *Asteranthera chilensis* Hanst., *Columnnea ovata* Cav.

Hierba epífita. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Estrellita, estrellita del bosque, voqui.

Mitraria

Mitraria coccinea Cav.

Sinónimos: *Gesneria chilensis* Molina

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Botellita, chilca, voquivoqui, vochi-vochi.

Sarmienta

Sarmienta scandens (J.D. Brandis ex Molina) Pers.

Sinónimos: *Sarmienta repens* Ruiz & Pavón, nom. illeg., *Urceolaria scandens* J.D. Brandis ex Molina, *Urceolaria chilensis* Molina, *Ulceolaria chilensis* Roemer. & Schultes

Subarbusto epífita. Endémico.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Italahuén, votri, medallita, habaslahuén, canucán.

GOMORTEGACEAE

Gomortega

Gomortega keule (Molina) Baill.

Sinónimos: *Lucuma keule* Molina, *Gomortega nitida* Ruiz & Pav., *Keulia chilensis* Molina, *Adenostemum nitidum* (Ruiz & Pav.) Pers.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Nombre vulgar: Queule, keule.

GOODENIACEAE

Selliera

Selliera radicans Cav.

Sinónimos: *Goodenia radicans* (Cav.) Pers., *Goodenia repens* Labill., *Selliera fasciculata* Buchenan, *Selliera herpystica* Schldtl., *Selliera microphylla* Colenso, *Selliera repens* de Vriese

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Roseta nudosa de los pantanos, maleza de las marismas.

GRISELINIACEAE

Griselinia

Griselinia carlomunozii M.O. Dillon & Muñoz-Schick

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Griselinia jodinifolia (Griseb.) Taub.

Sinónimos: *Decostea jodinifolia* Griseb.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Griselinia racemosa (Phil.) Taub.

Sinónimos: *Decostea racemosa* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lamulahuen.

Griselinia ruscifolia (Clos) Ball

Sinónimos: *Decostea ruscifolia* Clos, *Griselinia ruscifolia* (Clos) Taub., comb. illeg.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lilinguen.

Griselinia scandens (Ruiz & Pav.) Taub.

Sinónimos: *Decostea scandens* Ruiz & Pav., *Griselinia alata* Ball

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Yelmo.

GROSSULARIACEAE

Ribes

Ribes bicolor Phil.

Sinónimos: *Ribes glandulosum* Ruiz & Pav., *Ribes ruizii* Rehder

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1700 m.

Ribes cucullatum Hook. & Arn.

Sinónimos: *Ribes lacarense* Phil., *Ribes nubigenum* Phil., *Ribes nebularium* Phil., *Ribes montanum* Phil., *Ribes brachystachya* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Zarzaparrilla.

Ribes densiflorum Phil.

Sinónimos: *Ribes cucullatum* Hook. & Arn. var. *densiflorum* (Phil.) Sparre, *Ribes nitidissimum* Neger

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ribes integrifolium Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1100-1400 m.

Nombre vulgar: Parrilla falsa.

Ribes magellanicum Poir.

Sinónimos: *Ribes ovallei* Phil., *Ribes parviflorum* Phil., *Ribes parvifolium* Phil., *Ribes ahrendsii* Phil., *Ribes palenae* Phil., *Ribes micranthum* Phil., *Ribes magellanicum* Poir. subsp. *parviflorum* (Phil.) Sparre

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Zarzaparrilla, parrilla.

Ribes nemorosum Phil.

Sinónimos: *Ribes polyanthes* Phil., *Ribes rupicola* Phil., *Ribes stolpi* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1400-1800 m.

Nombre vulgar: Zarzaparrilla.

Ribes punctatum Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Rebis punctata* (Ruiz & Pav.) Spach, *Rebis ebracteolata* Spach, *Ribes ebracteolatum* (Spach) Gay, *Ribes sublobatum* Phil., *Ribes collinum* Phil., *Ribes berterioanum* Phil., *Ribes heterophyllum* Phil., *Ribes georgianum* F. Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Brevilla, zarzaparrilla, parrilla, uvilla.

Ribes trilobum Meyen

Sinónimos: *Rebis gayanum* (Spach) Reiche, *Ribes villosum* Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Nombre vulgar: Parrilla, muhul.

Ribes valdivianum Phil.

Sinónimos: *Ribes valdivianum* Phil. var. *sessiliflorum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

GUNNERACEAE

Gunnera

Gunnera berteroi Phil.

Sinónimos: *Gunnera laxiflora* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2700-3100 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Gunnera bracteata Steud. ex G. Benn.

Sinónimos: *Gunnera glabra* Phil., *Gunnera insularis* Phil., *Gunnera pyramidalis* Schindl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Pangué.

Gunnera lobata Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gunnera magellanica Lam.
Sinónimos: *Dysemone integrifolia* Banks ex Blume, *Misandra magellanica* J.F. Gmel., *Gunnera plicata* Vahl, *Gunnera falklandica* Hook.f., *Gunnera reichei* Schindl., *Gunnera integrifolia* Blume
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Gunnera masafuerae Skottsbo.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Pangué.

Gunnera peltata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Pangué.

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. *meyerii* (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González
Sinónimos: *Gunnera chilensis* Lam. var. *meyerii* L.E. Mora
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pangué, nalca.

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. *tinctoria*
Sinónimos: *Panke tinctoria* Molina, *Gunnera chilensis* Lam., *Gunnera scabra* Ruiz & Pav., *Panke anapodophyllifolia* Feuille, *Panke chilensis* Oersted, *Panke caulescens* J.F. Gmelin
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pangué, nalca.

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. var. *valdiviensis* (L.E. Mora) L.E. Mora, Pabón-Mora & F. González
Sinónimos: *Gunnera chilensis* Lam. var. *valdiviensis* L.E. Mora
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Pangué, nalca.

HALORAGACEAE

Haloragis

Haloragis masafuerae Skottsbo. var. *asperrima* (Skottsbo.) Orchard
Sinónimos: *Haloragis asperrima* Skottsbo.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.

Haloragis masafuerae Skottsbo. var. *masafuerae*
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Haloragis masatierrana Skottsbo.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.

Myriophyllum

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
Sinónimos: *Myriophyllum proserpinacoides* Gillies ex Hook. & Arn.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Lima, lima trencilla, wakalima, loroma, aguasana.

Myriophyllum quitense Kunth
Sinónimos: *Myriophyllum elatinoides* Gaudich. var. *ternatum* (Gaudich.) Reiche, *Myriophyllum ternatum* Gaudich., *Myriophyllum ternatum* Gaudich. var. *tetraphyllum* Hook. & Arn.
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Loroma, aguasana, loroma hembra.

HELIOTROPIACEAE

Heliotropium

Heliotropium amplexicaule Vahl

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 550-600 m.

Heliotropium angiospermum Murray

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: TAR.

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. ***chenopodiaceum***

Sinónimos: *Heliophytum chenopodiaceum* A. DC.,

Cochranea chenopodiacea (A. DC.) Miers

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 200-1700 m.

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. ***ericoideum*** (Miers) Reiche

Sinónimos: *Cochlearia ericoidea* Miers, *Heliotropium pearcei* Phil., *Eritrichium glabratum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Heliotropium curassavicum L.

Sinónimos: *Heliotropium curassavicum* L. var. *parviflorum*

Ball, *Heliotropium curassavicum* L. var. *genuinum* I.M.

Johnst., nom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Heliotropium eremogenum I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Heliotropium filifolium (Miers) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea filifolia* Miers, *Heliotropium*

chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. *filifolium* (Miers) Reiche, *Cochranea kingi* Phil., *Heliotropium kingi* (Phil.)

Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Heliotropium floridum (A. DC.) Clos

Sinónimos: *Heliophytum floridum* A.DC., *Cochranea*

florida (A. DC.) Miers, *Heliotropium floridum* (A. DC.)

Clos var. *latifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Heliotropium geissei F. Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Heliotropium glutinosum Phil.

Sinónimos: *Cochranea glutinosa* (Phil.) Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1100-1500 m.

Heliotropium huascoense I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Heliotropium inconspicuum Reiche

Sinónimos: *Cochranea parviflora* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 1000-1200 m.

Heliotropium jaffuelii I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Heliotropium krauseanum Fedde

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 700 m.

Países limítrofes: Perú.

Heliotropium linariifolium Phil.

Sinónimos: *Heliotropium linearifolium* F. Phil.,

Heliotropium longiflorum Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Heliotropium longistylum Phil.

Sinónimos: *Cochranea longistyla* (Phil.) Phil., *Heliotropium*

vernicosum Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Heliotropium megalanthum I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea corymbosa* Miers, *Heliotropium corymbosum* (Miers) Reiche, *Heliotropium crassifolium* Phil., *Cochranea crassifolia* (Phil.) Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Heliotropium myosotifolium (A. DC.) Reiche

Sinónimos: *Heliotropium stenophyllum* Hook. & Arn. var. *myosotifolium* (A. DC.) Clos, *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *myosotifolium* A. DC., *Cochranea myosotifolia* (A. DC.) Miers, *Cochranea hebecula* Miers, *Cochranea hispidula* Miers, *Heliotropium hispidulum* (Miers) Reiche, *Cochranea sentis* Phil., *Heliotropium canum* Phil., *Heliotropium hispidulum* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 0-2400 m.

Heliotropium paronychioides A. DC.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-3100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Heliotropium philippianum I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Heliotropium pycnophyllum Phil.

Sinónimos: *Cochranea pycnophylla* (Phil.) F. Phil. ex Reiche, *Heliotropium breanum* Phil., *Heliotropium brevifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Heliotropium sclerocarpum Phil.

Sinónimos: *Cochranea sclerocarpa* Phil., *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *sclerocarpa* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Heliotropium sinuatum (Miers) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea sinuata* Miers, *Heliotropium izagae* Phil., *Heliotropium rosmarinifolium* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Heliotropium stenophyllum Hook. & Arn.

Sinónimos: *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC., *Cochranea stenophylla* (Hook. & Arn.) Miers, *Meladendron chilense* Molina, *Heliotropium rosmarinifolium* Bertero ex Steud., nom. nud., *Heliotropium rosmarinifolium* Bertero ex A.DC., *Heliotropium stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *rosmarinifolium* (Bertero ex A. DC.) Clos, *Cochranea conferta* Miers, nom. nud., *Cochranea congesta* Miers

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Heliotropium taltalense (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Cochranea taltalensis* Phil., *Heliotropium rugosum* Phil., *Cochranea rugosa* (Phil.) Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-700 m.

HYDRANGEACEAE

Hydrangea

Hydrangea serratifolia (Hook. & Arn.) F. Phil.

Sinónimos: *Cornidia serratifolia* Hook. & Arn., *Cornidia integerrima* Hook. & Arn., *Hydrangea integerrima* (Hook. & Arn.) Engl., *Hydrangea scandens* Poepp.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Canelilla, pehuelden, voqui naranjo, laurela.

HYPERICACEAE

Hypericum

Hypericum androsaemum L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LBO, MAU, LRI, LLA.

Hypericum caespitosum Cham. & Schltdl.

Sinónimos: *Hypericum chilense* Gay, *Hypericum muscoides* Phil., *Hypericum chilense* Gay var. *muscoides* (Phil.) Reiche, *Hypericum uliginosum* Kunth var. *prostratum* R. Keller, *Hypericum brevistylum* auct. non Choisy

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Nombre vulgar: Ñanco.

***Hypericum perforatum* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA, JFE.

***Hypericum silenoides* Juss.**

Sinónimos: *Hypericum paposanum* I.M. Johnst., *Hypericum indecorum* Kunth, *Hypericum multiflorum* Kunth
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ARA, LRI.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Hypericum x inodorum* L.**

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, ARA, LLA, AIS.

KRAMERIACEAE

Krameria

***Krameria cistoidea* Hook. & Arn.**

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Nombre vulgar: Pacul, chañarcillo.

***Krameria lappacea* (Dombey) Burdet & B.B. Simpson**
Sinónimos: *Landia lappacea* Dombey, *Krameria triandra*
Ruiz & Pav. var. *humboldtiana* Chodat, *Krameria iluca*
Phil., *Krameria pentapetala* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

LAMIACEAE

Cuminia

***Cuminia eriantha* (Benth.) Benth.**

Sinónimos: *Bystropogon erianthus* Benth., *Cuminia fernandezia* Colla, *Johowia fernandezia* (Colla) Epling & Looser, *Cuminia brevidens* Benth., *Skottsbergiella fernandezia* (Colla) Epling, *Cuminia eriantha* (Benth.) Benth. var. *fernandezia* (Colla) Harley
Arbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-500 m.

Galeopsis

***Galeopsis tetrahit* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA.

Gardoquia

***Gardoquia gilliesii* Graham**

Sinónimos: *Satureja gilliesii* (Graham) Briq., *Gardoquia chilensis* Benth., *Satureja chilensis* (Benth.) Briq., *Clinopodium chilense* (Benth.) Govaerts
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Oreganillo.

***Gardoquia multiflora* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Satureja multiflora* (Ruiz & Pav.) Briq., *Clinopodium multiflorum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Rizoa ovatifolia* Cav.
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Nombre vulgar: Menta de árbol.

Glechoma

***Glechoma hederacea* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA, LRI, LLA, MAG.

Kurzamra

***Kurzamra pulchella* (Clos) Kuntze**

Sinónimos: *Soliera pulchella* Clos, *Micromeria pulchella* (Clos) Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3500-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Poleo de cordillera.

Lamium

***Lamium amplexicaule* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

***Lamium purpureum* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Lepechinia

Lepechinia chilensis (Molina) R. Morales

Sinónimos: *Lepechinia chamaedryoides* (Balb.) Epling, *Rosmarinus chilensis* Molina, *Sphacele chilense* (Molina) Briq., *Sphacele chamaedryoides* (Balb.) Briq., *Sphacele campanulata* Benth., *Dracocephalum chamaedryoides* Balb., *Phytoxis sidertifolia* Molina, *Phytoxis acidissima* Molina, *Alguelagum chilense* (Molina) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Nombre vulgar: Salvia, salvia macho, lahuén, alhuelaluén.

Lepechinia salviae (Lindl.) Epling

Sinónimos: *Sphacele salviae* (Lindl.) Briq., *Sphacele lindleyi* Benth., *Stachys salviae* Lindl., *Gardoquia salviaefolia* Colla, *Alguelagum salviae* (Lindl.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Nombre vulgar: Salvia, salvia blanca, lahuenlahuén.

Lepechinia subhastata (Benth.) Epling

Sinónimos: *Sphacele subhastata* Benth., *Alguelagum subhastatum* (Benth.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Lycopus

Lycopus europaeus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LRI, LLA.

Marrubium

Marrubium vulgare L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, JFE.

Melissa

Melissa officinalis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Mentha

Mentha aquatica L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Mentha pulegium L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Mentha suaveolens Ehrh.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Mentha x piperita L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Micromeria

Micromeria darwinii Benth.

Sinónimos: *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze, *Clinopodium darwinii* (Benth.) Kuntze var. *pusilla* (Phil.) Epling, *Satureja darwinii* (Benth.) Briq., *Satureja pusilla* Macloskie, *Micromeria darwinii* Benth. var. *pusilla* (Phil.) Spig., *Micromeria pusilla* Phil.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Micromeria gilliesii Benth.

Sinónimos: *Clinopodium gilliesii* (Benth.) Kuntze, *Satureja parvifolia* (Phil.) Epling, *Satureja gilliesii* (Benth.) Briq., *Oreosphacus parvifolia* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 1200-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Muña.

Molucella

Molucella laevis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

Prunella

Prunella vulgaris L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Salvia

Salvia gilliesii Benth.

Sinónimos: *Salvia cuspidata* Ruiz et Pav. subsp. *gilliesii* (Benth.) J.R.I. Wood, *Salvia gilliesii* Benth. var. *glandulosa* Griseb.

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Salvia rhombifolia Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Salvia pilosa* Vahl, *Salvia foliosa* Benth., *Salvia tafallae* Benth., *Salvia paposana* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Salvia tubiflora Sm.

Sinónimos: *Salvia biflora* Ruiz & Pav., *Salvia excisa* Ruiz & Pav., *Salvia scrobiculata* Meyen, *Salvia biflora* Ruiz & Pav. var. *glabrata* Benth.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

Salvia verbenaca L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

Scutellaria

Scutellaria nummulariifolia Hook.f.

Sinónimos: *Cruzia serpyllacea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Scutellaria racemosa Pers.

Sinónimos: *Scutellaria rojasii* Briq., *Scutellaria rumicifolia* Kunth, *Scutellaria hastata* Larrañaga, *Scutellaria heterophylla* Willd. ex Benth., *Scutellaria bonariensis* Willd. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Scutellaria valdiviana (Clos) Epling

Sinónimos: *Theresa valdiviana* Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, BIO, LRI.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Stachys

Stachys albicaulis Lindl.

Sinónimos: *Stachys eriophylla* Briq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hierba de Santa María.

Stachys arvensis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, LLA, JFE, IPA.

Stachys bridgesii Benth.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Nombre vulgar: Hierba de Santa Rosa.

Stachys eremicola Epling

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Stachys gilliesii Benth.

Sinónimos: *Stachys petiolosa* Briq.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Stachys grandidentata Lindl.

Sinónimos: *Stachys toronjicillo* Phil., *Stachys closi* Phil.,

Stachys serrata Clos

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2900 m.

Nombre vulgar: Hierba santa.

Stachys macraei Benth.

Sinónimos: *Stachys chonotica* Hook.f.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Stachys ochroleuca Phil.

Sinónimos: *Stachys litoralis* Phil., *Stachys dubia* Briq., *Stachys rupestris* Phil., *Stachys meyeniana* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Stachys pannosa Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Stachys philippiana Vatke

Sinónimos: *Stachys andina* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Stachys sericea Cav.

Sinónimos: *Stachys glabrata* Phil., *Stachys sidertidoides* Gillies ex Benth., *Stachys candidissima* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

Stachys truncata Kunze ex Benth.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, MAU, AIS.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Teucrium

Teucrium bicolor Sm.

Sinónimos: *Teucrium orchideum* Lindl., *Teucrium cavanilliesii* Bertero ex Steud., nom. nud., *Teucrium chilense* Desf. ex Steud., nom. nud., *Teucrium heterophyllum* Cav.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

Nombre vulgar: Oreganillo.

Teucrium nudicaule Hook.

Sinónimos: *Teucrium leucanthum* Phil., *Teucrium nudicaule* Hook. var. *leucanthum* (Phil.) Epling, *Teucrium tripartitum* Meyen

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2100 m.

LARDIZABALACEAE

Boquila

Boquila trifoliolata (DC.) Decne.

Sinónimos: *Lardizabala trifoliolata* DC., *Lardizabala funaria* (Molina) Looser, *Cogygia ternata* Molina, *Dolichos funarius* Molina, *Boissiera trifoliata* Dombey ex DC., nom. nud., *Boquila discolor* Decne., *Lardizabala discolor* Kunze ex Poepp. & Endl.

Arbusto trepador. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pilpilvoqui, voqui blanco, voqui pil-pil.

Lardizabala

Lardizabala biternata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Cogygia biternata* (Ruiz & Pav.) Molina, *Boissiera triternata* Dombey ex DC., nom. nud., *Lardizabala triternata* Ruiz & Pav., *Lardizabala infuscata* Miers, *Lardizabala sylvicola* Miers, *Cogygia triternata* (Ruiz & Pav.) Molina

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Cóguil, coguilera, voqui-cóguil, collivoqui, voqui blanco, huipinga, coile.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

LAURACEAE

Beilschmiedia

Beilschmiedia berteroaana (Gay) Kosterm.

Sinónimos: *Cryptocarya berteroaana* Gay, *Bellota nitida* Phil., *Cryptocarya nitida* Phil., *Boldu chilinum* Nees ex Meisn., *Boldu nitidum* (Phil.) Meisn., *Bellota pauciflora* Phil.

Árbol. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Belloto, belloto del centro.

Beilschmiedia miersii (Gay) Kosterm.

Sinónimos: *Bellota miersii* Gay, *Boldu chilinum* Nees

Árbol. Endémico.

Distribución: VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Belloto, belloto del norte.

Cryptocarya

Cryptocarya alba (Molina) Looser

Sinónimos: *Peumus rubra* Molina, *Peumus alba* Molina, *Cryptocarya rubra* (Molina) Skeels, *Peumus mammosa* Molina, *Laurus peumus* Molina, *Cryptocarya peumus* Nees, *Icosandra rufescens* Phil., *Cryptocarya stenantha* Phil., *Cryptocarya peumus* Nees var. *stenantha* (Phil.) Mez, *Cryptocarya peumus* Nees var. *laxiflora* Phil. ex Mez, *Cryptocarya laxiflora* Phil., *Cryptocarya peumo* (Dombey ex Lam.) Kosterm., *Cryptocarya mammosa* (Molina) Kosterm., *Laurus peumo* Dombey ex Lam.

Árbol. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Peumo.

Persea

Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees

Sinónimos: *Persea meyeniana* Nees, *Laurus linguy* Miers ex Bertero, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *canescens* Nees, *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees var. *palustris* Nees, *Persea intermedia* Phil., *Nothaphoebe lingue* Baeza, *Nothaphoebe meyeniana* Baeza, *Laurus lingue* Ruiz & Pav.

Árbol. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lingue.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula

Pinguicula antarctica Vahl

Sinónimos: *Pinguicula magellanica* Comm. ex Franch.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Flor de pantano, violeta cimarrona, violeta de pantano, grasilla.

Pinguicula chilensis Gay

Sinónimos: *Pinguicula antarctica* Donat, hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Utricularia

Utricularia gibba L.

Sinónimos: *Utricularia gayana* A.DC., *Utricularia tenuis* Cav., *Utricularia tenuis* Cav. var. *poepigii* A. DC.

Hierba acuática. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Chupa bichos, bolsita de agua, manguera.

LINACEAE

Cliococca

Cliococca selaginoides (Lam.) C.M. Rogers & Mildner

Sinónimos: *Linum selaginoides* Lam., *Cliococca tenuifolia* Bab., *Linum babingtonii* Planch., *Linum selaginoides* Lam. var. *chilense* Planch., *Linum microphyllum* Larrañaga

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Merulahuén.

Linum

Linum bienne Mill.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Linum catharticum L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Linum chamissonis Schiede

Sinónimos: *Linum aquilinum* Molina var. *grandiflorum* Hook. & Arn., *Linum oligophyllum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Linum macraei* Benth. var. *cumingii* Urban

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Ñanco, ñancolahuén, retamilla, nanco, nancolahuén.

Linum cremnophilum I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Linum macraei Benth. var. *macraei*

Sinónimos: *Linum aquilinum* Molina, *Mesyinium chilense*

Raf., *Linum chironioides* Griseb., *Linum macraei* Benth. var. *olygophyllum* (Hook. & Arn.) Reiche, *Linum cumingii* Lodd.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Ñancolahuén.

Linum macraei Benth. var. *marticorenae* Mildner

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Linum prostratum Dombey ex Lam.

Sinónimos: *Linum paposanum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 200-1000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Linum ramosissimum Gay

Sinónimos: *Linum obtusifolium* Phil., *Linum chamissonis*

Schiede var. *obtusifolium* (Phil.) Reiche, *Linum chamissonis*

Schiede var. *ramosissimum* (Gay) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Linum usitatissimum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, NUB, BIO, ARA, JFE.

LINDERNIACEAE

Lindernia

Lindernia dubia (L.) Pennell

Sinónimos: *Gratiola dubia* L., *Lindernia dubia* (L.) Pennell

var. *anagallidea* (Michx.) Cooperr.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

LOASACEAE

Blumenbachia

Blumenbachia dissecta (Hook. & Arn.) Weigend & Grau

Sinónimos: *Loasa dissecta* Hook. & Arn., *Caiophora*

espigneira (Gay) Urb. & Gilg, *Blumenbachia espigneira*

Gay, *Caiophora dissecta* (Hook. & Arn.) Urb. & Gilg,

Loasa microcalyx Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Países limítrofes: Argentina.

Blumenbachia prietea Gay

Sinónimos: *Caiophora prietea* (Gay) Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Blumenbachia silvestris Poepp.

Sinónimos: *Caiophora silvestris* (Poepp.) Urb. & Gilg,

Caiophora scandens Meyen & Klotzsch ex Walp.,

Caiophora silvestris (Poepp.) Urb. & Gilg var. *mitis*

(Phil.) Urb. & Gilg, *Caiophora tomentosula* Urb. & Gilg,

Blumenbachia mitis Phil., *Blumenbachia domeykoana*

Phil., *Loasa ochagaviae* Phil., *Loasa volckmanni* Phil.,

Blumenbachia nemorosa Phil., *Blumenbachia scandens*

Meyen

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

Caiophora

Caiophora chuquitensis (Meyen) Urb. & Gilg

Sinónimos: *Loasa chuquitensis* Meyen, *Blumenbachia*

chuquitensis (Meyen) Hook. f., *Caiophora superba* Phil.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Caiophora cirsiifolia C. Presl

Sinónimos: *Caiophora sepiaria* (Ruiz & Pav. ex G. Don)

J.F. Macbr., *Blumenbachia sepiaria* Ruiz & Pav. ex G. Don

Hierba trepadora. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Países limítrofes: Perú.

Caiophora coronata (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Loasa coronata* Gillies ex Arn., *Blumenbachia*

coronata (Gillies ex Arn.) Hieron., *Caiophora absinthiifolia*

C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Ortiguilla.

Caiophora deserticola Weigend & M. Ackermann

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Países limítrofes: Perú.

Caiophora rosulata (Wedd.) Urb. & Gilg
Sinónimos: *Loasa rosulata* Wedd., *Caiophora anemonoides*
Urb. & Gilg, *Caiophora rahmeri* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Países limítrofes: Bolivia.

Grausa

Grausa gayana (Urb. & Gilg) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa sagittata* auct. non Hook. & Arn., *Loasa gayana* Urb. & Gilg
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA.

Grausa lateritia (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa acaulis* (Phil.) Urb. & Gilg, *Blumenbachia acaulis* Phil., *Loasa lateritia* Gillies ex Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.

Grausa martinii (Phil.) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa martinii* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA.

Grausa micrantha (Poepp.) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa remyi* Gay, *Loasa micrantha* Poepp.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Grausa sagittata (Hook. & Arn.) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa sagittata* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.

Huidobria

Huidobria chilensis Gay
Sinónimos: *Loasa chilensis* (Gay) Urb. & Gilg
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.

Huidobria fruticosa Phil.
Sinónimos: *Loasa fruticosa* (Phil.) Urb. & Gilg
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Loasa

Loasa acanthifolia Desr.
Sinónimos: *Loasa punicea* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ortiga brava.

Loasa acerifolia Dombey ex Juss.
Sinónimos: *Loasa furcata* Phil., *Loasa solaniifolia* Gay,
Loasa williamsi Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI,
LLA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Ortiga brava.

Loasa argentina Urb. & Gilg
Sinónimos: *Loasa patagonica* Urb. & Gilg, nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Loasa arnottiana Gay
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.

Loasa caespitosa Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.

Loasa elongata Hook. & Arn.
Sinónimos: *Loasa bertrandii* Phil., *Loasa urmenetae* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Loasa floribunda Hook. & Arn.
Sinónimos: *Loasa floribunda* Hook. & Arn. var.
brachysepala Urb. & Gilg
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.

Loasa heterophylla Hook. & Arn.
Sinónimos: *Loasa aphanantha* Urb. & Gilg, *Loasa parviflora* Phil., hom. illeg., *Loasa insons* Poepp. var.
prostrata Poepp., *Loasa barneoudii* Gay, *Loasa elongata*
Phil., nom. nud., *Loasa subandina* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Países limítrofes: Argentina.

Loasa humilis Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Loasa illapelina Phil.
Sinónimos: *Loasa illapelina* Phil. var. *laciniata* (Phil.) Urb.
& Gilg, *Loasa leucantha* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.

Loasa insons Poepp.

Sinónimos: *Loasa intricata* Gay, *Loasa tricolor* Ker Gawl.
var. *insons* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Loasa meyeniana* Walp.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Países limítrofes: Argentina.

Loasa mollensis Muñoz-Schick & Trenquallye

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL.

Loasa multifida Gay

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.

Loasa nitida Desr.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ANT.

Loasa pallida Gillies ex Arn.

Sinónimos: *Loasa aldunatea* Gay
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

Loasa paradoxa Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.

Loasa placei Lindl.

Sinónimos: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *placei* (Lindl.)
Urb. & Gilg
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Loasa prostrata Gillies ex Arn.

Sinónimos: *Loasa tricolor* Ker Gawl. var. *prostrata* (Gillies
ex Arn.) Urb. & Gilg, *Loasa prostrata* Gillies ex Arn. var.
cumingii Hook. & Arn., *Loasa alba* D. Don
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Loasa sclareifolia Juss.

Sinónimos: *Loasa sclareifolia* Juss. var. *brachycarpa* Urb.
& Gilg, *Loasa sclareifolia* Juss. var. *inermis* Urb. & Gilg,
Loasa sclareifolia Juss. var. *nemoralis* (Phil.) Urb. & Gilg,
Loasa nemoralis Phil.
Hierba. Bienal o perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ortiga brava.

Loasa sigmoidea Urb. & Gilg

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Países limítrofes: Argentina.

Loasa tricolor Ker Gawl.

Sinónimos: *Loasa bryoniaefolia* Schrad. ex DC.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cardito.

Loasa triloba Dombey ex Juss.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI.

Mentzelia

Mentzelia albescens (Gillies ex Arn.) Griseb.

Sinónimos: *Bartonia albescens* Gillies ex Arn., *Bartonia
sinuata* C. Presl, *Nuttallia albescens* (Gillies ex Arn.)
Standl.
Hierba. Bienal. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Países limítrofes: Argentina.

Mentzelia bartonioides (C. Presl) Urb. & Gilg

Sinónimos: *Mentzelia andina* I.M. Johnst., hom. illeg.,
Mentzelia pinnatifida Sleumer, hom. illeg., *Acrolasia
bartonioides* C. Presl, *Acrolasia solieri* Gay, *Mentzelia
solieri* (Gay) Urb. & Gilg ex Urb., *Mentzelia pinnatifida*
(Phil.) Urb. & Gilg, *Mentzelia andina* Urb. & Gilg, *Acrolasia
bartonioides* Gay, hom. illeg., *Acrolasia pinnatifida* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Países limítrofes: Argentina.

Mentzelia scabra Kunth subsp. *atacamensis* (Urb. & Gilg)

Weigend
Sinónimos: *Mentzelia chilensis* Gay var. *atacamensis* Urb.
& Gilg
Subarbusto. Endémico.
Distribución: AYP, ANT, COQ.

Mentzelia scabra Kunth subsp. *chilensis* (Gay) Weigend

Sinónimos: *Mentzelia ignea* (Phil.) Urb. & Gilg, *Mentzelia
chilensis* Gay, *Loasa ignea* Phil.
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Países limítrofes: Bolivia.

Nasa

Nasa urens (Jacq.) Weigend
Sinónimos: *Loasa urens* Jacq.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Países limítrofes: Perú.

Pinnasa

Pinnasa bergii (Hieron.) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa bergii* Hieron.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Pinnasa nana (Phil.) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa nana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, ARA, LLA.
Países limítrofes: Argentina.

Pinnasa pinnatifida (Gillies ex Arn.) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa pinnatifida* (Gillies ex Arn., *Loasa bridgesii* Urb. & Gilg, *Loasa chillana* Urb. & Gilg, *Loasa filicifolia* Poepp., *Loasa acutiloba* Urb. & Gilg, *Loasa poeppigiana* Urb. & Gilg, *Loasa tripartita* Urb. & Gilg
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Países limítrofes: Argentina.

Pinnasa volubilis (Dombey ex Juss.) Weigend & R.H. Acuña
Sinónimos: *Loasa volubilis* Dombey ex Juss., *Loasa artemisiifolia* Poepp. ex Urb. & Gilg, *Loasa volubilis* Dombey ex Juss. var. *alpina* Poepp.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Presliophytum

Presliophytum malesherbioides (Phil.) R.H. Acuña & Weigend
Sinónimos: *Loasa malesherbioides* Phil., *Loasa longiseta* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Países limítrofes: Argentina.

Presliophytum sessiliflorum (Phil.) R.H. Acuña & Weigend
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.

Scyphanthus

Scyphanthus elegans Sweet
Sinónimos: *Grammatocarpus volubilis* C. Presl, *Scyphanthus stenocarpus* (Poepp.) Urb. & Gilg, *Grammatocarpus cumingii* C. Presl
Hierba trepadora. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Nombre vulgar: Monjita.

LORANTHACEAE

Desmaria

Desmaria mutabilis (Poepp. & Endl.) Tiegh. ex T. Durand & B.D. Jacks.
Sinónimos: *Loranthus mutabilis* Poepp. & Endl., *Phrygilanthus mutabilis* (Poepp. & Endl.) Eichl., *Gaiandendron mutabile* (Poepp. & Endl.) Engl. & Prantl.
Arbusto parásito. Endémico.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1700 m.

Ligaria

Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.
Sinónimos: *Loranthus cuneifolius* Ruiz & Pav., *Ligaria coronata* Tiegh., *Loranthus linearifolius* Bertero
Arbusto parásito. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Notanthera

Notanthera heterophylla (Ruiz & Pav.) G. Don
Sinónimos: *Loranthus heterophyllus* Ruiz & Pav., *Phrygilanthus berteroi* (Hook. & Arn.) Eichler, *Loranthus buxifolius* Cham. & Schldt., *Loranthus eschscholzianus* Mart. ex Schult. & Schult.f., *Loranthus valdivianus* Miq., *Loranthus berteroi* Hook. & Arn., *Psittacanthus berteroi* (Hook. & Arn.) G. Don, *Phrygilanthus heterophyllus* (Ruiz & Pav.) Eichler
Arbusto parásito. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Quintral del boldo.

Tristerix

Tristerix aphyllus (DC.) Barlow & Wiens
Sinónimos: *Phrygilanthus aphyllus* (DC.) Eichler fma. *luteus* Follmann, *Loranthus aphyllus* DC., *Loranthus cactorum* Hook. & Arn., *Phrygilanthus aphyllus* (DC.) Eichler, *Loranthus pumilus* Miers ex Schult. & Schult.f.
Arbusto parásito. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Nombre vulgar: Quintral del quisco.

Tristerix corymbosus (L.) Kuijt
Sinónimos: *Phrygilanthus tetrandus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Loranthus tetrandus* Ruiz & Pav., *Lonicera corymbosa* L., *Tristerix tetrandus* (Ruiz & Pav.) Mart., *Loranthus corymbosus* (L.) Desr., *Loranthus utui* Molina
Arbusto parásito. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quintral.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Tristerix verticillatus (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens
Sinónimos: *Phrygilanthus verticillatus* (Ruiz & Pav.) Eichler, *Loranthus verticillatus* Ruiz & Pav., *Metastachys verticillata* (Ruiz & Pav.) Tiegh., *Notanthera verticillata* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Loranthus sternbergianus* Schult. & Schult.f., *Notanthera sternbergianus* (Schult. f.) G. Don, *Phrygilanthus sternbergianus* (Schult. f.) Reiche, *Loranthus poeppigii* DC., *Notanthera poeppigii* (DC.) G. Don
Arbusto parásito. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Quintral.

LYTHRACEAE

Ammannia

Ammannia coccinea Rottb.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU.

Ammannia latifolia L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU.

Lythrum

Lythrum hyssopifolia L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Lythrum maritimum Kunth
Sinónimos: *Lythrum album* auct. non Kunth, *Lythrum albicaule* Bertero
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, VAL, RME, JFE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Lythrum portula (L.) D.A. Webb
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ARA, LLA.

Lythrum salicaria L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, LLA.

Pleurophora

Pleurophora polyandra Hook. & Arn.
Sinónimos: *Pleurophora polyandra* Hook. & Arn. fma. *squarrosa* (Steud.) Koehne, *Pleurophora uncinata* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 200-2000 m.

Pleurophora pungens D. Don
Sinónimos: *Pleurophora pungens* D. Don fma. *imbricata* Koehne
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Nombre vulgar: Lengua de gallina.

Pleurophora pusilla Hook. & Arn.
Sinónimos: *Pleurophora pusilla* Hook. & Arn. fma. *vestita* Koehne, *Pleurophora pilosiuscula* Gay var. *glabra* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-900 m.

MALPIGHIACEAE

Dinemagonum

Dinemagonum gayanum A. Juss.

Sinónimos: *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss., *Dinemagonum maculigerum* Phil., *Dinemagonum albicaule* Phil., *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *albicaule* (Phil.) Reiche, *Dinemagonum gayanum* A. Juss. var. *bridgesianum* (A. Juss.) Reiche, *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. fma. *glanduloso-bracteolata* Nied., *Dinemagonum bridgesianum* A. Juss. var. *parvifolium* Nied.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Nombre vulgar: Té de burro, pingo blanco.

Dinemandra

Dinemandra ericoides A. Juss.

Sinónimos: *Dinemandra glaberrima* A. Juss., *Dinemandra strigosa* Phil., *Dinemandra ramosissima* Phil., *Dinemandra subaptera* Phil., *Dinemandra glauca* Baill., *Dinemandra ericoides* A. Juss. var. *triandra* Nied., *Dinemandra glaberrima* A. Juss.

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-2800 m.

Nombre vulgar: Té de burro, té bravo, colorado.

MALVACEAE

Abutilon

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

Arbusto o subarbusto. Introducido.

Distribución: ANT.

Andeimalva

Andeimalva chilensis (Gay) J.A. Tate

Sinónimos: *Malacothamnus chilensis* (Gay) Krapov., *Sphaeralcea glabrata* Phil., *Sphaeralcea grandifolia* Phil., *Sphaeralcea capitata* Phil., *Sphaeralcea viridis* Phil., *Sphaeralcea peteroana* Phil., *Sphaeralcea chilensis* Gay, *Sphaeroma chilense* (Gay) Kuntze, *Sphaeroma glabratum* (Phil.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 300-3000 m.

Anoda

Anoda cristata (L.) Schlttdl.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Corynabutilon

Corynabutilon bicolor (Phil. ex K. Schum.) Kearney

Sinónimos: *Abutilon bicolor* Phil. ex K. Schum.

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 200-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Matamora, malva.

Corynabutilon ceratocarpum (Hook. & Arn.) Kearney

Sinónimos: *Sida ceratocarpa* Hook. & Arn., *Abutilon ceratocarpum* (Hook. & Arn.) Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 700-2400 m.

Nombre vulgar: Huella.

Corynabutilon hirsutum (Phil.) A.E. Martic.

Sinónimos: *Anoda hirsuta* Phil., *Abutilon hirsutum* (Phil.)

Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 300-500 m.

Corynabutilon ochsenii (Phil.) Kearney

Sinónimos: *Anoda ochsenii* Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil., *Abutilon ochsenii* (Phil.) Phil. ex F. Phil.

var. *stellaris* Reiche, *Abutilon garckeii* Baker f.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Corynabutilon salicifolium (Reiche) Krapov.

Sinónimos: *Abutilon salicifolium* Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Corynabutilon viride (Phil.) A.E. Martic.

Sinónimos: *Abutilon viride* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 1000-1800 m.

Corynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney
Sinónimos: *Sida vitifolia* Cav., *Abutilon vitifolium* (Cav.) D. Don, *Sidalcea triloba* Turcz.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Nombre vulgar: Huella.

Cristaria

Cristaria adenophora I.M. Johnst.
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2400-3300 m.

Cristaria andicola Gay
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Malvilla, primavera.

Cristaria argyliifolia Phil.
Sinónimos: *Cristaria aspera* Gay var. *pilosa* (Phil.) Reiche, *Cristaria pilosa* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 300-700 m.

Cristaria aspera Gay var. *aspera*
Sinónimos: *Cristaria intermedia* Gay, *Cristaria urmenetae* Phil., *Cristaria lata* Turcz.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Cristaria aspera Gay var. *formosula* (I.M. Johnst.) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Cristaria formosula* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Cristaria aspera Gay var. *sadae* (Phil.) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Cristaria sadae* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Cristaria calderana Muñoz-Schick
Hierba. Anual o perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Cristaria cordato-rotundifolia Gay
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1300-2500 m.

Cristaria cyanea Phil. ex Baker f.
Sinónimos: *Cristaria cyanea* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1000-2400 m.
Nombre vulgar: Malvilla negra.

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. *dissecta*
Sinónimos: *Lecanophora dissecta* (Hook. & Arn.) Speg., *Cristaria flexuosa* Phil., *Cristaria ovallea* Gay, *Cristaria univittata* Hochr., *Cristaria glandulosa* Phil. non *Cristaria* Phil. 1864 non *C. glandulosa* Phil. 1864
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 100-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Malvavisco, malva.

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. *glandulosa* (Phil.) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Cristaria glandulosa* Phil., *Cristaria glomerulata* I.M. Johnst., *Cristaria saniculaefolia* Phil. ex Baker f., *Cristaria saniculifolia* Phil.
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 300-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cristaria dissecta Hook. & Arn. var. *inconspicua* (F. Phil.) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Cristaria inconspicua* F. Phil.
Hierba. Anual o perenne. Nativa.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2700-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Cristaria fuentesiana I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 100-800 m.

Cristaria glaucophylla Cav. var. *eriantha* (Hook. & Arn.) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Cristaria australis* Phil., *Cristaria eriantha* Hook. & Arn., *Sida eriantha* (Hook. & Arn.) Steud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Cristaria glaucophylla Cav. var. ***glaucophylla***

Sinónimos: *Lecanophora glaucophylla* (Cav.) Speg., *Cristaria betonicaefolia* Pers., *Cristaria carrizalensis* Phil., *Cristaria glaucophylla* Cav. var. *simplex* Reiche, *Cristaria haenkeana* C. Presl, *Cristaria hirsuta* C. Presl, *Cristaria hispida* Phil., hom. illeg., *Cristaria pannosa* Phil. ex Reiche, *Cristaria trichocaula* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Cristaria gracilis Gay

Sinónimos: *Cristaria divaricata* Phil. ex Baker f., *Cristaria humilis* Phil., *Cristaria patens* Phil., *Cristaria ranunculifolia* Phil. ex Baker f., *Cristaria divaricata* Phil. var. *hirsuta* Phil., *Cristaria divaricata* Phil., hom. illeg., *Cristaria ranunculifolia* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-4200 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Malvilla.

Cristaria insularis F. Phil. var. ***insularis***

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Cristaria insularis F. Phil. var. ***johowii*** (Skotts.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria johowii* Skotts.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Cristaria integerrima Phil. var. ***integerrima***

Sinónimos: *Cristaria diaziana* I.M. Johnst., *Cristaria foliosa* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil. ex Baker f., *Cristaria intonsa* I.M. Johnst., *Cristaria oxyptera* Phil., *Cristaria paposana* I.M. Johnst., *Cristaria rotundifolia* Phil., *Cristaria borchersii* Phil., *Cristaria setosa* Phil., *Cristaria larrañagae* Phil., *Cristaria grandidentata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Cristaria integerrima Phil. var. ***lobulata*** (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria lobulata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 200-500 m.

Cristaria leucantha I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Cristaria molinae Gay

Sinónimos: *Cristaria diversifolia* Phil. fma. *parvula* (Phil.) I.M. Johnst., *Cristaria grandiflora* Turcz., *Cristaria heterophylla* Phil., hom. illeg., *Cristaria trifida* Phil., *Cristaria parvula* Phil., *Cristaria diversifolia* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Cristaria multiflora Gay

Sinónimos: *Cristaria glabrata* Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Cristaria ovata Muñoz-Schick

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Cristaria tenuissima Muñoz-Schick

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ANT.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Cristaria viridiluteola Gay var. ***pinnata*** (Phil.) Muñoz-Schick

Sinónimos: *Cristaria pinnata* Phil., *Cristaria thinophila* I.M. Johnst.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Cristaria viridiluteola Gay var. ***viridiluteola***

Sinónimos: *Cristaria bipinnatifida* Phil., *Cristaria viridiluteola* Gay var. *geraniifolia* (C. Presl) Reiche, *Cristaria seselifolia* Turcz., *Cristaria bipinnata* Phil.

Hierba. Anual o perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Malvilla, malvilla salada.

Gossypium

Gossypium barbadense L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IPA.

Hibiscus

Hibiscus trionum L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, BIO.

Lecanophora

Lecanophora subacaulis Krapov.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Malva

Malva assurgentiflora (Kellogg) M.F. Ray

Arbusto. Introducido.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, MAU, JFE.

Malva dendromorpha M.F. Ray

Subarbusto. Introducido.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, LLA.

Malva moschata L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LLA, AIS.

Malva neglecta Wallr.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, ARA.

Malva nicaeensis All.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Malva parviflora L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.

Malva sylvestris L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, VAL, RME, AIS.

Malva verticillata L.

Arbusto. Introducido.
Distribución: ANT.

Malvastrum

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

Subarbusto. Introducido.

Distribución: TAR, RME, IPA.

Malvella

Malvella leprosa (Ortega) Krapov.

Sinónimos: *Malva albifolia* Larrañaga, *Malva leprosa* Ortega, *Malva sulphurea* Gillies ex Hook. & Arn., *Malvastrum sulfureum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb., *Sida hederacea* (Douglas) Torr., *Sida hederacea* (Douglas) Torr. var. *sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) Baker f., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum., *Sida leprosa* (Ortega) K. Schum. var. *sulphurea* (Hook. & Arn.) Hochr., *Sida sulphurea* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray, *Disella hederacea* (Douglas ex Hook.) Greene, *Malva hederacea* Douglas ex Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Modiola

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Nototriche

Nototriche alternata A.W. Hill

Sinónimos: *Nototriche sajamentis* (Hieron.) A.W. Hill, *Malvastrum sajamentis* Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 4000-5000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nototriche anthemidifolia (J. Remy) A.W. Hill

Sinónimos: *Malvastrum anthemidifolium* (J. Remy) A. Gray, *Sida anthemidifolia* J. Remy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3500-4800 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nototriche argentea A.W. Hill

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4500 m.

Países limítrofes: Perú.

Nototriche auricoma (Phil.) A.W. Hill

Sinónimos: *Malvastrum auricomum* Phil., *Malvastrum*

auricomum Phil. ex Baker f.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4200-4700 m.

Nototriche clandestina (Phil.) A.W. Hill
Sinónimos: *Malvastrum clandestinum* (Phil.) Baker f., *Sida clandestina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3000-5100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Altea.

Nototriche compacta (A. Gray) A.W. Hill
Sinónimos: *Malvastrum compactum* A. Gray, *Malvastrum megalorrhizum* (Phil.) Baker f., *Sida compacta* Gay, hom. illeg., *Sida macrorrhiza* Phil. ex Baker f., nom. nud., *Sida megalorrhiza* Phil., *Nototriche holosericea* A.W. Hill, *Nototriche megalorrhiza* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1900-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Mostaza.

Nototriche diminutiva (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Malva diminutiva* Phil., *Malvastrum diminutivum* (Phil.) Baker f.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3800-4000 m.

Nototriche estipulata A.W. Hill ex B.L. Burt
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4700 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Oqelatalata, tanitani, psike de cordillera.

Nototriche hillii Krapov.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 4000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nototriche leucosphaera A.W. Hill
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4300-4600 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Nototriche meyenii Ulbr.
Sinónimos: *Sida borussica* Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4800 m.
Países limítrofes: Perú.

Nototriche nana A.W. Hill
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3700-4600 m.

Nototriche obcuneata (Baker f.) A.W. Hill var. *cinerea* A.W. Hill
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4400-4900 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Nototriche obcuneata (Baker f.) A.W. Hill var. *obcuneata*
Sinónimos: *Malvastrum obcuneatum* Baker f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4400 m.
Países limítrofes: Perú.

Nototriche orbignyana (Wedd.) A.W. Hill
Sinónimos: *Malvastrum orbignyanum* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4400-4500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nototriche ovata Krapov.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 3800-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nototriche parviflora (Phil.) A.W. Hill
Sinónimos: *Malvastrum parviflorum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4100-5000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Layo.

Nototriche philippii A.W. Hill
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nototriche pulverulenta B.L. Burt & A.W. Hill

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 4200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nototriche pulvinata A.W. Hill

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4900 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Nototriche pusilla A.W. Hill

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3800-4800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nototriche pygmaea (J. Remy) A.W. Hill

Sinónimos: *Malvastrum pygmaeum* (J. Remy) A. Gray,
Nototriche werdermannii Ulbr., *Sida pygmaea* J. Remy
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3500-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nototriche rugosa (Phil.) A.W. Hill

Sinónimos: *Malvastrum pedicularifolium* (Meyen) A. Gray
var. *rugosum* (Phil.) Reiche, *Malvastrum rugosum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1900-4600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Malva.

Nototriche stipularis (Phil.) A.E. Martic.

Sinónimos: *Malvastrum stipulare* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4400 m.
Países limítrofes: Bolivia.

Nototriche turritella A.W. Hill

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3600-4600 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Palaua

Palaua concinna (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Sida concinna* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Palaua dissecta Benth.

Sinónimos: *Palaua bipinnatifida* Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 100-400 m.
Países limítrofes: Perú.

Palaua inconspicua I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Perú.

Palaua modesta (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Sida modesta* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 300-400 m.

Sida

Sida rhombifolia L.

Hierba o subarbusto. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: COQ, IPA.

Sida spinosa L.

Subarbusto. Introducido.
Distribución: AYP, ATA.

Sphaeralcea

Sphaeralcea obtusiloba (Hook.) G. Don

Sinónimos: *Malva obtusiloba* Hook., *Sphaeralcea gayana*
Phil., *Sphaeralcea berteriana* Phil., *Sphaeralcea collina*
Phil., *Sphaeralcea floribunda* Phil., *Sphaeralcea rupestris*
Phil., *Sphaeralcea coquimbana* Phil., *Sphaeralcea vidali*
Phil., *Sphaeralcea circinata* Phil., *Sphaeroma obtusilobum*
(Gay) Kuntze, *Sphaeroma rupestre* (Phil.) Kuntze,
Sphaeroma valparadiseum (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma*
berteroana (Phil.) Kuntze, *Sphaeroma collinum* (Phil.)
Kuntze, *Sphaeroma coquimbarum* (Phil.) Kuntze,
Sphaeroma gayanum (Phil.) Kuntze, *Sphaeralcea arenaria*
Phil., *Sphaeralcea valparadisea* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Malvavisca, malva del cerro.

Sphaeralcea purpurata (Lindl.) Krapov.

Sinónimos: *Malva belloa* Gay, *Malva purpurata* Lindl.,
Malva purpurea Gay, *Malva tenuifolia* Hook. & Arn.,
Malvastrum belloum (Gay) A. Gray, *Malvastrum*

purpuratum (Lindl.) G. Nicholson, *Malvastrum tenuifolium* (Hook. & Arn.) Baker f., *Malva laeta* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Malva loca.

Tarasa

Tarasa antofagastana (Phil.) Krapov.
Sinónimos: *Malva antofagastana* Phil., *Malvastrum antofagastanum* (Phil.) Baker f., *Malveopsis antofagastana* (Phil.) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Tarasa congestiflora (I.M. Johnst.) Krapov.
Sinónimos: *Malvastrum congestiflorum* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2000-3800 m.
Países limítrofes: Perú.

Tarasa humilis (Gillies ex Hook. & Arn.) Krapov.
Sinónimos: *Malva humilis* Gillies ex Hook. & Arn., *Malva subacaulis* Phil., *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray, *Malvastrum humile* (Gillies ex Hook. & Arn.) A. Gray var. *subacaule* (Phil.) Reiche, *Malvastrum subacaule* (Phil.) Baker f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tarasa martiniana Krapov.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3000 m.

Tarasa operculata (Cav.) Krapov.
Sinónimos: *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray, *Malva operculata* Cav., *Tarasa rahmeri* Phil., *Malvastrum operculatum* (Cav.) Hochr., *Malva plumosa* C. Presl, *Malvastrum plumosum* (C. Presl) A. Gray var. *atacamensis* Baker f., *Tarasa rahmeri* Phil. var. *atacamensis* (Baker f.) Bruns
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1500-3800 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Malva, canchalagua.

Tarasa pediculata Krapov.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1800-3700 m.

Tarasa reichei (Phil.) Krapov.
Sinónimos: *Malva reichei* Phil., *Sida reichei* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Tarasa tarapacana (Phil.) Krapov.
Sinónimos: *Malva tarapacana* Phil., *Malvastrum tarapacanum* (Phil.) Baker f.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Tarasa tenella (Cav.) Krapov.
Sinónimos: *Malva tenella* Cav., *Malvastrum tenellum* (Cav.) Hieron.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-3800 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Malvilla, malva.

Tarasa umbellata Krapov.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, MAU.

Thespesia

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa
Árbol. Nativo.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Makoi (Rapa Nui).

Triumfetta

Triumfetta semitriloba Jacq.
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: IPA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hau hau (Rapa Nui).

Urocarpidium

Urocarpidium albiflorum Ulbr.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2600 m.
Países limítrofes: Perú.

Urocarpidium chilensis (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov.
Sinónimos: *Fuertesimalva chilensis* (A. Braun & C.D. Bouché) Fryxell, *Malva chilensis* A. Braun & C.D. Bouché
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 400-2200 m.
Países limítrofes: Perú.

Urocarpidium mathewsii (Turcz.) Krapov.
Sinónimos: *Malva mathewsii* Turcz.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Países limítrofes: Perú.

Urocarpidium peruvianum (L.) Krapov.
Sinónimos: *Malva peruviana* L., *Malvastrum peruvianum* (L.) A. Gray, *Fuertesimalva peruviana* (L.) Fryxell
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 100-2300 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Urocarpidium sanambrosianum D.M. Bates
Sinónimos: *Fuertesimalva sanambrosiana* (D.M. Bates) Fryxell
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: IDE.
Rango altitudinal: 200-500 m.

Waltheria

Waltheria indica L.
Subarbusto. Introducido.
Distribución: AYP, IPA.

MELIACEAE

Melia

Melia azedarach L.
Árbol. Introducido.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Miro tahiti (Rapa Nui).

MISODENDRACEAE

Misodendrum

Misodendrum angulatum Phil.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: NUB, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Misodendrum brachystachium DC.
Sinónimos: *Archiphyllum brachystachium* (DC.) Tiegh., *Archiphyllum macrophyllum* (Phil.) Tiegh., *Misodendrum macrophyllum* Phil.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Misodendrum gayanum Tiegh.
Sinónimos: *Misodendrum imbricatum* Hook.f., non Poepp. & Endl.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Países limítrofes: Argentina.

Misodendrum linearifolium DC.
Sinónimos: *Angelopogon linearifolium* (DC.) Poepp. ex Tiegh., *Misodendrum microphyllum* Hook. & Arn.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Misodendrum macrolepis Phil.
Subarbusto parásito. Endémico.
Distribución: LLA, AIS.

Misodendrum oblongifolium DC.
Sinónimos: *Archiphyllum oblongifolium* (DC.) Tiegh.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Cabello de ángel.

Misodendrum punctulatum DC.
Sinónimos: *Misodendrum imbricatum* Poepp. & Endl., *Misodendrum punctulatum* DC. var. *magellanicum* DC.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Injerto.

Misodendrum quadriflorum DC.
Sinónimos: *Telophyllum quadriflorum* (DC.) Tiegh.
Subarbusto parásito. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

MOLLUGINACEAE

Glinus

Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.
Sinónimos: *Mollugo radiata* Ruiz & Pav., *Mollugo araucana* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Hierba del pollo.

MONIMIACEAE

Laurelia

Laurelia sempervirens (Ruiz & Pav.) Tul.
Sinónimos: *Pavonia sempervirens* Ruiz & Pav., *Laurelia serrata* Bertero, *Laurelia aromatica* Juss. ex Poir., *Atherosperma sempervirens* (Ruiz & Pav.) Baill., *Thiga chilensis* Molina
Árbol. Endémico.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Laurel.

Laureliopsis

Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde
Sinónimos: *Laurelia philippiana* Looser
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tapa, huahuán, laurela.

Peumus

Peumus boldus Molina
Sinónimos: *Ruizia fragrans* Ruiz & Pav., *Peumus fragrans* (Ruiz & Pav.) Pers., *Boldoa fragrans* (Ruiz & Pav.) Gay, *Boldea boldus* (Molina) Looser, *Boldus chilensis* Molina, *Boldu chilinum* Nees
Árbol. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Boldo, boldu.

MONTIACEAE

Calandrinia

Calandrinia acaulis Kunth
Sinónimos: *Calandrinia megarhiza* Hemsl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Calandrinia affinis Gillies ex Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quiaca.

Calandrinia caespitosa Gillies ex Arn.
Sinónimos: *Calandrinia diffusa* Gillies ex Arn., *Calandrinia rupestris* Barnéoud, *Calandrinia densa* Phil., nom. illeg., *Calandrinia rupestris* Barnéoud var. *skottsbergii* (Gand.) Skotts., *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *skottsbergii* (Gand.) Añon, *Calandrinia densa* Reiche ex Peralta & D.I. Ford, nom. illeg., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *glomerata* Reiche, *Claytonia caespitosa* (Gillies ex Arn.) Kuntze, *Claytonia diffusa* (Gillies & Hook.) Kuntze, *Claytonia rupestris* (Barnéoud) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU, ARA, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC.
Sinónimos: *Talinum ciliatum* Ruiz & Pav., *Calandrinia caulescens* Kunth, *Calandrinia feltonii* Skotts.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Calandrinia colchaguensis Barnéoud
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Calandrinia compacta Barnéoud
Sinónimos: *Calandrinia occulta* Phil., *Calandrinia armeriifolia* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Países limítrofes: Argentina.

Calandrinia compressa Schrad. ex DC.
Sinónimos: *Calandrinia gaudichaudii* Barnéoud, *Calandrinia macilenta* Barnéoud, *Calandrinia procumbens* Moris, *Calandrinia virgata* Phil., *Calandrinia tenella* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Países limítrofes: Bolivia.

Calandrinia fuegiana Gand.

Sinónimos: *Calandrinia caespitosa* Gillies ex Arn. var. *australis* Skottsbo.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Calandrinia graminifolia Phil.

Sinónimos: *Calandrinia affinis* Gillies ex Arn. var. *graminifolia* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Calandrinia monandra (Ruiz & Pav.) DC.

Sinónimos: *Talinum monandrum* Ruiz & Pav., *Monocosmia corrigioloides* Fenzl, *Corrigiola deltoides* Hook. & Arn., *Monocosmia monandra* (Ruiz & Pav.) Baill.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Calandrinia nitida (Ruiz & Pav.) DC.

Sinónimos: *Calandrinia multicaulis* Phil., *Calandrinia axilliflora* Barnéoud, *Talinum diffusum* Colla, *Talinum nitidum* Ruiz & Pav.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, LRI.

Calandrinia ranunculina J.M. Watson, A.R. Flores & Elvebakk

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Países limítrofes: Argentina.

Calandrinia skottsbergii Gand.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, AIS.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe

Cistanthe amarantoides (Phil.) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Philippiamra amarantoides* (Phil.) Kuntze, *Silvaea amarantoides* Phil., *Silvaea corrigioloides* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Nombre vulgar: Anojarjinchu.

Cistanthe arancioana Peralta

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.

Cistanthe arenaria (Cham.) Carolin ex Hershkovitz

Sinónimos: *Calandrinia arenaria* Cham., *Calandrinia chamissoi* Barnéoud, *Calandrinia arenaria* Cham. var. *chamissoi* (Barnéoud) Reiche, *Calandrinia arenaria* Cham. var. *subverticillata* (Phil.) Reiche, *Calandrinia arenaria* Cham. var. *vicina* (Phil.) Reiche, *Calandrinia solisii* Phil., *Calandrinia nana* Phil., *Calandrinia subverticillata* Phil., *Talinum trigonum* Colla, *Calandrinia venulosa* Hook. & Arn., *Claytonia trigona* (Colla) Kuntze
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe cabreræ (Añon) Peralta

Sinónimos: *Calandrinia cabreræ* Añon
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe cachinalensis (Phil.) Peralta & D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia taltalensis* I.M. Johnst., *Calandrinia cachinalensis* Phil.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Cistanthe calycina (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sinónimos: *Calandrinia calycina* Phil., *Calandrinia bochersii* Phil., nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Cistanthe celosioides (Phil.) Carolin ex Hershkovitz

Sinónimos: *Philippiamra celosioides* (Phil.) Kuntze, *Philippiamra fastigiata* (Phil.) Pax & K. Hoffm., *Philippiamra pachyphylla* (Phil.) Kuntze, *Silvaea capitata* Phil., *Silvaea celosioides* Phil., *Silvaea fastigiata* Phil., *Silvaea pachyphylla* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Básal.

Cistanthe cephalophora (I.M. Johnst.) Carolin ex Hershkovitz

Sinónimos: *Calandrinia cephalophora* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.

Cistanthe chrysantha (I.M. Johnst.) Peralta & D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia chrysantha* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.

Cistanthe coquimbensis (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia coquimbensis* Barnéoud
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.

Cistanthe cymosa (Phil.) Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia cymosa* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Cistanthe densiflora (Barnéoud) Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia densiflora* Barnéoud, *Calandrinia barneoudii* Phil., *Calandrinia fasciculata* Phil., *Calandrinia viridis* Phil., *Calandrinia spicata* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pata de guanaco.

Cistanthe fenzi (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia fenzi* Barnéoud, *Calandrinia lancifolia* Phil., *Calandrinia sanguinea* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, BIO, ARA.

Cistanthe frigida (Barnéoud) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia frigida* Barnéoud, *Cistanthe picta* (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz var. *frigida* (Barnéoud) Hershkovitz, *Calandrinia picta* Gillies ex Arn. var. *frigida* (Barnéoud) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schldl.
Sinónimos: *Cistanthe discolor* (Schr.) Spach, *Calandrinia grandiflora* Lindl., *Calandrinia speciosa* Lehm., *Cistanthe grandiflora* (Lindl.) Carolin ex Hershkovitz, comb. illeg., *Calandrinia spectabilis* Otto & Dietr., *Calandrinia discolor* Schrad., *Cistanthe speciosa* (Lehm.) Lilja, *Calandrinia glauca* Schrad.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Nombre vulgar: Doquilla, hierba del corrimiento, mármol, pata de guanaco, renilla.

Cistanthe humilis (Phil.) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia humilis* Phil., *Calandrinia*

oblongifolia Barnéoud var. *humilis* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe lamprosperma (I.M. Johnst.) Peralta & D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia lamprosperma* I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.

Cistanthe laxiflora (Phil.) Peralta & D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia aegilittis* F. Phil., *Calandrinia laxiflora* Phil.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.

Cistanthe longiscapa (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia litoralis* Phil., *Calandrinia longiscapa* Barnéoud
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Cistanthe minuscula (Añon) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia minuscula* Añon
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe picta (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia picta* Gillies ex Arn., *Calandrinia picta* Gillies ex Arn. var. *portulacifolia* (Phil.) Hicken, *Calandrinia portulacifolia* Phil., *Calandrinia villanuevae* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe salsoloides (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Sinónimos: *Calandrinia salsoloides* Barnéoud, *Calandrinia calocephala* Phil., *Calandrinia spicigera* Phil., *Calandrinia acuminata* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Congonilla, kámin.

Cistanthe stricta (Phil.) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia stricta* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA.
Países limítrofes: Argentina.

Cistanthe thyrsoides (Reiche) Peralta & D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia thyrsoides* Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ.

Lenzia

Lenzia chamaepitys Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina.

Montia

Montia fontana L.

Sinónimos: *Montia linearifolia* d'Urv., *Calandrinia pusilla* Barnéoud, *Monocosmia verrucosa* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Montiopsis

Montiopsis andicola (Gillies) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia andicola* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *andicola* (Gillies) Reiche, *Calandrinia denticulata* Gillies var. *echinata* Barnéoud, *Calandrinia oligantha* Phil., *Calandrinia saxifraga* Barnéoud, *Calandrinia saxifraga* Barnéoud var. *oligantha* (Phil.) Reiche, *Calandrinia tricolor* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis berteroaana (Phil.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia berteroaana* Phil., *Calandrinia floribunda* Phil., *Calandrinia rosea* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis capitata (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia capitata* Hook. & Arn., *Calandrinia capituligera* Phil., *Calandrinia erithrichioides* Phil., *Calandrinia erythrocoma* Phil., *Calandrinia petiolata* Phil., *Calandrinia prostrata* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS.

Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis cystiflora (Gillies ex Arn.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia dianthoides* Phil., *Calandrinia splendens* Barnéoud, *Calandrinia splendens* Barnéoud var. *dianthoides* (Phil.) Reiche, *Calandrinia cystiflora* Gillies ex Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis copiapina (Phil.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia copiapina* Phil., *Calandrinia polia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis cumingii (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia cumingii* Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Montiopsis demissa (Phil.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia demissa* Phil., *Calandrinia depressa* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME.

Montiopsis gayana (Barnéoud) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia gayana* Barnéoud, *Calandrinia tenuifolia* Phil., *Calandrinia rahmeri* Phil., *Calandrinia vidali* Phil., *Calandrinia glandulifera* Phil., *Calandrinia conferta* Gillies ex Arn., *Calandrinia hirtella* Phil., *Calandrinia calycotricha* Phil., *Calandrinia gayana* Barnéoud var. *hirtella* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis gilliesii (Hook. & Arn.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia gilliesii* Hook. & Arn., *Calandrinia canescens* Phil., *Calandrinia sessiliflora* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *sessiliflora* (Phil.) Hauman, *Calandrinia setosa* Phil. var. *longifolia* Phil., *Calandrinia leucotricha* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis glomerata (Phil.) D.I. Ford

Sinónimos: *Calandrinia glomerata* Phil., *Calandrinia callithrix* Phil., *Calandrinia leucocephala* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ATA, COQ.
Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis modesta (Phil.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia modesta* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis parviflora (Phil.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia bandurriae* Phil., *Calandrinia parviflora* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, ATA, COQ.

Montiopsis polycarpoides (Phil.) Peralta
Sinónimos: *Calandrinia polycarpoides* Phil.,
Calandrinopsis polycarpoides (Phil.) R. Franz
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, VAL.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Montiopsis potentilloides (Barnéoud) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia potentilloides* Barnéoud,
Calandrinia uspallatensis Phil., *Montiopsis uspallatensis*
(Phil.) D.I. Ford, *Calandrinia nivalis* Phil., *Calandrinia sericea*
Hook. & Arn. var. *uspallatensis* (Phil.) Reiche,
Calandrinia setosa Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Países limítrofes: Argentina.

Montiopsis ramosissima (Hook. & Arn.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia landbeckii* Phil., *Calandrinia poeppigiana*
Walp., *Calandrinia ramosissima* Hook. & Arn.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Montiopsis sericea (Hook. & Arn.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia argentea* Phil., *Calandrinia ferruginea*
Barnéoud, *Calandrinia potentilloides* Barnéoud var. *minor*
Barnéoud, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn., *Calandrinopsis sericea*
(Hook. & Arn.) R. Franz, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *longipes*
Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB.
Nombre vulgar: Hierba del chancho.

Montiopsis trifida (Hook. & Arn.) D.I. Ford
Sinónimos: *Calandrinia aurea* Barnéoud, *Calandrinia capitata*
Hook. & Arn. var. *prolifera* (Phil.) Reiche,
Calandrinia involucrata Phil., *Calandrinia leucopogon*
Phil., *Calandrinia montana* Phil., *Calandrinia prolifera*

Phil., *Calandrinia trifida* Hook. & Arn., *Calandrinopsis montana*
(Phil.) R. Franz
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I. Ford
Sinónimos: *Talinum umbellatum* Ruiz & Pav., *Calandrinia umbellata*
(Ruiz & Pav.) DC., *Calandrinia hispida* Phil., *Calandrinia phalacra*
Phil., *Calandrinia sanfurgi* Phil., *Calandrinia sericea* Hook. & Arn.
var. *phalacra* (Phil.) Reiche, *Calandrinopsis umbellata* (Ruiz & Pav.)
R. Franz, *Calandrinia sericea* Hook. & Arn. var. *aequipes* Hook. &
Arn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Flor de la mistela.

MORACEAE

Broussonetia

Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Mahute (Rapa Nui) (Rapa Nui).

MYRICACEAE

Morella

Morella pavonis (C. DC.) Parra-O
Sinónimos: *Myrica pavonis* C. DC.
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Países limítrofes: Perú.

MYRTACEAE

Amomyrtus

Amomyrtus luma (Molina) D. Legrand & Kausel
Sinónimos: *Eugenia darwinii* Hook.f., *Myrtus luma* Molina,
Myrtus multiflora Juss. ex J. St.-Hil., *Myrtus darwinii*
(Hook.f.) Barnéoud, *Myrcia lechleriana* Miq., *Myrtus valdiviana*
Phil., *Pseudocaryophyllus darwinii* (Hook.f.) Burret
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Luma.

Amomyrtus meli (Phil.) D. Legrand & Kausel
Sinónimos: *Myrtus meli* Phil., *Pseudocaryophyllus meli* (Phil.) Burret
Árbol. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-600 m.
Nombre vulgar: Meli.

Blepharocalyx

Blepharocalyx cruckshanksii (Hook. & Arn.) Nied.
Sinónimos: *Eugenia cruckshanksii* Hook. & Arn., *Eugenia divaricatum* O. Berg, *Luma cruckshanksii* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *obovata* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *ovalis* O. Berg, *Eugenia divaricatum* O. Berg var. *pauciflora* O. Berg, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied., *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *obovatus* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *ovalis* (O. Berg) Reiche, *Blepharocalyx divaricatus* (O. Berg) Nied. var. *pauciflorus* (O. Berg) Reiche, *Temu divaricatum* (O. Berg) O. Berg
Árbol. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Temu, palo colorado.

Eucalyptus

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Árbol. Introducido.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Eucalyptus globulus Labill.
Árbol. Introducido.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA.

Legrandia

Legrandia concinna (Phil.) Kausel
Sinónimos: *Eugenia concinna* Phil.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: MAU, NUB.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Nombre vulgar: Luma.

Luma

Luma apiculata (DC.) Burret
Sinónimos: *Eugenia apiculata* DC., *Eugenia proba* O. Berg, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel, *Myrceugenia apiculata* (DC.) Nied., *Eugenia gilliesi* Hook. & Arn., *Eugenia affinis* Gillies ex Hook. & Arn., *Eugenia hookeri* Steud., *Eugenia apiculata* DC. var. *arnyan* Hook.f., *Eugenia barneoudii* O. Berg, *Eugenia spectabilis* Phil., *Eugenia modesta* Phil., *Eugenia mucronata* Phil., *Eugenia palenae* Phil., *Eugenia cuspidata* Phil., *Eugenia ebracteata* F. Phil., *Myrtus chequenilla* Kuntze, *Luma gilliesi* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma spectabilis* (Phil.) Burret, *Luma hookeri* (Steud.) Burret, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *australis* Kausel, *Myrceugenella grandjotii* Kausel, *Myrceugenella apiculata* (DC.) Kausel var. *spectabilis* (Phil.) Kausel
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Arrayán, palo colorado.

Luma chequen (Molina) A. Gray
Sinónimos: *Eugenia chequen* Molina, *Myrtus chequen* (Molina) Spreng., *Eugenia gayana* Barnéoud, *Myrtus uliginosa* Miq., *Myrtus uliginosa* Miq. fma. *major* Miq., *Myrtus gayana* (Barnéoud) O. Berg, *Eugenia bella* Phil., *Eugenia pulchra* O. Berg, *Eugenia myrtomimeta* Diels, *Luma gayana* (Barnéoud) Burret, *Myrceugenella chequen* (Molina) Kausel, *Myrceugenella gayana* (Barnéoud) Kausel, *Myrceugenella langerfeldtii* Kausel, *Myrceugenella chequen* (Molina) Kausel var. *myrtomimeta* (Diels) Kausel
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Nombre vulgar: Chequén, arrayán blanco.

Myrceugenia

Myrceugenia chrysocarpa (O. Berg) Kausel
Sinónimos: *Luma chrysocarpa* (O. Berg) Burret, *Eugenia chrysocarpa* O. Berg, *Eugenia philippii* O. Berg, *Eugenia buxifolia* Phil., *Eugenia patagonica* Phil., *Eugenia petiolata* Phil., *Myrceugenia buxifolia* (Phil.) Reiche, *Luma philippii* (O. Berg) Burret
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Luma blanca, pitrilla.

Myrceugenia colchaguensis (Phil.) L.E. Navas
Sinónimos: *Eugenia colchaguensis* Phil., *Myrceugenia malvillana* Kausel
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-400 m.

Myrceugenia correifolia (Hook. & Arn.) O. Berg
Sinónimos: *Eugenia correifolia* Hook. & Arn., *Eugenia maritima* Barnéoud, *Luma correifolia* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Eugenia thalassaia* O. Berg, *Myrceugenia johowi* Gusinde, *Myrceugenia thalassaia* (O. Berg) Gusinde ex Fuentes, *Myrceugenia maritima* (Barnéoud) Kausel
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Petrillo, petrilla.

Myrceugenia exsucca (DC.) O. Berg
Sinónimos: *Luma exsucca* (DC.) Burret, *Eugenia exsucca* DC., *Myrceugenia multiflora* (Hook. & Arn.) Kausel, *Eugenia temu* Hook. & Arn., *Luma temu* (Hook. & Arn.) Gray, *Myrceugenia lechleriana* O. Berg, *Myrceugenia camphorata* O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *patagua* O. Berg, *Eugenia pitra* O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *temu* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Eugenia exsucca* DC. var. *apiculata* O. Berg, *Eugenia corralensis* Phil., *Luma pitra* (O. Berg) Burret, *Luma corralensis* (Phil.) Burret
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pitra, petra, patagua.

Myrceugenia lanceolata (Juss. ex J. St.-Hil.) Kausel
Sinónimos: *Myrtus lanceolata* Juss. ex J. St.-Hil., *Eugenia dombeyana* DC., *Myrtus gudilla* Colla, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn., *Eugenia gudilla* (Colla) Barnéoud, *Luma stenophylla* (Hook. & Arn.) Gray, *Eugenia stenophylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* Hook. ex O. Berg, *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg, *Luma dombeyana* (DC.) Burret
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-800 m.
Nombre vulgar: Arrayancillo, ñipa.

Myrceugenia leptospermoides (DC.) Kausel
Sinónimos: *Eugenia leptospermoides* DC., *Eugenia leptospermoides* DC. var. *microphylla* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *latifolia* O. Berg, *Eugenia leptospermoides* DC. var. *longifolia* O. Berg, *Eugenia thymifolia* Phil. ex Reiche

Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-400 m.
Nombre vulgar: Macella, petrillo.

Myrceugenia obtusa (DC.) O. Berg
Sinónimos: *Eugenia obtusa* DC., *Myrtus raran* Colla, *Eugenia raran* (Colla) Barnéoud, *Luma obtusa* (DC.) A. Gray, *Myrceugenia chilensis* O. Berg, *Eugenia polyantha* Phil., *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *raran* (Colla) O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *berteroana* O. Berg, *Myrceugenia obtusa* (DC.) O. Berg var. *polyantha* (Phil.) O. Berg
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Nombre vulgar: Rarán.

Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) O. Berg var. ***nannophylla*** (Burret) Landrum
Sinónimos: *Myrceugenia montana* Kausel, *Myrceugenia nannophylla* (Burret) Kausel, *Luma nannophylla* Burret, *Myrceugenia valientei* Kausel
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 500-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Myrceugenia ovata (Hook. & Arn.) O. Berg var. ***ovata***
Sinónimos: *Eugenia ovata* Hook. & Arn., *Eugenia cumingii* Hook. & Arn., *Eugenia trichocarpa* Phil., *Luma ovata* (Hook. & Arn.) Burret, *Luma cumingii* (Hook. & Arn.) Burret
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Nombre vulgar: Huillipeta.

Myrceugenia parvifolia (DC.) Kausel
Sinónimos: *Eugenia parvifolia* DC., *Luma baeckeoides* Griseb.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Chequén, chilquilco.

Myrceugenia pinifolia (F. Phil.) Kausel
Sinónimos: *Eugenia pinifolia* F. Phil., *Myrceugenia stenophylla* (Hook. & Arn.) O. Berg var. *pinifolia* (F. Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Myrceugenia planipes (Hook. & Arn.) O. Berg
Sinónimos: *Myrceugenia distoma* (O. Berg) Kausel, *Eugenia planipes* Hook. & Arn., *Myrcia planipes* (Hook. & Arn.) Kiaersk., *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *genuina* O. Berg, nom. illeg., *Eugenia planipes* Hook. & Arn. var. *grandifolia* O. Berg, *Eugenia distoma* O. Berg
Árbol. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 500-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pitra.

Myrceugenia rufa (Colla) Skotts. ex Kausel
Sinónimos: *Myrtus rufa* Colla, *Eugenia ferruginea* Hook. & Arn., *Eugenia rufa* (Colla) Barnéoud, *Luma ferruginea* (Hook. & Arn.) A. Gray, *Myrceugenia ferruginea* (Hook. & Arn.) Reiche, *Luma rufa* (Colla) Burret

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Myrceugenia schulzei Johow
Sinónimos: *Luma schulzei* (Johow) Burret

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400 m.

Nombre vulgar: Luma de Más Afuera.

Myrcianthes

Myrcianthes coquimbensis (Barnéoud) Landrum & Grifo
Sinónimos: *Reichea coquimbensis* (Barnéoud) Kausel, *Myrtus coquimbensis* Barnéoud, *Aspidogenia coquimbensis* (Barnéoud) Burret

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Lucumillo, lucumilla.

Myrteola

Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg
Sinónimos: *Eugenia humifusa* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg var. *humifusa* (Phil.) Reiche, *Myrteola bullata* O. Berg, *Myrteola humifusa* (Phil.) O. Berg, *Myrteola leucomyrtillus* (Griseb.) Reiche, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *barneoudii* (O. Berg) Kausel, *Myrteola nummularia* (Poir.) O. Berg var. *repens* (Phil.) Reiche, *Myrteola repens* (Phil.) O. Berg, *Myrtus barneoudii* O. Berg, *Myrtus leucomyrtillus* Griseb., *Myrtus nummularia* Poir., *Myrtus nummularia* Poir. var. *major* Hook.f., *Myrtus repens* Phil., *Myrteola barneoudii* (O. Berg) O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *pentamera* O. Berg, *Myrteola bullata* O. Berg var. *tetramera* O. Berg, *Eugenia humilis* Phil.

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Daudapo, huarapo, naurapo.

Nothomyrcia

Nothomyrcia fernandeziana (Hook. & Arn.) Kausel
Sinónimos: *Myrceugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Johow, *Myrtus fernandeziana* Hook. & Arn., *Eugenia lumilla* Phil., *Eugenia fernandeziana* (Hook. & Arn.) Barnéoud, *Myrceugenia luma* O. Berg, *Luma fernandeziana* (Hook. & Arn.) Burret

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Nombre vulgar: Luma de Juan Fernández, lumilla.

Psidium

Psidium guajava L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Guayaba, tuaba (Rapa Nui).

Syzygium

Syzygium jambos (L.) Alston

Árbol. Introducido.

Distribución: IPA.

Tepualia

Tepualia stipularis (Hook. & Arn.) Griseb.

Sinónimos: *Metrosideros stipularis* (Hook. & Arn.) Hook.f., *Myrtus stipularis* Hook. & Arn., *Tepualia patagonica* Phil., *Tepualia philippiana* Griseb., *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Tepualia stipularis* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *philippiana* (Griseb.) Speg.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tepu, tepú.

Ugni

Ugni candollei (Barnéoud) O. Berg

Sinónimos: *Myrtus candollei* Barnéoud, *Myrtus krausei* Phil., *Ugni krausei* (Phil.) O. Berg, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg fma. *litoralis* Kausel, *Ugni candollei* (Barnéoud) O. Berg fma. *monticola* Kausel

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 100-800 m.

Nombre vulgar: Murta, murta blanca, tautau, chauchau, trautrau.

Ugni molinae Turcz.

Sinónimos: *Eugenia ugni* (Molina) Hook. & Arn., *Myrtus ugni* Molina, *Ugni myrtus* Macloskie, *Ugni ugni* (Molina) Macloskie, nom. illeg., *Ugni poeppigii* O. Berg, *Myrtus molinae* Barnéoud, *Ugni philippii* O. Berg

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 700-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Murtilla, murta, murtillo, uñi.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Ugni selkirkii (Hook. & Arn.) O. Berg

Sinónimos: *Eugenia selkirkii* Hook. & Arn., *Myrtus berteroi* Phil., *Ugni berteroi* (Phil.) F. Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 400-800 m.

Nombre vulgar: Murtillo.

NOTHOFAGACEAE

Nothofagus

Nothofagus alessandrii Espinosa

Sinónimos: *Fuscospora alessandrii* (Espinosa) Heenan & Smissen

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 100-500 m.

Nombre vulgar: Ruil.

Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst.

Sinónimos: *Nothofagus nervosa* (Phil.) Dimitri & Milano, comb. illeg., *Fagus alpina* Poepp. & Endl., *Fagus nervosa* Phil., *Nothofagus procera* (Poepp. & Endl.) Oerst., comb. illeg., *Nothofagus nervosa* (Phil.) Krasser, *Lophozonia alpina* (Poepp. & Endl.) Heenan & Smissen

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 200-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Raulí.

Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus antarctica* G. Forst., *Fagus antarctica* G.

Forst. var. *sublobata* A. DC., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *uliginosa* A. DC., *Calucechinus antactica* Hombr. & Jacq., *Calucechinus montagni* Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *microphylla* Phil., *Nothofagus montagnei* (Hombr. & Jacq.) Krasser

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ñirre, ñire.

Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus betuloides* Mirb., *Nothofagus patagonica* Gand., *Betula antarctica* G. Forst., nom. nud., *Betula antarctica* G. Forst. ex Willd., *Fagus dubia* Mirb., *Fagus forsteri* Hook., *Calusparassus forsteri* Hombr. & Jacq., *Calusparassus betuloides* Hombr. & Jacq.

Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coigüe de Magallanes, guindo.

Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus dombeyi* Mirb., *Fagus dombeyi* Mirb. var. *microphylla* Phil.

Árbol. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coigüe, coihue.

Nothofagus glauca (Phil.) Krasser

Sinónimos: *Fagus glauca* Phil., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *glauca* (Phil.) Reiche, *Nothofagus megalocarpa* Reiche, *Lophozonia glauca* (Phil.) Heenan & Smissen

Árbol. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-1500 m.

Nombre vulgar: Roble maulino, hualo, roble colorado.

Nothofagus macrocarpa (A. DC.) F.M. Vázquez & R.A. Rodr.

Sinónimos: *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *macrocarpa* (A. DC.) Reiche, *Fagus obliqua* Mirb. var. *macrocarpa* A. DC., *Lophozonia macrocarpa* (A. DC.) Heenan & Smissen

Árbol. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 800-2200 m.

Nombre vulgar: Roble, roble blanco, roble de Santiago.

Nothofagus nitida (Phil.) Krasser

Sinónimos: *Fagus nitida* Phil.

Árbol. Nativo.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coigüe de Chiloé, roble de Chiloé.

Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.

Sinónimos: *Fagus obliqua* Mirb., *Lophozonia heterocarpa*

Turcz., *Fagus obliqua* Mirb. var. *macranthera* A. DC., *Fagus*

obliqua Mirb. var. *dentatosquamata* Kuntze, *Nothofagus*

leoni Espinosa, *Fagus obliqua* (Mirb.) Oerst. var. *valdiviana*

(Phil.) A. DC., *Fagus valdiviana* Phil., *Fagus obliqua* Mirb.

var. *integrissquamata* Kuntze, *Nothofagus obliqua* (Mirb.)

Oerst. subsp. *valdiviana* (Phil.) F.M. Vázquez & R.A.

Rodr., *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. subsp. *andina*

F.M. Vázquez & R.A. Rodr., *Lophozonia obliqua* (Mirb.)

Heenan & Smissen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan &

Smissen subsp. *andina* (F.M. Vázquez & R. Rodr.) Heenan

& Smissen, *Lophozonia obliqua* (Mirb.) Heenan & Smissen

subsp. *valdiviana* (Phil.) Heenan & Smissen

Árbol. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Hualle, roble, coyán, roble-pellín.

Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser

Sinónimos: *Fagus antarctica* G. Forst. var. *bicrenata* A.

DC., *Fagus pumilio* Poepp. & Endl., *Calusparassus pumilio*

Hombr. & Jacq., *Fagus antarctica* G. Forst. var. *pumilio*

(Poepp. & Endl.) Kuntze

Árbol. Nativo.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lengua.

NYCTAGINACEAE

Allionia

Allionia incarnata L.

Sinónimos: *Allionia puberula* Phil., *Wedeliella incarnata*

(L.) Cockerell, *Wedelia incarnata* (L.) Kuntze, *Allionia*

bandurriae Phil., *Allionia jarae* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Boerhavia

Boerhavia diffusa L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, IPA.

Mirabilis

Mirabilis acuta (Reiche) Heimerl

Sinónimos: *Oxybaphus ovatus* (Ruiz & Pav.) Vahl var. *acutus* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 500-2900 m.

Nombre vulgar: Tapahua.

Mirabilis cordifolia (Kunze ex Choisy) Heimerl

Sinónimos: *Oxybaphus cordifolius* Kunze ex Choisy, *Allione*

cordifolia (Kunze ex Choisy) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Perú.

Mirabilis elegans (Choisy) Heimerl

Sinónimos: *Oxybaphus elegans* Choisy, *Allionia elegans*

(Choisy) Kuntze, *Oxybaphus dichotomus* Phil., *Oxybaphus*

san-romani Phil., *Mirabilis elegans* (Choisy) Heimerl var.

dichotoma (Phil.) Heimerl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Perú.

Mirabilis expansa (Ruiz & Pav.) Standl.

Sinónimos: *Calyxhymenia expansa* Ruiz & Pav., *Allionia*

expansa (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Oxybaphus expansa* (Ruiz

& Pav.) Vahl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, VAL.

Rango altitudinal: 100-3600 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Mirabilis jalapa L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, BIO, JFE, IPA.

Mirabilis ovata (Ruiz & Pav.) F. Meigen

Sinónimos: *Oxybaphus campestris* Griseb., *Allionia ovata*

(Ruiz & Pav.) Standl., *Calyxhymenia ovata* Ruiz & Pav.,

Mirabilis campestris (Griseb.) I.M. Johnst., *Oxybaphus*

ovatus (Ruiz & Pav.) Vahl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-3200 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Mirabilis prostrata (Ruiz & Pav.) Heimerl
Sinónimos: *Oxybaphus micranthus* Choisy, *Oxybaphus prostratus* (Ruiz & Pav.) Vahl, *Allionia micrantha* (Choisy) Molfino, *Calyxhymenia prostrata* Ruiz & Pav., *Allionia excelsa* (Willd.) Kuntze, *Allionia prostrata* (Ruiz & Pav.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Mirabilis trollii Heimerl
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2200 m.

NYMPHAEACEAE

Nymphaea

Nymphaea alba L.
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

OLEACEAE

Fraxinus

Fraxinus excelsior L.
Árbol. Introducido.
Distribución: BIO.

Ligustrum

Ligustrum ovalifolium Hassk.
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: JFE.
Nombre vulgar: Ligustrina.

Menodora

Menodora linoides Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 1200-1800 m.
Nombre vulgar: Linacillo.

ONAGRACEAE

Camissonia

Camissonia dentata (Cav.) Reiche subsp. *dentata*
Sinónimos: *Oenothera dentata* Cav., *Oenothera contorta* Douglas var. *divaricata* (Gay) Munz, *Chamissonia tenuifolia* (Spach) Reiche, *Camissonia flava* Link, *Oenothera chamissonis* Link, *Holostigma argutum* Spach, *Holostigma heterophyllum* Spach, *Sphaerostigma chamissonis* (Link) Fisch. & C.A. Mey., *Oenothera minutiflora* D. Dietr., *Sphaerostigma dentatum* (Cav.) Gay, *Sphaerostigma divaricatum* Gay, *Sphaerostigma ramosissimum* Phil., *Chamissonia acuminata* (Phil.) Reiche, *Chamissonia paradoxa* (Spach) Reiche var. *divaricata* (Gay) Reiche, *Oenothera torulosa* H. Lév. fma. *chilensis* (D. Dietr.) H. Lév., *Oenothera micrantha* Spreng. var. *acuminata* (Phil.) Munz, *Sphaerostigma heterophylla* (Spach) Gay
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Camissonia dentata (Cav.) Reiche subsp. *littoralis* P.H. Raven & D.M. Moore
Sinónimos: *Sphaerostigma acuminatum* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: MAU, BIO.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Clarkia

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis ex Martic.
Sinónimos: *Clarkia tenella* (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *ambigua* (Phil.) D.M. Moore & F.H. Lewis, comb. illeg., *Godetia ambigua* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: NUB, BIO, ARA.

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. *araucana* D.M. Moore & F.H. Lewis
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Clarkia tenella (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis subsp. *tenella*
Sinónimos: *Oenothera tenella* Cav., *Godetia cavanillesii* Spach, *Godetia tenella* (Cav.) Steud., *Oenothera auricula* H. Lév. var. *tenella* (Cav.) H. Lév., *Godetia dasycarpa* Phil., *Godetia tenella* (Cav.) Steud. var. *dasycarpa* (Phil.) Munz, *Oenothera quadrivulnera* Douglas var. *dasycarpa*

(Cav.) Thell. ex Probst, *Godetia quadrivulnera* (Douglas) Spach var. *tenella* Jeps., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *dasycarpa* H. Lév.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Clarkia tenella (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis subsp. ***tenuifolia*** (Cav.) D.M. Moore & F.H. Lewis

Sinónimos: *Oenothera tenuifolia* Cav., *Godetia tenuifolia* (Cav.) Spach, *Oenothera tenella* Cav. var. *tenuifolia* (Cav.) Lindl., *Godetia gayana* Spach, *Oenothera gayana* (Spach) Steud., *Oenothera prismatica* H. Lév. var. *tenuifolia* (Cav.) H. Lév.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Inuil, sangre de toro, sangre de buey, huasita.

Epilobium

Epilobium australe Poepp. & Hausskn. ex Hausskn.

Sinónimos: *Epilobium lechleri* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *andinum* (Phil.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *lechleri* (Phil. & Hausskn. ex Hausskn.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *interruptum* (Sam.) Sam., *Epilobium australe* Poepp. & Hausskn. ex Hausskn. var. *pumilum* Sam., *Epilobium interruptum* Sam., *Epilobium deflexum* Sam., *Epilobium tetragonum* L. var. *antarcticum* Hook.f., *Epilobium antarcticum* (Hook.f.) Kuntze, *Epilobium transandinum* Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium barbeyanum H. Lév.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium brachycarpum C. Presl

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: BIO.

Epilobium campestre (Jeps.) Hoch & W.L. Wagner

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 1700-1900 m.

Epilobium ciliatum Raf.

Sinónimos: *Epilobium hookerianum* Hausskn. ex Skotts., *Epilobium valdivense* Hausskn. var. *alboffii* Macloskie, *Epilobium tetragonum* auct. non L., *Epilobium valdiviense* Hausskn., *Epilobium magellanicum* Phil. & Hausskn. ex Hausskn., *Epilobium longipes* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn., *Epilobium constrictum* Sam., *Epilobium cunninghami* Hausskn., *Epilobium pedicellare* J. Presl var. *latifolium* Walp., *Epilobium aconcaguinum* Phil., *Epilobium albiflorum* Phil., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *latifolium* Sam., *Epilobium chilense* Hausskn. var. *macrum* Sam., *Epilobium leiophyton* Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium conjugens Skotts.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium densifolium Hausskn.

Sinónimos: *Epilobium nivale* Meyen var. *lignosum* (F. Phil.) Hosseus, *Epilobium lignosum* F. Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG.

Rango altitudinal: 500-3300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Epilobium denticulatum Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Epilobium andicolum* Hausskn., *Epilobium caesium* Hausskn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, BIO.

Rango altitudinal: 1500-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Tuari.

Epilobium fragile Sam.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3300-4200 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Epilobium glaucum Phil.

Sinónimos: *Epilobium glaucum* Phil. var. *stenophyllum* Macloskie & Dusén, *Epilobium patagonicum* Rendle, *Epilobium nubigenum* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Epilobium nivale Meyen

Sinónimos: *Epilobium andinum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Epilobium obscurum Schreb.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Epilobium puberulum Hook. & Arn.

Sinónimos: *Epilobium pedunculatum* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Epilobium subdentatum (Meyen) Lievens & Hoch

Sinónimos: *Boisduvalia subulata* (Ruiz & Pav.) Raim., *Boisduvalia volckmannii* Phil., *Oenothera gauroides* Kuntze, *Boisduvalia tocornalii* Gay, *Nierembergia subdentata* Meyen, *Oenothera uniflora* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Boisduvalia concinna* (D. Don) Spach, *Oenothera subulata* Ruiz & Pav., *Oenothera concinna* D. Don, *Epilobium concinnum* (D. Don) Hoch & P.H. Raven
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Epilobium tetragonum L. subsp. *lamyi* (F.W. Schultz)

Nyman
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, MAU, BIO, ARA, LLA.

Fuchsia

Fuchsia lycioides Andrews

Sinónimos: *Fuchsia rosea* Ruiz & Pav.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Palo falso, palo de yegua, coralito, palo blanco.

Fuchsia magellanica Lam.

Sinónimos: *Fuchsia magellanica* Lam. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Munz, *Fuchsia araucana* F. Phil., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *robustior* Hook.f., *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Lindl., *Fuchsia gracilis* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav., *Fuchsia coccinea* auct. non Dryand., *Dorvalla eucharis* Comm. ex Lam., *Thilcum tinctorium* Molina, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *typica* Munz, nom. illeg., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *grandiflora* Hook., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *macrostema* (Ruiz & Pav.) Hook., *Fuchsia magellanica* Lam. var. *gracilis* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia conica* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *conica* (Lindl.) Sweet, *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *multiflora* Lindau, *Fuchsia discolor* Lindl., *Fuchsia magellanica* Lam. var. *discolor* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia chonotica* Phil., *Fuchsia coccinea* Dryand. var. *chonotica* (Phil.) Reiche, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *molinae* Espinosa, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *eburnea* Pisano, *Fuchsia magellanica* Lam. var. *conica* (Lindl.) L.H. Bailey, *Fuchsia gracilis* Lindl. var. *tenella* Lindl., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *tenella* (Lindl.) DC., *Fuchsia macrostema* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Lindl.) Sweet

Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Chilco, chilca, palo blanco.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Gayophytum

Gayophytum humile A. Juss.

Sinónimos: *Gayophytum densifolium* Phil., *Gayophytum minutum* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *densifolium* (Phil.) Reiche, *Gayophytum nuttallii* Torr. & A. Gray, *Gayophytum humile* A. Juss. var. *robustum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 500-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quinchamalí.

Gayophytum micranthum Hook. & Arn.

Sinónimos: *Gayophytum gracile* Phil., *Gayophytum robustum* Phil., *Gayophytum humile* A. Juss. var. *gracile* (Phil.) Reiche, *Sphaerostigma paradoxum* (Spach) Gay, *Oenothera gracilis* (Phil.) H. Lév.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1200-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ludwigia

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet subsp. **hexapetala** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom & Kartesz
Sinónimos: *Jussiaea hexapetala* Hook. & Arn., *Ludwigia hexapetala* (Hook. & Arn.) Zardini, A.G. Gu & P.H. Raven
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 10-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 10-270 m.

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven subsp. **montevicensis** (Spreng.) P.H. Raven
Sinónimos: *Jussiaea montevicensis* Spreng., *Jussiaea repens* L. var. *montevicensis* (Spreng.) Munz, *Jussiaea repens* L., *Ludwigia adscendens* (L.) H. Hara var. *montevicensis* (Spreng.) H. Hara, *Jussiaea glandulosa* Larrañaga
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Pasto de la rana.

Ludwigia peruviana (L.) H. Hara
Hierba acuática. Perenne. Introducida.
Distribución: LBO, BIO.
Rango altitudinal: 100-360 m.

Oenothera

Oenothera acaulis Cav.
Sinónimos: *Lavauxia mutica* Spach, *Oenothera mutica* (Spach) Gay
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Nombre vulgar: Colsilla, hierba de la apostema, rodalán.

Oenothera affinis Cambess.
Sinónimos: *Oenothera berteriana* Spach, *Oenothera chilensis* Fisch. & C.A. Mey., *Raimannia berteriana* (Spach) Sprague & Riley
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, JFE.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Flor de San José, metrón, metrún, Don

Diego de la noche.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Oenothera arequipensis Munz & I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Perú.

Oenothera biennis L.
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: VAL.

Oenothera coquimbensis Gay
Sinónimos: *Oenothera grandidentata* Phil., *Oenothera coquimbensis* Gay var. *grandidentata* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Oenothera glazioviana Micheli
Hierba. Bienal. Introducida.
Distribución: LBO, LLA.

Oenothera grisea W. Dietr.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Oenothera magellanica Phil.
Sinónimos: *Oenothera magellanica* Phil. var. *chubutensis* Macloskie, *Oenothera polymorpha* H. Lév. var. *magellanica* (Phil.) H. Lév.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oenothera nana Griseb.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Oenothera odorata Jacq.
Sinónimos: *Oenothera odorata* Jacq. fma. *glabrescens* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. fma. *media* Speg., *Oenothera odorata* Jacq. fma. *undulata* Speg., *Oenothera ibarii* Phil., *Raimannia odorata* (Jacq.) Sprague & Riley, *Onagra undulata* Moench, *Oenothera undulata* Aiton, *Oenothera odorata* Jacq. var. *virescens* Ser., *Oenothera odorata* Jacq. var. *glaucescens* Ser., *Oenothera odoratissima* Tausch, *Oenothera mollissima* L. subsp. *odorata* (Jacq.) Thell.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oenothera peruana W. Dietr.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2500-3300 m.
Países limítrofes: Perú.

Oenothera picensis Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, JFE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Oenothera ravenii W. Dietr. subsp. *chilensis* W. Dietr.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: VAL, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA.

Oenothera sandiana Hassk.
Sinónimos: *Oenothera rubida* Rusby
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Oenothera stricta Ledeb. ex Link
Sinónimos: *Oenothera propinqua* Spach, *Oenothera bracteata* Phil., *Oenothera propinqua* Spach var. *sparsiflora* Phil., *Oenothera valdiviana* Phil., *Oenothera glabrescens* Phil., *Oenothera brachysepala* Spach, *Oenothera arguta* Greene, *Onagra arguta* (Greene) Small, *Oenothera bracteata* Phil. var. *glabrescens* (Phil.) Reiche, *Oenothera mollissima* L. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Oenothera mollissima* L. subsp. *propinqua* (Spach) Thell., *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link var. *propinqua* (Spach) Reiche
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Don Diego de la noche, flor de San José.
Nota: Introducida en la Isla de Pascua.

Oenothera villaricae W. Dietr.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

OROBANCHACEAE

Agalinis

Agalinis linarioides (Cham. & Schldtl.) D'Arcy
Sinónimos: *Gerardia linarioides* Cham. & Schldtl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Cartucho.

Agalinis meyeniana (Benth.) Barringer
Sinónimos: *Gerardia rigida* Gillies ex Benth. var. *meyeniana* Benth.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 800-1300 m.

Bellardia

Bellardia trixago (L.) All.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C.A. Mey
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Castilleja

Castilleja attenuata (A. Gray) T.I. Chuang & Heckard
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Castilleja laciniata Hook. & Arn.
Sinónimos: *Orthocarpus australis* Benth., *Orthocarpus laciniatus* (Hook. & Arn.) D.D. Keck
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 300-700 m.
Países limítrofes: Perú.

Castilleja pumila (Benth.) Wedd. ex Herrera
Sinónimos: *Castilleja nubigena* Kunth var. *pumila* Benth.,
Castilleja fissifolia L. subsp. *pumila* (Benth.) Wedd.,
Castilleja fissifolia L.f. var. *pumila* (Benth.) Wedd.
Hierba parásita. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Albahaca.

Euphrasia

Euphrasia adenonota I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2800-3200 m.

Euphrasia andicola Benth.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, ARA.

Euphrasia antarctica Benth.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia chrysantha Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia cockayniana Petrie
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-820 m.

Euphrasia flavicans Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Euphrasia formosissima Skottsbo.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Euphrasia intricata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Euphrasia meiantha Clos
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia muscosa Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA, AIS.
Rango altitudinal: 1200 m.

Euphrasia perpusilla Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 200-300 m.

Euphrasia philippii Wettst.
Sinónimos: *Euphrasia picta* Phil., *Euphrasia montana* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Euphrasia subexserta Benth.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia trifida Poepp. ex Benth.
Sinónimos: *Euphrasia aurea* F. Phil., *Euphrasia spectabilis* Phil., *Euphrasia caespitosa* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1000-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Euphrasia villaricensis Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LLA.

Neobartsia

Neobartsia chilensis (Benth.) Uribe-Convers & Tank
Sinónimos: *Bartsia chilensis* Benth.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 300-600 m.

Neobartsia peruviana (Walp.) Uribe-Convers & Tank
Sinónimos: *Bartsia peruviana* Walp., *Bartsia meyeniana* Benth.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 1100-4900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Neobartsia serrata (Molau) Uribe-Convers & Tank
Sinónimos: *Bartsia serrata* Molau
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2300-3600 m.
Países limítrofes: Perú.

Orobanche

Orobanche chilensis (Phil.) Beck
Sinónimos: *Myzorrhiza chilensis* Phil.
Hierba parásita. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Orobanca.

Orobanche minor Sm.
Hierba parásita. Anual. Introducida.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Orobanche ramosa L.
Hierba parásita. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.

Orobanche tarapacana Phil.
Hierba parásita. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 0-2800 m.

Parentucellia

Parentucellia latifolia Caruel
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

OXALIDACEAE

Oxalis

Oxalis adenophylla Gillies ex Hook. & Arn.
Sinónimos: *Acetosella adenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella bustillosii* (Phil.) Kuntze, *Oxalis bustillosii* Phil., *Oxalis bustillosii* Phil. var. *biflora* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis arbuscula Barnéoud
Sinónimos: *Oxalis fruticula* Phil., *Acetosella arbuscula* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella fruticula* (Phil.) Kuntze
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 600-1200 m.

Oxalis arenaria Bertero ex Colla
Sinónimos: *Oxalis araucana* Reiche, *Oxalis biglandulosa* Steud., *Oxalis hyalinorhiza* Poepp. ex R. Knuth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Oxalis articulata Savigny
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME, BIO.

Oxalis atacamensis Reiche
Sinónimos: *Acetosella trichocalyx* (Phil.) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 400-600 m.

Oxalis aureoflava Steud.
Sinónimos: *Oxalis corniculata* L. var. *aureoflava* (Steud.) Gunckel, *Acetosella aureoflava* (Steud.) Kuntze, *Xanthoxalis aureoflava* (Steud.) Holub
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxalis berteroa Barnéoud
Sinónimos: *Oxalis compacta* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *berteroana* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis falconiana* Steud. *berteroana* (Barnéoud) Lourteig, *Oxalis chaetocalyx* Phil., *Oxalis josephii* R. Knuth, *Oxalis pachyphylla* Phil., *Oxalis peraltae* Phil., *Acetosella berteroa* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella falconiana* (Steud.) Kuntze, *Acetosella pachyphylla* (Phil.) Kuntze, *Oxalis berteroa* Barnéoud var. *uniflora* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1100-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis bulbocastanum Phil.
Sinónimos: *Oxalis breana* Phil., *Oxalis thyrsoidea* Reiche, *Oxalis occidentalis* R. Knuth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 200-700 m.

Oxalis caesia Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxalis campanensis Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1500-1800 m.

Oxalis cinerea Zucc.

Sinónimos: *Oxalis alfalfalis* Phil., *Oxalis lineata* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis niveiphylla* R. Knuth, *Oxalis pearcei* Phil., *Oxalis spodiophylla* Walp. var. *microphylla* Walp., *Oxalis spodiophylla* Walp., *Oxalis fernandensis* R. Knuth, *Oxalis besseri* R. Knuth, *Acetosella haenkeana* (Zucc.) Kuntze, *Acetosella lineata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella pearcei* (Phil.) Kuntze, *Acetosella spodiophylla* (Walp.) Kuntze
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA.
Rango altitudinal: 1000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Oxalis clandestina Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Oxalis colchaguensis Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Oxalis compacta Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Oxalis gilliesii* Phil., *Oxalis landbeckii* Phil., *Oxalis platypila* Gillies ex Hook. & Arn., *Oxalis reichei* R. Knuth, *Oxalis uspallatensis* R. Knuth, *Acetosella compacta* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella gayana* (Phil.) Kuntze, *Acetosella platypila* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxalis gayana* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 1600-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis corniculata L. var. *atropurpurea* Planch.

Sinónimos: *Oxalis corniculata* L. var. *purpurascens* Speg.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, RME, JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Oxalis corniculata L. var. *corniculata*

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.

Oxalis debilis Kunth

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: JFE.

Oxalis dumetorum Barnéoud

Sinónimos: *Oxalis prorepens* Phil., *Oxalis hookeriana* Pohl ex Progel, *Oxalis lechleri* Steud., *Acetosella dumetorum* (Barnéoud) Kuntze
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Oxalis enneaphylla Cav.

Sinónimos: *Oxalis cunninghamii* R. Knuth, *Oxalis enneaphylla* Cav. subsp. *ibari* (Phil.) Lourteig, *Oxalis patagonica* Speg., *Acetosella enneaphylla* (Cav.) Kuntze, *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *patagonica* (Speg.) Skottsbo., *Oxalis frigida* R. Knuth, *Oxalis ibari* Phil., *Oxalis pumila* d'Urv., *Oxalis enneaphylla* Cav. var. *pumila* (d'Urv.) Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis eremobia Phil.

Sinónimos: *Oxalis inesitae* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2100-3300 m.

Oxalis ericoides R. Knuth

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 1500-3000 m.

Oxalis erythrorhiza Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Oxalis bryoides* Phil., *Oxalis guessfeldtii* R. Knuth, *Acetosella bryoides* (Phil.) Kuntze, *Acetosella erythrorhiza* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oxalis gigantea Barnéoud

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Churco, churqui.

Oxalis gyrorhiza Bertero ex Colla

Sinónimos: *Oxalis radicans* Ruiz & Pav. ex R. Knuth, *Acetosella gyrorhiza* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Oxalis autumnalis* Poepp. ex Progel, nom. illeg.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-400 m.

Oxalis holosericea Phil.

Sinónimos: *Acetosella holosericea* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis hypsophila Phil.

Sinónimos: *Oxalis exigua* Phil., *Oxalis coyensis* R. Knuth, *Oxalis fluehmannii* Phil., *Oxalis gracilinervosa* R. Knuth, *Oxalis leptocaulos* Phil., *Oxalis microphylla* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2600-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis incana Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Oxalis johnstonii R. Knuth

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Oxalis laciniata Cav.

Sinónimos: *Oxalis squamoso-radicosa* Steud., *Acetosella laciniata* (Cav.) Kuntze, *Acetosella squamoso-radicosa* (Steud.) Kuntze, *Oxalis prichardii* Rendle, *Oxalis squamoso-radicosa* Steud. var. *pubescens* Skotts., *Oxalis laciniata* Cav. var. *pubescens* (Skotts.) J.M.H. Shaw

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis laxa Hook. & Arn. var. ***hispidissima*** Barnéoud

Sinónimos: *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *violacea* R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *setifera* R. Knuth, *Acetosella platycaulis* (Steud.) Kuntze, *Oxalis chosicensis* R. Knuth, *Oxalis platycaulis* Steud., *Oxalis umbellata* Kuntze ex R. Knuth, nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Oxalis laxa Hook. & Arn. var. ***laxa***

Sinónimos: *Oxalis deflexa* Poepp. ex Progel, *Oxalis dichotomiflora* Steud., *Oxalis geranioides* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *major* R. Knuth, *Oxalis laxa* Hook. & Arn. var. *minor* Barnéoud, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *alsinoides* (Walp.) R. Knuth, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *purpurea* R. Knuth, *Oxalis brevicaulis* Steud., *Oxalis alsinoides* Walp.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Países limítrofes: Perú.

Oxalis leucophylla Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Oxalis loricata Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis magellanica G. Forst.

Sinónimos: *Oxalis carnosa* Molina, *Oxalis modesta* Phil., *Acetosella modesta* (Phil.) Kuntze, *Oxalis cataractae* A. Cunn., *Oxalis lactea* Hook.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Ojos de agua.

Oxalis matancillae Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 100-400 m.

Oxalis megalorrhiza Jacq.

Sinónimos: *Oxalis ornata* Phil., *Oxalis paposana* Phil., *Oxalis borchersii* Phil., *Oxalis darapskyi* Phil. ex Reiche, *Oxalis paniculata* Reiche, *Oxalis paposana* Phil. var. *hirta* R. Knuth, *Oxalis succulenta* Barnéoud, *Oxalis tarapacana* Phil., *Oxalis reticulata* Steud., *Oxalis illapelina* Phil., *Oxalis brevis* Phil., *Oxalis carnosa* Molina var. *incana* Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-3200 m.

Países limítrofes: Perú.

Oxalis micrantha Bertero ex Colla

Sinónimos: *Oxalis cumingii* Herb., *Acetosella cumingii* (Herb.) Kuntze, *Acetosella micrantha* (Bertero ex Colla) Kuntze, *Acetosella pygmaea* (Phil.) Kuntze, *Acetosella vinagrillo* (Steud.) Kuntze, *Oxalis micrantha* Bertero ex Colla var. *major* R. Knuth, *Oxalis pygmaea* Phil., *Oxalis vinagrillo* Steud., *Xanthoxalis micrantha* (Bertero ex Colla) Holub

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Oxalis mira Lourteig

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 400-600 m.

Oxalis morenoensis Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxalis nahuelhuapiensis Speg.

Sinónimos: *Oxalis comberi* R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, ARA.

Rango altitudinal: 1500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis novemfoliolata Heibl & Martic.

Subarbusto. Endémica.

Distribución: ATA

Rango altitudinal: 100-450 m.

Oxalis ornithopus Phil.

Sinónimos: *Acetosella ornithopus* (Phil.) Kuntze

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Oxalis ovalleana Phil.

Hierba suculenta. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Oxalis pachyrrhiza Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Oxalis penicillata Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 2000-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero

Sinónimos: *Oxalis delicatula* Phil., *Oxalis lobata* Sims, *Oxalis mallobolba* Cav., *Acetosella eriorrhiza* (Zucc.)

Kuntze, *Acetosella lobata* (Sims) Kuntze, *Acetosella mallobolba* (Cav.) Kuntze, *Acetosella perdicaria* (Molina)

Kuntze, *Oxalis autumnalis* A. St.-Hil., *Oxalis eriorrhiza* Zucc., *Oxalis tenera* Spreng., *Sassia perdicaria* Molina

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Flor de mayo, flor de la perdiz, mayo, rimu.

Oxalis pes-caprae L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, LLA, JFE.

Oxalis purpurea L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: JFE.

Oxalis pycnophylla Wedd.

Sinónimos: *Oxalis hauthalii* R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2200-5000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Oxalis ricardii Lourteig

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Oxalis rigida (Barnéoud) Lourteig

Sinónimos: *Oxalis adenocaulos* Phil., *Oxalis puberula* Phil., *Oxalis san-romanii* Phil., *Oxalis torcana* Phil., *Acetosella puberula* (Phil.) Kuntze, *Oxalis laxa* Hook. &

Arn. var. *rigida* Barnéoud

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, RME, LBO.

Rango altitudinal: 800-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxalis rosea Jacq.

Sinónimos: *Oxalis rosea* Jacq. var. *simplex* Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Culle colorado.

***Oxalis squamata* Zucc.**

Sinónimos: *Oxalis chilensis* R. Knuth, *Oxalis geminata* Hook. & Arn., *Oxalis hirthii* Phil., *Oxalis macropus* Phil., *Oxalis polyantha* Walp., *Acetosella geminata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acetosella macropus* (Phil.) Kuntze, *Acetosella polyantha* (Walp.) Kuntze, *Acetosella squamata* (Zucc.) Kuntze, *Oxalis trichocalyx* Steud., *Xanthoxalis polyantha* (Walp.) Holub

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis squarrosa* Barnéoud**

Sinónimos: *Oxalis briquetii* R. Knuth, *Oxalis coquimbana* Phil., *Oxalis glutinosa* Phil., *Acetosella squarrosa* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella glutinosa* (Phil.) Kuntze, *Acetosella coquimbana* (Phil.) Kuntze

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-2800 m.

***Oxalis strictula* Steud.**

Sinónimos: *Oxalis aberrans* Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

***Oxalis tacorensis* B.L. Burt**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 4200-5100 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Chincura.

***Oxalis tortuosa* Lindl.**

Sinónimos: *Oxalis gaudichaudii* Barnéoud, *Oxalis maritima* Barnéoud, *Oxalis glomerata* Hook. & Arn., *Oxalis bridgesii* Bertero ex Colla, *Oxalis zonata* Liebm.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, JFE.

Rango altitudinal: 0-300 m.

***Oxalis tuberosa* Molina**

Hierba suculenta. Perenne. Nativa.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Descrita para Chile por Molina (1782) y citada para Chile por Lourteig (2000), sin mencionar la localidad o material de referencia.

***Oxalis valdiviensis* Barnéoud**

Sinónimos: *Oxalis berningeri* R. Knuth, *Oxalis hapalconidea* Barnéoud, *Oxalis tolguacensis* R. Knuth, *Acetosella antucensis* (Phil.) Kuntze, *Acetosella hapalconidea* (Barnéoud) Kuntze, *Acetosella valdiviensis* (Barnéoud) Kuntze, *Oxalis antucensis* Phil., *Oxalis capillipes* R. Knuth, *Oxalis tinctoria* Poepp. ex Progel, *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *antucensis* (Phil.) Reiche, *Oxalis valdiviana* Vilm., *Oxalis valdiviensis* Barnéoud var. *humilis* Speg., *Xanthoxalis valdiviensis* (Barnéoud) Holub

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Oxalis virgosa* Molina**

Sinónimos: *Oxalis subcarnosa* Klotzsch ex Walp., *Acetosella virgosa* (Molina) Kuntze, *Acetosella subcarnosa* (Klotzsch ex Walp.) Kuntze

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

PAPAVERACEAE

Argemone

***Argemone crassifolia* G.B. Ownbey**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 1300 m.

***Argemone hunnemannii* Otto & A. Dietr.**

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *grandiflora* auct. non (Sweet) Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *chilensis* Prain, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hunnemannii* (Otto & A. Dietr.) Fedde, *Argemone mexicana* sensu Gay, non L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cardo blanco.

***Argemone rosea* Hook.**

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *rosea* (Hook.) Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *spinosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone mexicana* L. var. *tomentosa* Barnéoud ex Reiche, *Argemone platyceras* Link & Otto var. *hispido-rosea* Fedde

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Argemone subfusiformis G.B. Ownbey

Sinónimos: *Argemone mexicana* L. var. *ochroleuca* auct. non (Sweet) Lindl., *Argemone mexicana* auct. non L., *Argemone mexicana* L. var. *glauca* Barnéoud ex Reiche
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cardo blanco.

Eschscholzia

Eschscholzia californica Cham.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Fumaria

Fumaria agraria Lag.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Fumaria capreolata L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Fumaria officinalis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

Fumaria parviflora Lam.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, BIO.

Papaver

Papaver dubium L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAG.

Papaver hybridum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME.

Papaver rhoeas L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, LBO, LLA.

Papaver somniferum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO,

LRI, MAG, JFE.

PASSIFLORACEAE

Malesherbia

Malesherbia auristipulata Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 1800-2100 m.

Malesherbia campanulata Ricardi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 3300-4000 m.

Malesherbia corallina Muñoz-Schick & R. Pinto

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2700-2800 m.

Malesherbia densiflora Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2500-3100 m.

Malesherbia deserticola Phil.

Sinónimos: *Malesherbia borchersi* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3400-3500 m.

Malesherbia fasciculata D. Don var. *fasciculata*

Sinónimos: *Malesherbia thyrsoides* Bertero ex Steud., *Gynopleura fascicula* (D. Don) Roem.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 400-1000 m.

Malesherbia fasciculata D. Don var. *glandulosa* Ricardi

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Malesherbia humilis Poepp. var. *gabrielae* (Ricardi) Gengler

Sinónimos: *Malesherbia gabrielae* Ricardi

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 700-2600 m.

Malesherbia humilis Poepp. var. *humilis*

Sinónimos: *Gynopleura humilis* (D. Don) Roem., *Gynopleura dilatata* Walp., *Malesherbia dilatata* (Walp.) F. Phil.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 0-1800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Piojito, piojillo.

Malesherbia humilis Poepp. var. ***parviflora*** (Phil.) Ricardi
Sinónimos: *Malesherbia multiflora* Ricardi, *Malesherbia parviflora* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2900 m.

Malesherbia humilis Poepp. var. ***propinqua*** (Gay) Ricardi
Sinónimos: *Malesherbia propinqua* Gay, *Malesherbia humilis* D. Don var. *propinqua* (Gay) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 600-2000 m.

Malesherbia humilis Poepp. var. ***taltalina*** (Ricardi) Gengler
Sinónimos: *Malesherbia taltalina* Ricardi
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Malesherbia lactea Phil.
Sinónimos: *Malesherbia rosulata* Werderm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2500-3900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Malesherbia lanceolata Ricardi
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2900-3300 m.

Malesherbia linearifolia (Cav.) Pers.
Sinónimos: *Gynopleura linearifolia* Cav., *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Poir., comb. illeg., *Malesherbia coronota* D. Don, *Malesherbia subalpina* Poepp. ex Walp., *Gynopleura coronata* (D. Don) Roem., *Malesherbia humilis* D. Don var. *subalpina* (Poepp.) Gay
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 400-3200 m.

Malesherbia lirana Gay var. ***bracteata*** (Phil.) Ricardi
Sinónimos: *Malesherbia bracteata* Phil., *Malesherbia oblongifolia* auct. non Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3000-3500 m.

Malesherbia lirana Gay var. ***lirana***
Sinónimos: *Malesherbia hieronymi* Harms, *Malesherbia lirana* Gay var. *hieronymi* (Harms) Ricardi, *Malesherbia cuneata* Phil., *Malesherbia serpyllifolia* Phil., *Malesherbia lirana* Gay var. *serpyllifolia* (Phil.) Reiche, *Malesherbia lirana* Gay var. *subtomentosa* Kuntze, *Malesherbia incana* Werderm.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Malesherbia obtusa Phil. var. ***johnstonii*** (Werderm.) Ricardi
Sinónimos: *Malesherbia johnstonii* Werderm.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2500 m.

Malesherbia obtusa Phil. var. ***obtusa***
Sinónimos: *Malesherbia breviflora* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 500 m.

Malesherbia paniculata D. Don
Sinónimos: *Gynopleura coerulea* C. Presl, *Malesherbia linearifolia* (Cav.) Pers. var. *paniculata* (D. Don) Reiche
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 400-2500 m.
Nombre vulgar: Farolito.

Malesherbia rugosa Gay var. ***pseudopulverulenta*** Ricardi
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2000 m.

Malesherbia rugosa Gay var. ***rugosa***
Sinónimos: *Malesherbia ovata* Phil., *Malesherbia oblongifolia* Phil., *Malesherbia foliosa* Phil., *Malesherbia prolifera* Phil., *Malesherbia serrata* Phil., *Malesherbia brevipedunculata* Werderm., *Malesherbia glandulifera* Werderm.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.

Malesherbia tenuifolia D. Don
Sinónimos: *Gynopleura tenuifolia* (D. Don) Roem., *Malesherbia pulchra* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2500 m.

Malesherbia tocopillana Ricardi

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Passiflora

Passiflora foetida L.

Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 20-50 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Passiflora pinnatistipula Cav.

Sinónimos: *Passiflora chilensis* Miers, *Tacsonia pinnatistipula* (Cav.) Juss.
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2500-3000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Flor de la pasión, flor de la corona de Cristo, pasionaria, granadilla.

PHRYMACEAE

Erythranthe

Erythranthe bridgesii (Benth.) G.L. Nesom

Sinónimos: *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *bridgesii* Benth., *Mimulus longipes* Phil., *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var. *integrifolia* Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos var. *stoloniformis* Clos, *Mimulus bridgesii* (Benth.) Clos, *Mimulus acutidens* Reiche
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Placa, berro.

Erythranthe cuprea (Dombrain) G.L. Nesom

Sinónimos: *Mimulus luteus* L. var. *cuprea* Hook., *Mimulus cupreus* Dombrain
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-2100 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Placa, berro.

Erythranthe depressa (Phil.) G.L. Nesom var. ***cimum*** (C.

Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores
Sinónimos: *Mimulus depressus* Phil. var. *cimum* C. Bohlen

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 2900-3100 m.

Erythranthe depressa (Phil.) G.L. Nesom var. ***depressa***

Sinónimos: *Mimulus pissisi* Phil., *Mimulus acaulis* Phil., *Mimulus depressus* Phil. var. *acaulis* (Phil.) Reiche, *Mimulus depressus* Phil. var. *pissisi* (Phil.) Reiche, *Mimulus depressus* Phil.

Hierba. Anual o Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4500 m.

Erythranthe glabrata (Kunth) G.L. Nesom

Sinónimos: *Mimulus andicolus* Kunth, *Mimulus parviflorus* Lindl., *Mimulus glabratus* Kunth var. *parviflorus* (Lindl.) Grant, *Mimulus sylvaticus* Phil., *Mimulus kingii* Phil., *Mimulus tener* Phil., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *externa* Skotts., *Mimulus glabratus* Kunth var. *externus* (Skotts.) Skotts., *Mimulus pilosiusculus* Kunth, *Mimulus propinquus* Lindl., *Mimulus parviflorus* Lindl. var. *nana* Wedd., *Mimulus glabratus* Kunth

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Oqororo.

Erythranthe lutea (L.) G.L. Nesom var. ***lutea***

Sinónimos: *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus luteus* L. var. *nummularius* Clos, *Mimulus luteus* L. var. *micranthus* Phil., *Mimulus glabratus* Kunth var. *micranthus* (Phil.) Boivin, *Mimulus luteus* L. var. *rivularis* (Lodd.) Lindl., *Mimulus rivularis* Lodd., *Mimulus luteus* L. fma. *macrophyllus* Clos, *Mimulus punctatus* Miers ex Bertero, *Mimulus luteus* L.

Hierba. Anual o Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Erythranthe lutea (L.) G.L. Nesom var. ***variegata*** (Lodd.)

Hook.

Sinónimos: *Mimulus variegatus* Lodd., *Mimulus naiandinus* J.M. Watson & C. Bohlen, *Mimulus luteus* L. var. *variegatus* (Lodd.) Hook.

Hierba. Anual o Perenne. Endémica.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 500-2700 m.

Erythranthe minima (C. Bohlen) J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Mimulus minimus* C. Bohlen, *Mimulus depressus* Phil. var. *nanus* (Phil.) Reiche, *Mimulus nanus* auct. non Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

PHYTOLACCACEAE

Anisomeria

Anisomeria coriacea D. Don

Sinónimos: *Anisomeria drastica* (Bertero) Moq., *Pircunia drastica* Bertero, *Phytolacca drastica* (Bertero) Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 500-2600 m.

Nombre vulgar: Pircún, pircó, congrio.

Anisomeria littoralis (Poepp. & Endl.) Moq.

Sinónimos: *Phytolacca chilensis* Miers, nom. nud., *Phytolacca littoralis* Poepp. & Endl., *Anisomeria chilensis* (Miers) H. Walter, *Anisomeris fruticosa* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Ercilla

Ercilla spicata (Bertero) Moq.

Sinónimos: *Ercilla volubilis* A. Juss., *Galvezia spicata* Bertero, *Suriana volubilis* (A. Juss.) Dombey & Cav. ex D. Don, *Bridgesia spicata* (Bertero) Hook. & Arn., *Apodostachys densiflora* Turcz., *Phytolacca volubilis* (A. Juss.) Heimerl, *Ercilla spicata* (Hook. & Arn.) Moq.

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Nombre vulgar: Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voqui-traro.

Ercilla syncarpellata Nowicke

Arbusto trepador. Endémico.

Distribución: MAU, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Nombre vulgar: Coralillo, siete huiras, voqui-auca, voqui-traro.

Phytolacca

Phytolacca bogotensis Kunth

Sinónimos: *Phytolacca australis* Phil., *Phytolacca bogotensis* Kunth var. *australis* (Phil.) Hauman, comb. illeg., *Phytolacca micrantha* H. Walter, *Phytolacca parviflora* Hauman

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Carmín.

Phytolacca chilensis (Miers ex Moq.) H. Walter

Sinónimos: *Pircunia chilensis* Miers ex Moq.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO.

PIPERACEAE

Peperomia

Peperomia berteroana Miq.

Sinónimos: *Peperomia tristanensis* Christoph., *Peperomia berteroana* Miq. subsp. *tristanensis* (Christoph.) Valdeb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nota: También presente en Isla Inaccesible e Isla Tristan da Cunha.

Peperomia coquimbensis Skottsdb.

Hierba epífita. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 500 m.

Nombre vulgar: Congonilla.

Peperomia doellii Phil.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.

Peperomia fernandeziana Miq.

Sinónimos: *Peperomia fernandeziana* Miq. fma. *oblongifolia* Skottsdb., *Peperomia chilensis* C. DC.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, LRI, LLA, JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nombre vulgar: Congonilla.

Peperomia margaritifera Bertero ex Hook.

Sinónimos: *Peperomia margaritifera* Bertero ex Hook. var. *umbraticola* Skottsdb. ex Yunck.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-400 m.

Peperomia nummularioides Griseb.
Sinónimos: *Peperomia australis* Phil., *Peperomia nummulariifolia* Kunth
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Congonilla del monte.

Peperomia skottsbergii C. DC.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-600 m.

PITTOSPORACEAE

Pittosporum

Pittosporum crassifolium Banks & Sol. ex A. Cunn.
Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.

Pittosporum undulatum Vent.
Arbusto. Introducido.
Distribución: VAL.
Nombre vulgar: Pitosporo.

PLANTAGINACEAE

Bacopa

Bacopa monnieri (L.) Pennell
Sinónimos: *Lysimachia monnieri* L., *Herpestis monnieri* (L.) Kunth, *Bacopa monnieri* (L.) Wettst., nom. illeg., *Bramia indica* Lam.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, MAU.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Callitriche

Callitriche albomarginata Fassett
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2700 m.

Callitriche antarctica Engelm. ex Hegelm.
Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Callitriche deflexa A. Braun ex Hegelm.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Callitriche heterophylla Pursh
Hierba acuática. Anual. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett var. ***berteroana*** (Hegelm.) Fassett
Sinónimos: *Callitriche marginata* Torr. var. *berteroana* Hegelm., *Callitriche berteroniana* Steud.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, AIS.
Países limítrofes: Argentina.

Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett var. ***lechleri***
Sinónimos: *Callitriche marginata* Torr. var. *lechleri* Hegelm., *Callitriche oblongicarpa* Fassett
Hierba acuática. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Callitriche terrestris Raf. subsp. ***turfosa*** (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo
Sinónimos: *Callitriche turfosa* Bertero
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Callitriche truncata Guss.
Hierba acuática. Anual. Introducida.
Distribución: ARA, MAG.

Cymbalaria

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, MAU, BIO, JFE.

Digitalis

Digitalis purpurea L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Fonkia

Fonkia uliginosa Phil.

Sinónimos: *Gratiola uliginosa* (Phil.) F. Phil., *Gratiola peruviana* L. var. *uliginosa* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Gratiola

Gratiola peruviana L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Hebe

Hebe elliptica (G. Forst.) Pennell

Sinónimos: *Hebe magellanica* J.F. Gmel., *Veronica elliptica* G. Forst., *Veronica simpsoni* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hebe salicifolia (G. Forst.) Pennell

Sinónimos: *Veronica salicifolia* G. Forst., *Veronica fonki* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Hippuris

Hippuris vulgaris L.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pinito de agua.

Kickxia

Kickxia elatine (L.) Dumort.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, NUB, BIO, ARA, JFE.

Limosella

Limosella australis R. Br.

Sinónimos: *Limosella aquatica* L. var. *tenuifolia* (Nutt.) Hook.f., *Limosella aquatica* auct. non L., *Limosella tenuifolia* Nutt.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Linaria

Linaria canadensis (L.) Dum. Cours.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO, ARA, LRI.

Linaria vulgaris Mill.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, AIS.

Littorella

Littorella australis Griseb. ex Benth. & Hook.f.

Sinónimos: *Plantago araucana* Rahn

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mecardonia

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza

Sinónimos: *Herpestis flagellaris* Cham. & Schltdl., *Moniera flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Bacopa flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Wettst., *Moniera procumbens* (Mill.) Kuntze var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Kuntze, *Mecardonia flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Rossow, *Bacopa chamaedryoides* (Kunth) Wettst. var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) Chodat & Hassl.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. *procumbens*
Sinónimos: *Erinus procumbens* Mill., *Herpestis chamaedryoides* Kunth, *Bacopa procumbens* (Mill.) Greenm.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Melosperma

Melosperma andicola Benth.
Sinónimos: *Melosperma glabra* Phil., *Herpestis andicola* Gillies ex Benth.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 2300-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Melosperma angustifolia Phil.
Sinónimos: *Melosperma andicola* Benth. var. *angustifolia* (Phil.) Rossow
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 2500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Monttea

Monttea chilensis Gay var. *chilensis*
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Uvillo.

Monttea chilensis Gay var. *taltalensis* Reiche
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Ourisia

Ourisia alpina Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Ourisia pallens* Poepp. & Endl., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *pallens* (Poepp. & Endl.) Benth., *Ourisia rosea* Phil., *Ourisia alpina* Poepp. & Endl. var. *glabra* Phil., *Ourisia rancoana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia breviflora Benth. subsp. *breviflora*
Sinónimos: *Ourisia antarctica* Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia breviflora Benth. subsp. *uniflora* (Phil.) Meudt
Sinónimos: *Ourisia uniflora* Phil., *Ourisia breviflora* Benth. var. *uniflora* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, LLA.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia coccinea (Cav.) Pers. subsp. *coccinea*
Sinónimos: *Dichroma coccinea* Cav., *Ourisia villosa* Molina, *Ourisia pearcei* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia coccinea (Cav.) Pers. subsp. *elegans* (Phil.) Meudt
Sinónimos: *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *minor* Benth., *Ourisia coccinea* (Cav.) Pers. var. *elegans* (Phil.) Reiche, *Ourisia elegans* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 100-2600 m.

Ourisia fragrans Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 1300-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia fuegiana Skottsbo.
Sinónimos: *Ourisia muscosa* auct. non Benth.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia microphylla Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Ourisia polyantha* auct. non Poepp. & Endl.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 800-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia muscosa Benth.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3800-5000 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Ourisia polyantha Poepp. & Endl.

Sinónimos: *Ourisia diazii* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 1300-2400 m.

Ourisia pygmaea Phil.

Sinónimos: *Ourisia uniflora* auct. non Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1400-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia ruelloides (L.f.) Kuntze

Sinónimos: *Ourisia poeppigii* Benth., *Ourisia racemosa* Clos, *Ourisia magellanica* C.F. Gaertn., *Ourisia glabra* Molina, *Chelone ruelloides* L.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ourisia serpyllifolia Benth.

Sinónimos: *Ourisia melospermoides* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 1000-2200 m.

Plantago

Plantago australis Lam. subsp. *australis*

Sinónimos: *Plantago candollei* Raf., *Plantago accrescens* Pilg., *Plantago kurtzii* Pilg., *Plantago refracta* Pilg., *Plantago stuckertii* Pilg., *Plantago leptophylla* Decne., *Plantago cantagallensis* Zahlbr., *Plantago bicallosa* Decne., *Plantago australis* Lam. subsp. *angustifolia* (Pilg.) Rahn, *Plantago bicallosa* Decne. var. *angustifolia* Pilg., *Plantago gigantea* Decne., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, VAL, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Plantago australis Lam. subsp. *cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Rahn

Sinónimos: *Plantago cumingiana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago pugae* Phil., *Plantago calbucana* Phil., *Plantago foncki* Phil., *Plantago tomentosa* Lam. var. *foncki* (Phil.)

Reiche, *Plantago laevigata* Phil., *Plantago ovata* Phil., *Plantago julieti* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago barbata G. Forst. subsp. *austroandina* Rahn

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago barbata G. Forst. subsp. *barbata*

Sinónimos: *Plantago andicola* Gillies ex Hook.f., *Plantago imberbis* Hook.f., *Plantago pauciflora* Lam., *Plantago barbata* G. Forst. var. *pauciflora* (Gay) Pilg., *Plantago andicola* Decne. ex Barnéoud, *Plantago pauciflora* Lam. var. *major* Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. var. *imberbis* Hook.f., *Plantago caespitosa* Phil., *Plantago barbata* G. Forst. var. *caespitosa* (Phil.) Pilg., *Plantago pachyrrhiza* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago barbata G. Forst. subsp. *monanthos* (d'Urv.) Rahn

Sinónimos: *Plantago monanthos* d'Urv., *Plantago polymorpha* Banks & Sol. ex Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *elongata* Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. var. *monanthos* (d'Urv.) Pilg.,

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Plantago barbata G. Forst. subsp. *muscooides* (Hook.f.) Rahn

Sinónimos: *Plantago monanthos* d'Urv. var. *muscooides* Hook.f., *Plantago monanthos* d'Urv. var. *abbreviata* Hook.f., *Plantago barbata* G. Forst. fma. *muscooides* (Hook.f.) Pilg., *Plantago barbata* G. Forst. fma. *abbreviata* (Hook.f.) Pilg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago brasiliensis* Sims**

Sinónimos: *Plantago brasiliensis* Sims var. *gayana* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago obtusata* Decne., *Plantago chilensis* Rapin, *Plantago decaisnei* Barnéoud, *Plantago gayana* Decne. ex Barnéoud, *Plantago lasiothrix* Kunze ex Decne., *Plantago brasiliensis* Sims var. *chilensis* (Rapin) Pilg., *Plantago sericea* Ruiz & Pav. var. *decaisnei* (Barnéoud) Wedd., *Plantago brasiliensis* Sims var. *decaisnei* (Barnéoud) Pilg., *Plantago brasiliensis* Sims var. *lasiothrix* (Decne.) Pilg., *Plantago dolichophylla* Phil., *Plantago vidali* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago coronopus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, LBO, NUB, BIO, ARA.

***Plantago fernandezia* Bertero ex Barnéoud**

Sinónimos: *Robinsonia nervosa* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 500-600 m.

***Plantago firma* Kunze ex Walp.**

Sinónimos: *Plantago brachystachys* Walp., *Plantago virginica* L. var. *firma* (Walp.) Reiche, *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. var. *canohirsuta* Pilg., *Plantago leonensis* Steud., *Plantago clausa* Steud., *Plantago marginata* Steud., *Plantago skottsbergii* Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. subsp. *skottsbergii* (Pilg.) Pilg., *Plantago truncata* Cham. & Schltdl. subsp. *firma* (Kuntze ex Walp.) Pilg.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

***Plantago grandiflora* Meyen**

Sinónimos: *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *nitidifolia* Barnéoud, *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *trichophylla* Phil., *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *hirsuta* Phil., *Plantago macrantha* Decne. ex Barnéoud var. *argentea* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1300-2800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago hispidula* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Plantago callosa* Colla, *Plantago macrosperma* Steud., *Plantago subtrinervis* Phil., *Plantago stenopetala*

Phil., *Plantago disticha* Phil., *Plantago albida* Phil., *Plantago steinheilii* Barnéoud, *Plantago heterophylla* Phil., nom. illeg., *Plantago stenopetala* Phil. var. *stricta* Phil., *Plantago tumida* Link

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nombre vulgar: Llantén.

***Plantago johnstonii* Pilg.**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

***Plantago lanceolata* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Plantago litorea* Phil.**

Sinónimos: *Plantago philippiana* Vatke, *Plantago glabriuscula* Phil., *Plantago oligantha* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

***Plantago lundborgii* Sparre**

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: IDE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

***Plantago major* L.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

***Plantago maritima* L.**

Sinónimos: *Plantago juncooides* Lam., *Plantago maritima* L. var. *juncooides* (Lam.) A. Gray

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Plantago pachyneura* Steud.**

Sinónimos: *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. subsp. *eupachyneura* (Pilg.) Pilg., nom. illeg., *Plantago australis* Lam. subsp. *pachyneura* (Steud.) Rahn, *Plantago pachyneura* Steud. subsp. *eupachyneura* Pilg., *Plantago hygrophila* Steud., *Plantago pachyneura* Steud. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago durvillei* Fisch. & C.A. Mey. var. *hygrophila* (Steud.) Pilg., *Plantago berteroi* Steinh. ex Decne., *Plantago pachystachys* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 1300-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Plantago pulvinata Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-400 m.
Países limítrofes: Argentina.

Plantago rancaguae Steud.
Sinónimos: *Plantago quillota* Vatke, *Plantago deserticola* Phil., *Plantago steinheilii* Barnéoud, *Plantago brachyantha* Phil., *Plantago bracteosa* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Plantago sempervivoides Dusén
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 700-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Plantago sericea Ruiz & Pav. subsp. *araucana* Rahn
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: MAU, BIO.
Rango altitudinal: 1200 m.

Plantago sericea Ruiz & Pav. subsp. *sericans* (Pilg.) Rahn
Sinónimos: *Plantago monticola* Decne., *Plantago monticola* Decne. subsp. *sericans* Pilg., *Plantago monticola* Decne. subsp. *eumonticola* Pilg., nom. illeg.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2900-4400 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Plantago tehuelcha Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, MAG.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Países limítrofes: Argentina.

Plantago truncata Cham. & Schltld.
Sinónimos: *Plantago australis* Lam. subsp. *truncata* (Cham. & Schltld.) Rahn, *Plantago eschscholtziana* Fisch. & C.A. Mey., *Plantago truncata* Cham. & Schltld. subsp. *eschscholtziana* (Fisch. & C.A. Mey.) Pilg., *Plantago berteroniana* Steud., *Plantago obscura* Steud., *Plantago bridgesii* Decne., *Plantago valparadisiaca* Decne., *Plantago amphibola* Phil., *Plantago angustifolia* Phil., *Plantago tomentosa* Lam. subsp. *angustifolia* (Phil.)

Reiche, *Plantago truncata* Cham. & Schltld. var. *philippii* Pilg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Plantago tubulosa Decne.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2900-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Psike.

Plantago uniglumis Wallr. ex Walp.
Sinónimos: *Plantago coelorhiza* Morris & Macloskie, *Plantago barbata* G. Forst. var. *uncialis* Wedd., *Plantago uncialis* Decne. ex Barnéoud, *Plantago barbata* G. Forst. fma. *uncialis* (Decne. ex Barnéoud) Pilg., *Plantago uniglumis* Wallr. ex Walp. fma. *maxima* Pilg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 200-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Stemodia

Stemodia durantifolia (L.) Sw. var. *chilensis* (Benth.) C.C. Cowan
Sinónimos: *Stemodia chilensis* Benth., *Stemodiaca chilensis* Kuntze
Hierba acuática. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Contrayerba.

Veronica

Veronica anagallis-aquatica L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Veronica arvensis L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.

Veronica beccabunga L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

Veronica chamaedrys L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: LRI.

Veronica officinalis L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ARA, LRI.

Veronica peregrina L. subsp. *xalapensis* (Kunth) Pennell
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, AIS, MAG.

Veronica persica Poir.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,
NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Veronica scutellata L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LRI, LLA.

Veronica serpyllifolia L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA, AIS, MAG.

PLUMBAGINACEAE

Armeria

Armeria maritima (Mill.) Willd.
Sinónimos: *Armeria maritima* (Mill.) Willd. subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) D.M. Moore & Yates, *Armeria andina* Poepp. ex Boiss., *Armeria macloviana* Cham., *Armeria curvifolia* Bertero, *Armeria chilensis* Boiss., *Armeria androsaeca* Boiss., *Armeria brachyphylla* Boiss., *Armeria delfinii* Phil., *Armeria tenuifolia* Phil., *Armeria patagonica* Phil., *Armeria exaristata* Phil., *Armeria aegialea* Phil., *Armeria bella* Albov., *Statice punicea* Rendle, *Statice macloviana* Mackloskie, *Statice maritima* Mill.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Para una completa sinonimia, ver E. Ruiz, Flora de Chile 2(3): 2. 2005.

Bakerolimon

Bakerolimon plumosum (Phil.) O.A. Lincz.
Sinónimos: *Limonium plumosum* (Phil.) Kuntze, *Statice*

plumosa Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Limonium

Limonium guaicura (Molina) Kuntze
Sinónimos: *Plegorrhiza guaicura* Molina, *Statice chilensis* Phil., *Plegorrhiza adstringens* Willd.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Nombre vulgar: Guaicurú.

Plumbago

Plumbago caerulea Kunth
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

POLEMONIACEAE

Bryantiella

Bryantiella glutinosa (Phil.) J.M. Porter
Sinónimos: *Gilia glutinosa* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-3700 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Lipelipe, pachareke, alhucema del campo, pasto de lluvia.

Collomia

Collomia biflora (Ruiz & Pav.) Brand
Sinónimos: *Gilia biflora* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phlox biflora* Ruiz & Pav., *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn., *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma. *coccinea* (Lehm. ex Lindl.) Wherry, *Collomia coccinea* Lehm. ex Lindl., *Collomia soehrensi* Phil., *Collomia stenosisiphon* Kunze, *Collomia lateritia* Don, *Collomia biflora* (Ruiz & Pav.) Brand var. *lateritia* (Don) Brand, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma. *lateritia* (Don) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma. *soehrensi* (Phil.) Wherry, *Collomia cavanillesii* Hook. & Arn. fma. *stenosisiphon* (Kunze) Wherry, *Phlox unidentata* Bertero
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 200-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gilia

Gilia crassifolia Benth.

Sinónimos: *Gilia crassifolia* Benth. var. *andicola* (Phil.) Brand, *Gilia lanigera* Phil., *Gilia andicola* Phil., *Gilia intermedia* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Gilia laciniata Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-4300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Latalata, comino del campo.

Gilia valdiviensis Griseb.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nota: Introducida en la isla Más Afuera (Archipiélago Juan Fernández).

Ipomopsis

Ipomopsis gossypifera (Gillies ex Benth.) V.E. Grant

Sinónimos: *Gilia gossypifera* Gillies ex Benth., *Gilia involucrata* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2400-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Leptosiphon

Leptosiphon pusillus (Benth.) J.M. Porter & L.A. Johnson

Sinónimos: *Linanthus pusillus* (Benth.) Greene, *Gilia pusilla* Benth.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Microsteris

Microsteris gracilis (Hook.) Greene

Sinónimos: *Gilia gracilis* Hook., *Collomia gracilis* (Hook.) Douglas ex Benth., *Gilia gracilis* Hook. var. *minuartioides* (Franch.) Borsini, comb. illeg., *Collomia gracilis* (Hook.)

Douglas ex Benth. var. *minuartioides* Franch., *Collomia eritrichoides* Griseb., *Gilia gracilis* Hook. var. *eritrichoides* (Griseb.) Brand, *Polemonium morenonis* Kuntze, *Navarretia gracilis* (Hook.) Kuntze, *Phlox gracilis* (Hook.) Greene, *Gilia gracilis* Phil., hom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Navarretia

Navarretia involucrata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Gilia berterii* DC., *Gilia navarretia* Steud., *Gilia mucronata* Lehm., *Gilia eryngoides* Lehm., *Collomia navarretia* G. Don
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Polemonium

Polemonium micranthum Benth.

Sinónimos: *Polemonium antarcticum* Griseb., *Polemonium gayanum* (Wedd.) Brand, *Gilia gayana* Wedd., *Gilia diffusa* Phil., *Gilia johowi* F. Meigen, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *diffusa* (Phil.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *gayana* (Wedd.) Wherry, *Polemoniella antarctica* (Griseb.) A. Nelson & J.F. Macbr. fma. *johowi* (F. Meigen) Wherry
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

POLYGALACEAE

Monnina

Monnina linearifolia Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Pteromonnina linearifolia* (Ruiz & Pav.) B. Eriksen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Agua-rica, quelén-quelén.

Monnina philippiana Chodat

Sinónimos: *Monnina pterocarpa* Ruiz & Pav. var. *angustifolia* (DC.) Hook. & Arn., *Pteromonnina philippiana* (Chodat) B. Eriksen, *Monnina angustifolia* auct. non DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 100-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polygala

Polygala darwiniana A.W. Benn.

Sinónimos: *Acanthocladus tehuelchum* Speg., *Polygala tehuelchum* (Speg.) Speg.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polygala gayi A.W. Benn.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1600 m.

Polygala gnidioides Willd.

Sinónimos: *Polygala thesioides* Willd., *Polygala pratensis* Phil., *Polygala eutaxoides* Turcz.

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chin-chín, quelén-quelén, clinclín, quelulahuén.

Polygala persistens A.W. Benn.

Sinónimos: *Polygala paradoxa* Chodat

Hierba. Bienal o perenne. Nativa.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polygala salasiana Gay

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Polygala solieri Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 2800-3000 m.

Polygala subandina Phil.

Sinónimos: *Polygala oxyantha* Phil., *Polygala philippiana* Chodat, *Polygala mendocina* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, LBO, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-4500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

POLYGONACEAE

Chorizanthe

Chorizanthe commissuralis J. Remy

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pegadera, kinchanlawá.

Chorizanthe dasyantha Phil.

Sinónimos: *Chorizanthe fasciculata* Phil., *Chorizanthe humilis* Phil., *Chorizanthe illapelina* Phil., *Chorizanthe intricata* Phil., *Chorizanthe parviflora* Phil., *Chorizanthe tenuis* Phil., hom. illeg.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Chorizanthe densa Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 800-900 m.

Chorizanthe deserticola Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Chorizanthe flavescens Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Chorizanthe frankenioides J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Chorizanthe gajardoi Teillier & Macaya

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 1850-1950 m.

***Chorizanthe glabrescens* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe tenuis* Phil., *Chorizanthe vaginata* Benth. var. *arida* J. Remy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.

***Chorizanthe kingii* Phil.**

Sinónimos: *Chorizanthe pauciflora* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

***Chorizanthe mieresii* Teillier & Macaya**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 3-260 m.

***Chorizanthe navasiae* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 5-280 m.

***Chorizanthe novoana* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-100 m.

***Chorizanthe paniculata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe macraei* Benth., *Chorizanthe macraei* Benth. var. *humilis* Benth., *Chorizanthe ramosissima* Benth., *Chorizanthe rosea* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Nombre vulgar: Sanguinaria.

***Chorizanthe peduncularis* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe umbellata* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.

***Chorizanthe rosasii* Teillier & Macaya**

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1700-2600 m.

***Chorizanthe vaginata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe vaginata* Benth. var. *maritima* J. Remy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-200 m.

***Chorizanthe virgata* Benth.**

Sinónimos: *Chorizanthe virgata* Benth. var. *tomentosa* Benth.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 900 m.

***Chorizanthe viridis* Phil.**

Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 800-1100 m.

Emex

***Emex spinosa* (L.) Campd.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ.

Fallopia

***Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr.**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA, AIS.

***Fallopia sachalinensis* (F. Schmidt)**

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: LLA.

Koenigia

***Koenigia islandica* L.**

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: MAG.

Lastarriaea

***Lastarriaea chilensis* J. Remy**

Sinónimos: *Lastarriaea linearis* Phil. ex Parry, *Lastarriaea stricta* Phil., *Chorizanthe chilensis* (J. Remy) Goodman, *Chorizanthe lastarriaea* Parry, nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-200 m.

Muehlenbeckia

***Muehlenbeckia fruticulosa* (Walp.) Standl.**

Sinónimos: *Polygonum fruticosum* Walp.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 3400-3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Visvisa.

Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. ***fascicularis*** (Meisn.) Brandbyge

Sinónimos: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *fascicularis* Meisn.

Arbusto. Nativo.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. ***hastulata***

Sinónimos: *Muehlenbeckia chilensis* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *brachybotrys* Meisn., *Muehlenbeckia chilensis* Meisn. var. *injucunda* (Lindl.) Meisn., *Polygonum hastulatum* (Sm.) Kuntze, *Polygonum injucunda* Lindl., *Rumex hastulatus* Sm., *Karkinetron undulatum* Raf., *Calacinum chilense* (Meisn.) J.F. Macbr.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Mollaca, quilo, voqui negro.

Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. ***rotundata*** (Phil.) Brandbyge

Sinónimos: *Muehlenbeckia rotundata* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: NUB, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Oxytheca

Oxytheca dendroidea Nutt. subsp. ***chilensis*** (J. Remy) Ertter

Sinónimos: *Brisegnoa chilensis* J. Remy, *Oxytheca apiculata* Miers ex Benth., nom. nud., *Oxytheca spiculata* Miers

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2100-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Persicaria

Persicaria maculosa Gay

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Polygonum

Polygonum acuminatum Kunth

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, IPA.

Nombre vulgar: Tavari (Rapa Nui).

Polygonum aviculare L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Polygonum bowenkampii Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Polygonum brasiliense K. Koch

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AIS, MAG.

Polygonum campanulatum Hook. f.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: LLA, AIS.

Polygonum convolvulus L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Polygonum hydropiper L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO, LLA.

Polygonum hydropiperoides Michx.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Polygonum lapathifolium L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

Polygonum maritimum L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, NUB, BIO, LRI, LLA, AIS, MAG.

Polygonum mite Schrank

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL.

Polygonum orientale L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: RME, BIO, ARA.

Polygonum sanguinaria J. Remy

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, AIS.

Rango altitudinal: 0-2200 m.

Nombre vulgar: Sanguinaria.

Rumex

Rumex acetosa L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: MAG.

Rumex acetosella L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rumex conglomeratus Murray var. *vulgaris* Wallr.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.

Rumex crispissimus Kuntze

Sinónimos: *Rumex decumbens* Dusén

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, MAG.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rumex crispus L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.

Rumex cristatus DC.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LLA.

Rumex cuneifolius Campd.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, VAL, RME, BIO, ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Rumex darwinianus Rech. f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Rumex longifolius DC.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, MAG.

Rumex magellanicus Campd.

Sinónimos: *Rumex hippiatricus* J. Remy, *Rumex magellanicus* Griseb., hom. illeg., *Rumex magellanicus* Campd. var. *dusenii* Rech.f., *Rumex erosus* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Huaicrahu.

Rumex maricola J. Remy

Sinónimos: *Rumex cuneifolius* Campd. var. *maricola* (J. Remy) Rech.f., *Rumex arenarius* Poepp. ex Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Rumex maritimus L.

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, MAG.

Rumex obtusifolius L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, LBO, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rumex patagonicus Rehb.f.

Sinónimos: *Rumex chiloensis* Rehb.f.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ARA, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Rumex pulcher L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG, JFE.

Rumex romassa J. Remy

Sinónimos: *Rumex asplundii* Rech.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

PORTULACACEAE

Portulaca

Portulaca oleracea L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

Portulaca philippii I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 500-3600 m.

Países limítrofes: Bolivia.

PRIMULACEAE

Anagallis

Anagallis alternifolia Cav. var. *alternifolia*

Sinónimos: *Anagallis alternifolia* Cav. var. *minor* R. Knuth,

Anagallis alternifolia Cav. var. *tenelliformis* R. Knuth fma.

laxa R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,

NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Anagallis alternifolia Cav. var. *repens* (d'Urv.) Knuth

Sinónimos: *Lysimachia repens* d'Urv., *Anagallis alternifolia*

Cav. var. *densifolia* Hook.f., *Euparea chilensis* Baudo,

Anagallis alternifolia Cav. var. *angustifolia* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,

BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Anagallis arvensis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO,

MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

Androsace

Androsace salasii Kurtz

Sinónimos: *Collomia pusilla* Dusén, *Androsace pusilla*

(Dusén) Lourteig

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Centunculus

Centunculus minimus L.

Sinónimos: *Anagallis minima* (L.) E.H.L. Krause

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, JFE.

Lysimachia

Lysimachia sertulata Baudo

Sinónimos: *Lysimachia chilensis* (Griseb.) Knuth,

Lysimachia marginata Macloskie, *Lysimachia umbellata*

Phil., *Theopyxis chilensis* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Melilukul.

Pelletiera

Pelletiera verna A. St.-Hil.

Sinónimos: *Pelletiera serpyllifolia* (Poir.) Kuntze,

Asterolinon serpyllifolium (Poir.) Ball, *Asterolinon trinum*

Baudo

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, BIO, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Primula

Primula comberi W.W. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA.

Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Primula magellanica Lehm.

Sinónimos: *Primula decipiens* Duby, *Primula farinosa* L.

var. *magellanica* (Lehm.) Hook.f., *Primula farinosa* L.

subsp. *magellanica* (Lehm.) W.W. Sm. & Forrest

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Primula, oreja de oso.

Samolus

Samolus latifolius Duby

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Samolus repens (J.R. Forst. & G. Forst.) Pers.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO.

Nota: Se encuentra también en Australia.

Samolus spathulatus (Cav.) Duby

Sinónimos: *Androsace spathulata* Cav., *Primula pistiifolia*

Griseb., *Steirostemon spathulatus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.

***Samolus valerandi* L.**
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 10-2500 m.

PROTEACEAE

Embothrium

***Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst.**
Sinónimos: *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst.
var. *cavanillesii* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R.
Forst. & G. Forst. var. *oblanceolatum* Kuntze, *Embothrium*
coccineum J.R. Forst. & G. Forst. var. *lanceolatum* (Ruiz &
Pav.) Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst. & G. Forst.
var. *obovatum* Kuntze, *Embothrium coccineum* J.R. Forst.
& G. Forst. fma. *lanceolatum* (Ruiz & Pav.) R.L. Pérez-
Mor., *Embothrium lanceolatum* Ruiz & Pav., *Embothrium*
valdivianum Gand., *Embothrium gilliesii* Meisn.
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Notro, notru, ciruelillo, fosforito, treumún.

Gevuina

***Gevuina avellana* Molina**
Sinónimos: *Quadria heterophylla* Ruiz & Pav., *Quadria*
avellana (Molina) Gaertn.
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 100-700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Avellano, Gevuín.

Lomatia

***Lomatia dentata* (Ruiz & Pav.) R. Br.**
Sinónimos: *Embothrium dentatum* Ruiz & Pav., *Tricondylus*
dentatus (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Lomatia dentata* (Ruiz &
Pav.) R. Br. var. *acutifolia* Meisn., *Lomatia dentata* (Ruiz &
Pav.) R. Br. var. *obtusifolia* Meisn.
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Avellanillo, piñol, guardafuego, palo negro.

***Lomatia ferruginea* (Cav.) R. Br.**
Sinónimos: *Embothrium ferrugineum* Cav., *Tricondylus*
ferrugineus (Cav.) Salisb., *Lomatia pinnatifida* Hort ex
Thornton, nom. nud.
Árbol. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS,
MAG.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Fuínque, romerillo, huínque, piuné, moré.

***Lomatia hirsuta* (Lam.) Diels subsp. *obliqua* (Ruiz & Pav.)
R.T. Penn.**
Sinónimos: *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br.,
Tricondylus obliqua (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Lomatia*
obliqua (Ruiz & Pav.) R. Br. var. *alnifolia* (Poepp. ex
Meisn.) Meisn., *Lomatia obliqua* (Ruiz & Pav.) R. Br. var.
subintegrifolia Meisn., *Embothrium obliquum* Ruiz & Pav.
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Radal, raral, nogal silvestre.

Orites

***Orites myrtoidea* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook.f. ex
B.D. Jacks.**
Sinónimos: *Lomatia chilensis* Gay, *Roupala myrtoidea*
Poepp. & Endl., *Lomatia alpina* Phil., nom. nud.,
Embothrium myrtifolium Poepp. ex Meisn., *Tricondylus*
chilensis (Gay) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 700-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Radal enano.

QUILLAJACEAE

Quillaja

***Quillaja saponaria* Molina**
Sinónimos: *Quillaja molinae* DC., *Quillaja poeppigii* Walp.,
Smegmadermos emarginatus Ruiz & Pav., *Smegmaria*
emarginata (Ruiz & Pav.) Willd.
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA.

Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Quillay.

RAFFLESIACEAE

Pilostyles

Pilostyles berteroi Guill.

Sinónimos: *Apodanthes berteroi* (Guill.) Gardner, *Frostia berteroi* H. Karst.

Hierba parásita. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, NUB.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

RANUNCULACEAE

Anemone

Anemone antucensis Poepp.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG.

Rango altitudinal: 100-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Anemone decapetala Ard. var. *decapetala*

Sinónimos: *Anemone trilobata* Juss., *Anemone chilensis* Spreng. ex Pritz., nom. nud., *Anemone decapetala* Ard. fma. *primaria* Eichler, *Anemone chilensis* Spreng. ex Eichler, nom. nud., *Anemone decapetala* Ard. var. *grandifolia* Eichler, *Anemone polypetala* Larrañaga, *Anemone bilobata* Phil., *Anemone chilensis* Spreng. ex Eichler, *Anemone chilensis* Spreng. ex Pritzel, *Anemone macrorrhiza* Dombey ex Eichler

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Centella.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Anemone decapetala Ard. var. *foliolosa* Eichler

Sinónimos: *Anemone cicutifolia* I.M. Johnst., *Anemone triternata* Vahl, *Anemone decapetala* Ard. var. *triloba* Juss. ex Lorentz, *Anemone fumariaefolia* Juss., *Anemone decapetala* Ard. var. *triternata* (Vahl) Kuntze, *Anemone decapetala* Niederl., *Anemone tridentata* Britton

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Centella, flor de la esperanza.

Anemone hepaticifolia Hook.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Flor de la estrella.

Anemone moorei Espinosa

Subarbusto. Endémico.

Distribución: MAU.

Rango altitudinal: 500 m.

Nombre vulgar: Pata de león.

Anemone multifida Poir.

Sinónimos: *Anemone multifida* Poir. var. *grandiflora* Rendle, *Anemone multifida* Poir. var. *lanigera* (Gay) Ulbr., *Anemone commersoniana* Richardson ex Spreng., *Anemone multifida* Poir. var. *magellanica* DC., *Anemone multifida* Poir. var. *commersoniana* (Richardson ex Spreng.) Ulbr., *Anemone multifida* Poir. var. *hudsoniana* DC., *Anemone lanigera* Gay, *Anemone multifida* Poir. var. *uniflora* DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Anemone rigida Gay

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Aquilegia

Aquilegia vulgaris L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Barneoudia

Barneoudia balliana Britton

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME.

Rango altitudinal: 3000-5000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Barneoudia chilensis Gay

Sinónimos: *Barneoudia cyanoleuca* Leyb., *Barneoudia domeykoana* Leyb., *Anemone chilensis* (Gay) Kurtz, *Anemone chilensis* (Gay) Reiche, comb. illeg., *Anemone barneoudia* Kuntze, *Anemone gayana* R. Wagner

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Barneoudia major Phil.

Sinónimos: *Anemone major* (Phil.) F. Meigen, *Anemone major* (Phil.) Reiche, comb. illeg., *Barneoudia maxima* Leyb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Callianthemoides

Callianthemoides semiverticillata (Phil.) Tamura

Sinónimos: *Anemone myriophylla* Speg., *Ranunculus pseudosemiverticillatus* Espinosa & C. Rudolph, *Ranunculus semiverticillatus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA.
Rango altitudinal: 100-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Caltha

Caltha appendiculata Pers.

Sinónimos: *Caltha appendiculata* Pers. var. *chilensis* Huth, *Caltha limbata* Schtdl., *Caltha paradoxa* Sol. ex T.F. Forst., *Psychrophila appendiculata* (Pers.) Gay, *Caltha holophylla* Leyb., *Psychrophila holophylla* Leyb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Caltha dioneifolia Hook.f.

Sinónimos: *Psychrophila dioneifolia* (Hook.f.) Gay
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Caltha sagittata Cav.

Sinónimos: *Caltha involuta* A.W. Hill, *Caltha alata* A.W. Hill, *Caltha sagittata* Cav. var. *latifolia* Huth, *Psychrophila sagittata* (Cav.) Gay, *Psychrophila andicola* Gay, *Caltha multicapsularis* Sol. ex T.F. Forst., *Caltha andicola* (Gay) Walp., *Caltha de rancho* Steud., *Caltha digitata* A. Cunn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Maillico.

Clematis

Clematis bonariensis Juss. ex DC.

Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 120-320 m.

Clematis montevidensis Spreng.

Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: ATA.

Halerpestes

Halerpestes cymbalaria (Pursh) Greene

Sinónimos: *Ranunculus microcarpus* J. Presl, *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC., *Ranunculus pozoaefolius* Gay, *Ranunculus minutus* Gay, *Ranunculus hemignostus* Steud., *Ranunculus maritimus* Phil., *Ranunculus minutus* Gay var. *microphylla* Phil. ex Reiche, *Ranunculus cymbalaria* Pursh, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *americanus* DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *major* DC., *Ranunculus tridentatus* Kunth ex DC. var. *minor* DC., *Ranunculus microcarpus* J. Presl var. *maritima* Phil., *Halerpestes tridentata* (Kunth ex DC.) Greene
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Halerpestes exilis (Phil.) Tamura

Sinónimos: *Ranunculus cymbalaria* Pursh fma. *exilis* (Phil.) Lourteig, *Ranunculus cymbalaria* Pursh var. *exilis* (Phil.) R.E. Fr., *Ranunculus exilis* Phil., *Ranunculus minutus* Gay var. *exilis* (Phil.) Reiche, *Ranunculus minutiusculus* Ulbr.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Halerpestes uniflora (Phil. ex Reiche) Emadzade,

Lehnebach, P. Lockh. & Hörandl
Sinónimos: *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek, *Ranunculus pseudocaltha* Chodat & Wilczek fma. *minor* Chodat & Wilczek, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus uniflorus* Phil. ex Reiche fma. *bolivianus* (Phil.) Lourteig, *Ranunculus bolivianus* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, MAU, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Hamadryas

Hamadryas delfinii Phil. ex Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hamadryas kingii Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hamadryas magellanica Lam.

Sinónimos: *Hamadryas tomentosa* DC., *Hamadryas magellanica* Lam. var. *tomentosa* (DC.) Hook.f., *Hamadryas magellanica* Franchet, *Hamadryas paniculata* Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Hamadryas sempervivoides Sprague

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 700-1300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Myosurus

Myosurus apetalus Gay

Sinónimos: *Myosurus gracilis* (Speg.) Macloskie, *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f. var. *apetalus* (Gay) Huth, *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f. var. *gracilis* Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f. var. *brachypoda* Speg., *Myosurus aristatus* Benth. ex Hook.f.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Myosurus patagonicus Speg.

Sinónimos: *Myosurus minimus* auct. non L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: RME, NUB, BIO, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus

Ranunculus acaulis Banks & Sol. ex DC.

Sinónimos: *Ranunculus skottsbergii* Gand., *Ranunculus stenopetalus* Hook., *Ranunculus litoralis* Schltdl. ex Lechl.,

nom. nud., *Ranunculus litoralis* Phil., *Ranunculus biternatus* Vallengin & Cotton, *Ranunculus uniflorus* Colenso

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus apiifolius Pers.

Sinónimos: *Ranunculus sceleratus* auct. non L., *Aphanostemma apiifolium* (Pers.) A. St.-Hil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Apio cimarrón.

Ranunculus aquatilis L.

Hierba acuática. Perenne. Introducida.

Distribución: AYP, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.

Ranunculus arvensis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: MAU, NUB, BIO.

Ranunculus biternatus Sm.

Sinónimos: *Ranunculus exiguus* d'Urv., *Ranunculus commersonii* DC. ex Poir., *Ranunculus montteanus* Phil., *Ranunculus crassipes* Hook.f., *Ranunculus flaccidus* Banks & Sol. ex Hook.f., *Ranunculus montteanus* Phil. var. *obtusilobus* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus bonariensis Poir. var. *trisepalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig

Sinónimos: *Ranunculus trisepalus* Gillies ex Hook. & Arn., *Ranunculus obtusatus* Poepp., *Ranunculus bonariensis* Poir. var. *beta* Eichler, *Ranunculus humilis* Collie ex Hook. & Arn., *Ranunculus berteronianus* Steud., nom. nud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-900 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus caprarum Skottsbo.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 1200 m.

***Ranunculus chilensis* DC.**

Sinónimos: *Ranunculus sericans* Steud., *Ranunculus protractus* Steud., *Ranunculus elatus* Steud., *Ranunculus berterioanus* Phil., *Ranunculus chilensis* DC. var. *lasius* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var. *gayi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus valdivianus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus chilensis* DC. var. *alpha* Poepp., *Ranunculus chilensis* DC. var. *beta* Poepp.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3600 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Cáustico de vega, ranunculo.

***Ranunculus flagelliformis* Sm.**

Sinónimos: *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil., *Casalea flagelliformis* (Sm.) A. St.-Hil. var. *lutescens* A. St.-Hil., *Casalea hederacea* Mart. ex Eichler

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Ranunculus fuegianus* Speg.**

Sinónimos: *Ranunculus biternatus* Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus hydrophilus* Gaudich.**

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus maclovianus* d'Urv.**

Sinónimos: *Ranunculus colliguensis* Steud.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus minutiflorus* Bertero ex Phil.**

Sinónimos: *Ranunculus savatieri* Franch., *Ranunculus aysenensis* Gand., *Ranunculus chilensis* auct. non DC., *Casalea chilensis* A. St.-Hil., *Ranunculus saxifragaefolius* Steud., *Ranunculus miser* Phil., *Ranunculus minutiflorus* Bertero ex Phil. var. *miser* (Phil.) Reiche, *Hydrocotyle pauciflora* Phil., *Ranunculus berterioanus* Presl

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus muricatus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA, LRI, MAG, JFE.

***Ranunculus parviflorus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: NUB, BIO, ARA.

***Ranunculus peduncularis* Sm. var. *erodiifolius* (Gay) Reiche**

Sinónimos: *Ranunculus erodiifolius* Gay, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *polypetalus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Ranunculus polypetalus* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Ranunculus andinus* Phil., *Ranunculus polypetalus* Gillies ex Hook. & Arn. var. *acaulis* Gillies

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Ranunculus peduncularis* Sm. var. *peduncularis

Sinónimos: *Ranunculus alboffii* Macloskie, *Ranunculus glandulifer* Poepp., *Ranunculus patagonicus* Poepp., *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *alboffiana* Speg., *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *glandulifer* (Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *patagonicus* (Poepp.) Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *minor* Wedd. ex Franch., *Ranunculus gilliesii* Steud., *Ranunculus talquinus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *glabrata* Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *saffordi* Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *longavinus* Phil. ex Reiche, *Ranunculus peduncularis* Sm. var. *chillanensis* Phil. ex Reiche, *Ranunculus polypetalus* Steud. nom. nud., *Ranunculus pratensis* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus pseudotrullifolius* Skottsbo.**

Sinónimos: *Ranunculus dusenii* Lourteig, *Ranunculus caespitosus* Dusén, *Ranunculus trullifolius* Dusén, hom. illeg.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus repens* L. var. *flore-pleno* DC.**

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Ranunculus repens* L. var. *repens

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

***Ranunculus sceleratus* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO.

***Ranunculus sericocephalus* Hook.f.**

Sinónimos: *Ranunculus fueginos* Phil. ex Reiche, *Ranunculus sericocephalus* Hook.f. var. *major* Albov, *Ranunculus phillipianus* De Wild.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus spegazzinii* Lourteig**

Sinónimos: *Ranunculus oligocarpus* Speg., hom. illeg.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Ranunculus trichophyllus* Chaix**

Sinónimos: *Ranunculus aquatilis* auct. non L., *Ranunculus aquatilis* L. var. *caespitosa* auct. non DC., *Ranunculus aquatilis* L. var. *capillacea* auct. non DC., *Ranunculus fluitans* Lam. fma. *minor* auct. non Gelert, *Ranunculus fluitans* Lam. var. *fluviatilis* auct. non (G. Weber ex F.H. Wigg.) Gelert, *Ranunculus curvirostris* Freyn

Hierba acuática. Anual. Nativa.

Distribución: LLA, MAG.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

***Ranunculus trullifolius* Hook.f.**

Sinónimos: *Ranunculus monanthos* Phil., *Ranunculus monanthos* Phil. var. *chiloensis* Phil. ex Reiche

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

RESEDACEAE

Reseda

***Reseda decursiva* Forssk.**

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: VAL.

***Reseda lutea* L.**

Arbusto. Introducido.

Distribución: NUB, BIO.

***Reseda luteola* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: VAL, BIO.

***Reseda odorata* L.**

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA.

***Reseda phyteuma* L.**

Hierba. Anual o perenne. Introducida.

Distribución: ATA, BIO.

RHAMNACEAE

Colletia

***Colletia hystrix* Clos**

Sinónimos: *Colletia valdiviana* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *armata* (Miers) Reiche, *Colletia armata* Miers, *Colletia pungens* Miers, *Colletia spinosa* Lam. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosissima* J.F. Gmel. var. *valdiviana* (Phil.) Escal., *Colletia aciculata* Miers, *Colletia armata* Miers var. *insularis* Miers, *Colletia brevispina* Phil., *Colletia cataphracta* Miers, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *veprecula* (Miers) Suess., *Colletia hystrix* Clos var. *brevispina* (Phil.) Reiche, *Colletia spinosa* Lam., *Colletia tomentosa* Phil., *Colletia spinosa* Lam. var. *cataphracta* (Miers) Reiche, *Colletia ferox* Gillies & Hook. var. *dumosa* (Miers) Suess., *Colletia spinosa* Lam. var. *pungens* (Miers) Reiche, *Colletia veprecula* Miers, *Colletia spinosa* Lam. var. *veprecula* (Miers) Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Crucero, yaquil.

***Colletia spartioides* Bertero ex Colla**

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nombre vulgar: Yaquil.

Colletia ulicina Gillies & Hook.

Sinónimos: *Colletia valenzuela* Bertero ex Steud., nom. nud.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Crucero, junco minero, yaquil.

Discaria

Discaria articulata (Phil.) Miers

Sinónimos: *Colletia articulata* Phil., *Retamilia articulata* (Phil.) Miers

Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Crucero, yaquil.

Discaria chacaye (G. Don) Tortosa

Sinónimos: *Colletia chacaye* G. Don, *Colletia discolor* Hook., *Colletia crenata* Clos, *Colletia serratifolia* Vent. var. *foliosa* Hook. & Arn., *Notophaena magellanica* Miers, *Notophaena cognata* Miers, *Discaria cognata* (Miers) Reiche, *Colletia montana* Phil., *Colletia dumosa* Phil., *Discaria magellanica* (Miers) Reiche, *Colletia nivalis* Phil., *Discaria foliosa* (Hook. & Arn.) Reiche, *Discaria crenata* (Clos) Regel, *Colletia serratifolia* auct. non Vent., *Discaria dumosa* (Phil.) Reiche, *Discaria montana* (Phil.) Reiche, *Notophaena discolor* (Hook.) Miers, *Notophaena foliosa* (Hook. & Arn.) Miers, *Discaria discolor* (Hook.) Reiche, comb. illeg.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-2300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chacaye.

Discaria nana (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb.

Sinónimos: *Colletia nana* Clos, *Ochetophila parvifolia* Miers, *Ochetophila prostrata* Miers, nom. illeg., *Colletia stipellacea* Phil., *Discaria prostrata* (Miers) Reiche, nom. illeg., *Discaria nana* (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb. var. *inermis* Kuntze, *Discaria prostrata* (Miers) Reiche var. *inermis* Chodat & Wilczek, nom. nud., *Ochetophila nana* (Clos) J. Kellerm., *Medán* & Aagesen

Arbusto. Nativo.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-3800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Discaria trinervis (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche

Sinónimos: *Sageretia trinervis* Gillies ex Hook. & Arn., *Ochetophila hookeriana* Reissek ex Clos, nom. illeg., *Colletia doniana* Clos, *Discaria doniana* (Clos) Weberb., *Rhamnus linearis* Clos, *Ochetophila trinervis* (Gillies ex Hppk.) Poepp. ex Miers

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chacay.

Retanilla

Retanilla ephedra (Vent.) Brongn.

Sinónimos: *Retanilla ephedra* (Vent.) Brongn. var. *crassa* (Phil.) Reiche, *Colletia ephedra* Vent., *Colletia obcordata* Vent., *Retanilla obcordata* (Vent.) Brongn., *Retanilla crassa* Phil., *Retanilla moelleri* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nombre vulgar: Retamilla, coquilla, camán, yaquil.

Retanilla stricta Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trevoa frutilla* Steud., nom. nud., *Retanilla affinis* Clos

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 200-1500 m.

Nombre vulgar: Frutilla del campo.

Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.

Sinónimos: *Trevoa trinervia* Gillies & Hook., *Colletia trebu* Bertero ex Colla, *Trevoa trinervis* Miers, nom. nud.

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nombre vulgar: Trevu, trevo.

Rhamnus

Rhamnus diffusus Clos

Sinónimos: *Colletia maytenoides* Griseb., *Sciadophila maytenoides* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.

Rango altitudinal: 0-1200 m.

Nombre vulgar: Murta negra, palo negro, molfuenmamel.

Trevoa

Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.

Sinónimos: *Talguenea quinquenervia* (Gillies & Hook.) I.M. Johnst., *Talguenea costata* Miers, *Colletia tralhuen* Bertero ex Colla, *Talguenea costata* Hook. & Arn., nom. illeg., *Talguenea mollis* Miers, nom. illeg.
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-2200 m.
Nombre vulgar: Tralhuén, talguén, tuluhuén.

ROSACEAE

Acaena

Acaena alpina Poepp. ex Walp.

Sinónimos: *Acaena digitata* Phil., *Acaena digitata* Phil. var. *latifoliolata* Bitter, *Acaena digitata* Phil. var. *subpinnata* Bitter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 2200-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Acaena antarctica Hook.f.

Sinónimos: *Acaena microcephala* Schldl., *Acaena pearcei* Phil., *Acaena pumila* Phil., hom. illeg., *Acaena tenuifolia* Bitter, *Acaena pearcei* Phil. var. *glabrinervis* Bitter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 1000-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Acaena argentea Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *breviscapa* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *nigricans* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *viridis* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *coriacea* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *grandiceps* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *interrupte-pinnata* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *lanigera* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. var. *subcalvescens* Bitter, *Acaena argentea* Ruiz & Pav. fma. *epargyrea* Bitter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 700-1000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Cadillo, trun, amor seco, zarzaparrilla, proquín.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Acaena caespitosa Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Acaena integerrima Gillies ex Hook. & Arn.

Sinónimos: *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *oligantha* Bitter, *Acaena integerrima* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subpilosicupula* Bitter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Acaena leptacantha Phil.

Sinónimos: *Acaena capitata* Phil., *Acaena leptacantha* Phil. var. *conferta* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. subsp. *connectens* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *longissima* Bitter, *Acaena leptacantha* Phil. var. *negeri* (E. Duse) Bitter, *Acaena macrocephala* Poepp. var. *negeri* E. Duse
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pimpinela.

Acaena lucida (Aiton) Vahl

Sinónimos: *Ancistrum lucidum* Aiton, *Acaena parvifolia* Phil., *Acaena lucida* (Lam.) Vahl, nom. illeg., *Acaena lucida* (Lam.) Vahl var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Ancistrum lucidum* Lam., nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 700-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Acaena macrocephala Poepp.

Sinónimos: *Acaena macrocephala* Poepp. var. *caput-medusae* Bitter, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 900-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Acaena magellanica (Lam.) Vahl

Sinónimos: *Acaena canescens* Phil., *Acaena glandulifera* Bitter, *Acaena glaucella* Bitter, *Acaena krausei* Phil., *Acaena laevigata* Aiton, *Acaena macropoda* Bitter, *Ancistrum magellanicum* Lam., *Acaena adscendens* (Lam.) Vahl, *Acaena acutifida* Bitter, *Acaena brachyglochis* Bitter, *Acaena colchaguensis* Bitter, *Acaena hirsuta* Phil., *Acaena cadilla* Hook.f., *Acaena closiana* Gay, *Acaena coxi* Phil.,

Acaena petiolulata Phil., *Acaena macrostemon* Hook.f., *Acaena depauperata* Bitter, *Acaena exaltata* Bitter, *Acaena grandistipula* Bitter, *Acaena grossifolia* Bitter, *Acaena hirta* Citerne, *Acaena humilis* Bitter, *Acaena ischnostemon* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *hirsuta* (Phil.) Reiche, *Acaena krausei* Phil. var. *massonandra* Bitter, *Acaena krausei* Phil. var. *meionandra* Bitter, *Acaena laevigata* Aiton var. *venulosa* (Griseb.) Reiche, *Acaena longiaristata* H. Ross, *Acaena longistipula* Bitter, *Acaena macrophytes* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. subsp. *closiana* (Gay) Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. var. *basipilosa* Bitter, *Acaena macrostemon* Hook.f. subsp. *longiaristata* (H. Ross) Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *pygmaea* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl var. *glabrescens* Bitter, *Acaena magellanica* (Lam.) Vahl subsp. *venulosa* (Griseb.) Bitter, *Acaena neglecta* Bitter, *Acaena obtusiloba* Bitter, *Acaena oligoglochis* Bitter, *Acaena plioglochis* Bitter, *Acaena rubescens* Bitter, *Acaena subflaccida* Bitter, *Acaena venulosa* Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 100-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Amor seco, cadilla, trun, sitor.

***Acaena masafuerana* Bitter**

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 1000-1100 m.

***Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Acaena elegans* Gay, *Acaena micranthera* Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. subsp. *elegans* (Gay) Bitter, *Acaena ovalifolia* Ruiz & Pav. var. *elegans* (Gay) Reiche, *Acaena tenuipila* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 500-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Cadillo.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

***Acaena patagonica* A.E. Martic.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: RME, MAG.

Rango altitudinal: 0-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav.**

Sinónimos: *Acaena multifida* Hook.f., *Acaena multifida* Hook.f. var. *utriquepilosa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *pliacantha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz

& Pav. var. *depauperata* Bitter, *Acaena calcitraba* Phil., *Acaena euacantha* Phil., *Acaena leptophylla* Phil., *Acaena longifolia* Phil., *Acaena multifida* Hook.f. subsp. *intercedens* Bitter, *Acaena multifida* Hook.f. subsp. *quinquefida* Bitter, *Acaena oligacantha* Phil., *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *macrura* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *heterotricha* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *parvifrons* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *hypoleuca* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *liocarpa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *longifolia* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *nudiscapa* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. subsp. *oligacantha* (Phil.) Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *intermedia* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *uspallatensis* Bitter, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *calcitraba* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *euacantha* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *leptophylla* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *longifolia* (Phil.) Reiche, *Acaena pinnatifida* Ruiz & Pav. var. *oligacantha* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 1300-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Cadillo, amor seco, pimpinela, pimpinela cimarrona, cepacaballo.

***Acaena platyacantha* Speg.**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, ARA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena poeppigiana* Gay**

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 2400-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena pumila* Vahl**

Sinónimos: *Acaena pumila* Vahl var. *acrocoma* Bitter, *Acaena glaberrima* Phil., *Acaena pumila* Vahl var. *glaberrima* (Phil.) Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LRI, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-1100 m.

Países limítrofes: Argentina.

***Acaena sericea* J. Jacq.**

Sinónimos: *Acaena fuegina* Phil., *Acaena cuneata* Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Acaena splendens Hook. & Arn.

Sinónimos: *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *gracilis* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brachyphylla* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *brevisericea* Bitter, *Acaena splendens* Hook. & Arn. var. *macrophylla* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Abrojo, cadillo, choncli, amores secos, cepacaballo.

Acaena tenera Albov

Sinónimos: *Acaena antarctica* Hook.f. var. *laxiuscula* Bitter
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Acaena trifida Ruiz & Pav. var. *glabrescens* Regel & Körn.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, RME.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Acaena trifida Ruiz & Pav. var. *trifida*

Sinónimos: *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *quinquefida* (Phil.) Reiche, *Acaena quinquefida* Phil., *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *mollissima* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *nanodes* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *robusta* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *argentella* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *plurifoliolata* Bitter, *Acaena trifida* Ruiz & Pav. var. *brachyphylla* Bitter

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nombre vulgar: Pimpinela, amores secos.

Aphanes

Aphanes arvensis L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ANT, COQ, RME, LBO, ARA, LLA.

Aphanes berteriana Rothm. fma. *berteriana*

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 200-900 m.

Aphanes berteriana Rothm. fma. *vegeta* Rothm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 200-900 m.

Aphanes looseri (Rothm.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla looseri* Rothm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 500-700 m.

Aphanes neglecta (Rothm.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla neglecta* Rothm.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Cotoneaster

Cotoneaster francheti Bois.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL.

Nombre vulgar: Cotoneaster.

Duchesnea

Duchesnea indica (Andrews) Focke

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, LLA.

Fragaria

Fragaria chiloensis (L.) Mill.

Sinónimos: *Fragaria chilensis* Ehrh., *Fragaria vesca* L. var. *chiloensis* L., *Fragaria chilensis* Ehrh. var. *tincta* Ser., *Fragaria chiloensis* (L.) Mill., *Fragaria chiloensis* (L.) Duchesne, nom. illeg., *Potentilla chiloensis* (L.) Mabb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Frutilla, lahueña.

Geum

Geum andicola (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Sierversia andicola* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Geum involucreatum Pers.

Sinónimos: *Oncostylus involucreatus* (Pers.) F. Bolle, *Geum parviflorum* Comm. ex Sm.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Geum lechlerianum Schldtl.

Sinónimos: *Oncostylus lechlerianus* (Schldtl.) F. Bolle
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Geum magellanicum Comm. ex Pers.

Sinónimos: *Geum chilense* auct. non Balb. ex Ser.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Geum quellyon Sweet

Sinónimos: *Geum coccineum* Lindl., hom. illeg., *Geum grandiflorum* Steud., *Geum chilense* Balb. ex Ser., *Geum coccineum* Sibth. & Sm.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Nombre vulgar: Yerba del clavo, llallante, quillón.

Kageneckia

Kageneckia angustifolia D. Don

Árbol. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-3200 m.
Nombre vulgar: Olivillo, pulpa, frangel.

Kageneckia oblonga Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Kageneckia crataegoides* D. Don, *Kageneckia crataegifolia* Lindl., *Kageneckia ovata* Colla, *Lydaea lyday* Molina
Árbol. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 300-600 m.
Nombre vulgar: Huayu, huayu colorado, bollén.

Lachemilla

Lachemilla diplophylla (Diels) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla diplophylla* Diels
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3900-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Pasto, champa del bofedal.

Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla calchaquina* Lillo, *Alchemilla pinnata* Ruiz & Pav., *Alchemilla alata* Ruiz & Pav. ex Steud., *Aphanes alata* Steud., *Aphanes pinnata* Pers., *Zygalechemilla pinnata* (Ruiz & Pav.) Rydb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3600-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Lachemilla sandiense (Pilg.) Rothm.

Sinónimos: *Alchemilla sandiense* Pilg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4500-4700 m.

Margyacaena

Margyacaena x skottsbergii Bitter

Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-400 m.
Nota: Extinta en estado silvestre. Origen híbrido entre *Acaena argentea* y *Margyricarpus dyginus*.

Margyricarpus

Margyricarpus digynus (Bitter) Skottsbb.

Sinónimos: *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav. var. *digynus* Bitter
Subarbusto. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-500 m.
Nombre vulgar: Hierba de la perlilla, perla, romerillo, sabinilla.

Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze

Sinónimos: *Empetrum pinnatum* Lam., *Margyricarpus setosus* Ruiz & Pav., *Margyricarpus imberbis* C. Presl
Arbusto o subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Perlilla, perla, sabinilla, romerillo.

Polylepis

Polylepis rugulosa Bitter

Sinónimos: *Polylepis tenuiruga* Bitter

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP.

Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Países limítrofes: Perú.

Nombre vulgar: Keñoa, keñua.

Polylepis tarapacana Phil.

Sinónimos: *Polylepis tarapacana* Phil. var. *multisquamata*

Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *brevifilamentosa*

Bitter, *Polylepis tarapacana* Phil. var. *pycnolopha* Bitter,

Polylepis tarapacana Phil. var. *sajamensis* Bitter

Árbol. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3900-4700 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Queñoa, queñua.

Potentilla

Potentilla anserina L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

AIS, MAG.

Potentilla reptans L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME.

Prunus

Prunus cerasus L.

Árbol. Introducido.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Cerezo.

Rosa

Rosa canina L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: RME, MAU, BIO, LLA.

Rosa rubiginosa L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LLA, AIS, MAG.

Rubus

Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre

Arbusto. Introducido.

Distribución: COQ, BIO, ARA, LRI, LLA.

Nombre vulgar: Mora, murra.

Rubus geoides Sm.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Miñe miñe, frutilla.

Rubus praecox Bertol.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

LLA, JFE.

Nombre vulgar: Mora.

Rubus radicans Cav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ARA, LLA, AIS, MAG.

Rango altitudinal: 900-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Frutilla, miñemiñe.

Rubus ulmifolius Schott

Arbusto. Introducido.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, JFE.

Nombre vulgar: Mora.

Sanguisorba

Sanguisorba minor Scop.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA.

Tetraglochin

Tetraglochin acanthocarpum (Speg.) Speg.

Sinónimos: *Margyricarpus acanthocarpus* Speg.,

Tetraglochin acanthocarpus (Speg.) Speg. fma. *macropoda*

Speg., *Tetraglochin acanthocarpus* (Speg.) Speg. var.

typica Speg., nom. illeg.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze

Sinónimos: *Margyricarpus alatus* Gillies ex Hook. & Arn.,

Tetraglochin strictum Poepp., *Tetraglochin microphyllum*

Phil., *Margyricarpus strictus* (Poepp.) J. F. Macbride

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Pimpinela, horizonte, caulia, caulla.

Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm.

Sinónimos: *Tetraglochin acanthocarpus* (Speg.) Speg. fma.

leiocarpum Speg., *Margyricarpus cristatus* Britton

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Caulla, cailla, queiña, sangia, canela, añawayá.

RUBIACEAE

Coprosma

Coprosma oliveri Fosberg

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Olivo, olivillo.

Coprosma pyrifolia (Hook. & Arn.) Skottsbo.

Sinónimos: *Psychotria pyrifolia* Hook. & Arn.

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nombre vulgar: Peralillo.

Cruckshanksia

Cruckshanksia hymenodon Hook. & Arn.

Sinónimos: *Cruckshanksia bustillosii* Phil., *Cruckshanksia*

hymenodon Hook. & Arn. var. *bustillosii* (Phil.) Ricardi &

Quezada, *Rotheria lanceolata* Meyen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 1000-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Rosa del campo.

Cruckshanksia lithiophila Ricardi

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 3000-3600 m.

Cruckshanksia macrantha Phil.

Sinónimos: *Oreopolus macranthus* (Phil.) Ricardi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1000-4500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cruckshanksia montiana Clos

Sinónimos: *Cruckshanksia capitata* Phil., *Cruckshanksia*

densifolia Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Cruckshanksia palmae Clos

Sinónimos: *Oreopolus palmae* (Clos) Ricardi

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cruckshanksia pumila Clos

Sinónimos: *Cruckshanksia tripartita* Phil., *Cruckshanksia*

chrysantha Phil., *Cruckshanksia geisseana* Phil.,

Cruckshanksia darapskyana Phil.

Hierba. Anual o bienal. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 800-2300 m.

Nombre vulgar: Rosa, rosita.

Cruckshanksia verticillata Phil.

Sinónimos: *Cruckshanksia paradoxa* Phil., *Cruckshanksia*

capitata Phil. var. *paradoxa* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-1000 m.

Galium

Galium antarcticum Hook.f.

Sinónimos: *Galium debile* Banks & Sol., *Galium trifidum* auct. non L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Galium aparine L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

Galium araucanum Phil.

Sinónimos: *Galium suffruticosum* Hook. & Arn. var. *araucanum* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,

ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1900 m.

Galium corymbosum Ruiz & Pav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.
Rango altitudinal: 2000-5000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Galium cotinoides Cham. & Schldtl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Galium diffusoramosum Dempster & Ehrend.
Sinónimos: *Galium diffusum* Clos
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, MAU.
Rango altitudinal: 100-700 m.

Galium divaricatum Pourr. ex Lam.
Hierba. Anual. Introducida.
Nota: Dempster (1982) señala que Gay lo habría encontrado en algún lugar de Chile.

Galium eriocarpum Bartl. ex DC.
Sinónimos: *Galium brevifolium* Phil., *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *normale* Kuntze, *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *leiocarpum* Kuntze, *Galium philippii* Briq.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium fuegianum Hook.f.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium gilliesii Hook. & Arn. subsp. *gilliesii*
Sinónimos: *Galium lanatum* Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Galium gilliesii Hook. & Arn. subsp. *telanthos* (Phil.) Dempster
Sinónimos: *Galium telanthos* Phil., *Galium trichocarpum* DC. var. *telanthos* (Phil.) Reiche, *Galium volckmanni* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.
Sinónimos: *Relbunium hypocarpium* (L.) Hemsl., *Valantia hypocarpia* L., *Rubia relbun* Cham. & Schldtl., *Galium relbun* (Cham. & Schldtl.) Clos
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Relbún, kantoría.

Galium inconspicuum Phil.
Sinónimos: *Galium hypnoides* Clos var. *inconspicuum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium leptum Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 1800 m.

Galium magellanicum Hook.f.
Sinónimos: *Galium chonoense* Hook.f. var. *chonoense*, *Galium nigricans* Clos, *Galium forsteri* Phil., *Galium valdivianum* Phil., *Galium chonoense* Hook.f. var. *valdivianum* Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium masafueranum Skottsbo.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 1100-1400 m.

Galium murale (L.) All.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.

Galium ovalleanum Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1100-2600 m.

Galium parisiense L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: RME.

Galium philippianum Dempster

Sinónimos: *Galium dasycarpon* Kunze ex Walp.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1200-2200 m.

Galium suffruticosum Hook. & Arn.

Sinónimos: *Galium andinum* Phil., *Galium peteroanum* Phil., *Rubia margaritifera* Reiche
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Galium trichocarpum DC.

Sinónimos: *Galium eriocarpum* Bartl. ex DC. var. *trichocarpum* (DC.) Wedd. ex Hauman, *Galium chamissonis* Hook. & Arn., *Galium lasiocarpum* Phil., *Galium scandens* Phil., *Galium laxum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 400-2200 m.

Galium tricornutum Dandy

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: NUB, BIO.

Galium werdermannii Standl.

Sinónimos: *Galium hypnoides* Clos var. *hypnoides*, *Galium closianum* Briq.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1100 m.

Leptostigma

Leptostigma arnottianum Walp.

Sinónimos: *Nertera arnottiana* (Walp.) B.L. Rob., *Hedyotis repens* Clos, *Coprosma calycina* Gray, *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav. var. *repens* (Clos) Reiche, nom. illeg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nertera

Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce

Sinónimos: *Gomozia granadensis* Mutis ex L.f., *Nertera depressa* Banks & Sol. ex Gaertn., *Cunina sanfuentesii* Clos
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Rango altitudinal: 500-3500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Coralito, chaquirita del monte, rucachucao, coralillo.

Oldenlandia

Oldenlandia brachypetala (Phil.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Sinónimos: *Hedyotis brachypetala* Phil., *Hedyotis minuta* Phil. ex Benth. & Hook., nom. nud.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AIS.

Oldenlandia salzmännii (DC.) Benth. & Hook.

Sinónimos: *Anotis salzmännii* DC., *Hedyotis salzmännii* (DC.) Steud., *Oldenlandia uniflora* Ruiz & Pav., *Hedyotis uniflora* DC., *Hedyotis pilosa* Poepp., *Hedyotis chiloensis* Phil., *Hedyotis inconspicua* F. Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Oreopolus

Oreopolus glacialis (Poepp.) Ricardi

Sinónimos: *Cruckshanksia glacialis* Poepp., *Oreopolus patagonicus* Speg., *Cruckshanksia patagonica* (Speg.) Macloskie, *Oreopolus glacialis* (Poepp.) Ricardi var. *pilosus* Ricardi, *Oreopolus citrinus* Schltdl., *Oreocaryon nivalis* Kuntze ex K. Schum.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 300-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Rubia

Rubia tinctorum L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: RME.

Sherardia

Sherardia arvensis L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.

RUTACEAE

Fagara

Fagara externa Skottsbo.

Sinónimos: *Zanthoxylum externum* (Skottsbo.) Stuessy

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Naranjillo.

Fagara mayu (Bertero ex Colla) Engl.

Sinónimos: *Zanthoxylum mayu* Bertero ex Colla,
Zanthoxylon mayu Hook. & Arn., *Xanthoxylon mayu*
Bertero ex Colla

Árbol. Endémico.

Distribución: JFE.

Nombre vulgar: Mayu, naranjillo, palo amarillo.

Pitavia

Pitavia punctata (Ruiz & Pav.) Molina

Sinónimos: *Galvezia punctata* Ruiz & Pav.

Árbol. Endémico.

Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nombre vulgar: Pitao.

Ruta

Ruta chalepensis L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, JFE.

SALICACEAE

Azara

Azara alpina Poepp. & Endl.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Azara celastrina D. Don

Sinónimos: *Azara sparsiflora* Steud., nom. nud., *Azara lilen*
Bertero, nom. nud.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nombre vulgar: Lilén.

Azara dentata Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Azara tomentosa* Bertero ex Steud., *Azara*
celastrina D. Don var. *tomentosa* (Steud.) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,
ARA.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Nombre vulgar: Corcolén.

Azara integrifolia Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Azara intermedia* Gay, *Azara hirtella* Miq.,
Azara berteroniana Steud., *Azara lechleriana* Steud.,
Azara pycnophylla Phil., *Azara browneae* F. Phil., *Azara*
integrifolia Ruiz & Pav. var. *pycnophylla* (Phil.) Reiche,
Azara integrifolia Ruiz & Pav. var. *browneae* (F. Phil.)
Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI.

Rango altitudinal: 200-2000 m.

Nombre vulgar: Corcolén, aramo, chin-chin.

Azara lanceolata Hook.f.

Sinónimos: *Azara chiloensis* Hook.f., *Azara serrata* Ruiz &
Pav. var. *chiloensis* (Hook.f.) Reiche, *Azara brumalis* Gand.,
Azara lanceolata Hook.f. var. *chiloensis* (Hook.f.) Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Azara microphylla Hook.f.

Sinónimos: *Azara borealis* F. Phil., *Azara valdiviae* Lechl.
ex Steud., *Myrtophyllum chilense* Turcz.

Arbusto o árbol pequeño. Nativo.

Distribución: COQ, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Chinchín.

Azara petiolaris (D. Don) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Azara gilliesii* Hook. & Arn., *Quillaja petiolaris*
D. Don, *Azara crassifolia* Hort., *Azara gilliesii* Hook. &
Arn. var. *minor* Reiche

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.

Rango altitudinal: 600-1500 m.

Nombre vulgar: Maqui blanco, maquicillo, lilén, corcolén.

Azara serrata Ruiz & Pav. var. *fernandeziana* (Gay) Reiche

Sinónimos: *Azara fernandeziana* Gay

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 300-400 m.

Azara serrata Ruiz & Pav. var. *serrata*

Sinónimos: *Azara umbellata* Phil., *Azara dubia* Steud., *Azara bergii* Phil., *Azara subandina* Phil., *Azara serrata* Ruiz & Pav. var. *bergii* (Phil.) Reiche
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 200-2000 m.
Nombre vulgar: Corcolén, aroma de castilla.

Populus

Populus nigra L.

Árbol. Introducido.
Distribución: BIO.

Salix

Salix alba L.

Árbol. Introducido.
Distribución: BIO.

Salix babylonica L.

Árbol. Introducido.
Distribución: COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE.

Salix caprea L.

Arbusto. Introducido.
Distribución: NUB, BIO.

Salix humboldtiana Willd.

Sinónimos: *Salix chilensis* Molina, *Salix magellanica* Lam.
Árbol. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-3900 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Sauce amargo, sauce chileno.
Nota: Existen híbridos naturales de *Salix humboldtiana* y *S. babylonica*.

Salix viminalis L.

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.
Distribución: RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI, AIS, MAG.

SANTALACEAE

Antidaphne

Antidaphne punctulata (Clos) Kuijt

Sinónimos: *Eremolepis punctulata* (Clos) Griseb., *Lepidoceras punctulatum* Clos, *Eremolepis verrucosa* Griseb.

Arbusto parásito. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1500 m.

Lepidoceras

Lepidoceras chilense (Molina) Kuijt

Sinónimos: *Lepidoceras kingii* Hook.f., *Lepidoceras dombei* Hook.f., *Lepidoceras squamifer* Clos, *Myrtobium microphyllum* Miq., *Viscum chilense* Molina
Arbusto parásito. Endémico.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Nombre vulgar: Chiuchiu, quintral del temu.

Myoschilos

Myoschilos oblongum Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Miyoschilos angusta* Phil., *Myoschilos oblongum* Ruiz & Pav. var. *angusta* (Phil.) Macloskie
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Orocoi, orochoipo.

Nanodea

Nanodea muscosa Banks ex C.F. Gaertn.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Santalum

Santalum fernandezianum F. Phil.

Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Nombre vulgar: Sándalo de Juan Fernández.
Nota: Extinta.

SAPINDACEAE

Bridgesia

Bridgesia incisifolia Bertero ex Cambess.

Sinónimos: *Bridgesia incisifolia* Bertero ex Cambess. var. *parvifolia* Barnéoud
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Rumpiata, rumpaito, rumpe-ato.

Dodonaea

Dodonaea viscosa Jacq.
Arbusto. Introducido.
Distribución: COQ, IPA.

Guindilia

Guindilia trinervis Gillies ex Hook. & Arn.
Sinónimos: *Valenzuela trinervis* Bertero ex Cambess.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 200-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Guindillo.

Llagunoa

Llagunoa glandulosa (Hook. & Arn.) G. Don
Sinónimos: *Amirola glandulosa* Hook. & Arn., *Orbignya trifolia* Bertero
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Árbol de cuentas, atutemo.

Sapindus

Sapindus saponaria L.
Árbol. Introducido.
Distribución: AYP, IPA.
Nombre vulgar: Marikuru (Rapa Nui).
Nota: Los Rapanui la consideran como nativa.

SAPOTACEAE

Pouteria

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze
Sinónimos: *Achras lucuma* Ruiz & Pav., *Richardella lucuma* (Ruiz & Pav.) Aubrév.
Árbol. Nativo.
Distribución: ATA.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nota: Sólo hay un ejemplar que respalda la distribución natural en Chile (ATA). Aún es dudoso su origen.

Pouteria splendens (A. DC.) Kuntze
Sinónimos: *Lucuma valparadisea* Molina, *Lucuma splendens* A. DC., *Gayella valparadisaea* (Molina) Pierre, *Vitellaria valparadisaea* (Molina) Radlk. ex Dubard, *Gayella splendens* (A. DC.) Aubrév.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Palo colorado, lúcuma silvestre.

SAXIFRAGACEAE

Chrysosplenium

Chrysosplenium macranthum Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Chrysosplenium valdivicum Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Saxifraga

Saxifraga magellanica Poir.
Sinónimos: *Saxifraga cordillerana* C. Presl var. *magellanica* (Poir.) Dusén, *Saxifraga cordillerana* C. Presl
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Saxifraga umbrosa L.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: MAG.

Saxifragella

Saxifragella bicuspidata (Hook.f.) Engl.
Sinónimos: *Saxifraga bicuspidata* Hook.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 500-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Saxifragodes

Saxifragodes albowiana (Kurtz ex Albov) D.M. Moore
Sinónimos: *Saxifraga albowiana* Kurtz ex Albov, *Saxifragella albowiana* (Kurtz ex Albov) Engl.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

SCHOEPFIACEAE

Arjona

Arjona patagonica Hombr. & Jacq. ex Decne.
Sinónimos: *Arjona andina* Phil., *Arjona rigida* Miers,
Arjona ruscifolia Poepp., *Arjona tuberosa* Cav. var.
patagonica DC.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, LBO, NUB, ARA, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Arjona pusilla Hook.f.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Arjona tuberosa Cav.

Sinónimos: *Arjona apressa* Phil., *Arjona pungens* Phil.,

Arjona tuberosa Cav. var. *lanata* Macloskie

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS, MAG.

Países limítrofes: Argentina.

Quinchamalium

Quinchamalium chilense Molina

Sinónimos: *Quinchamalium procumbens* Ruiz & Pav.,
Quinchamalium chilense Molina var. *gracile* Hook. &
Arn., *Quinchamalium gracile* (Hook. & Arn.) Brongn.,
Quinchamalium chilense Molina var. *robustior* Hook. &
Arn., *Quinchamalium majus* Brongn., *Quinchamalium*
ericoides Brongn. ex Gay, *Quinchamalium elegans*
C. Presl, *Quinchamalium brevifolium* C. Presl,
Quinchamalium andinum Phil., *Quinchamalium platense*
Phil., *Quinchamalium excrescens* Phil., *Quinchamalium*
purpureum Phil., *Quinchamalium linarioides* Phil.,
Quinchamalium berteroanum Phil., *Quinchamalium*
bracteosum Phil., *Quinchamalium carnosum* Phil.,
Quinchamalium parviflorum Phil., *Quinchamalium*
chilense Molina var. *parviflorum* (Phil.) L.E. Navas,
Quinchamalium thesioides Phil., *Quinchamalium thesioides*
Phil. var. *flaccidum* Phil., *Quinchamalium minutum* Phil.,
Quinchamalium rugosum Phil., *Quinchamalium litorale*
Phil., *Quinchamalium tarapacanicum* Phil., *Quinchamalium*
araucanicum F. Meigen

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,
LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Quinchamalí.

SCROPHULARIACEAE

Alonsoa

Alonsoa honoraria Grau

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 300-400 m.

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze

Sinónimos: *Scrophularia meridionalis* L.f., *Alonsoa*
urticifolia Steud., *Alonsoa incisifolia* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Flor del soldado, ajcillo.

Buddleja

Buddleja araucana Phil.

Sinónimos: *Buddleja globosa* Hope var. *araucana* (Phil.)

Reiche

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, BIO.

Rango altitudinal: 300-1600 m.

Países limítrofes: Argentina.

Buddleja globosa Hope

Sinónimos: *Buddleja capitata* Jacq., *Buddleja connata* Ruiz
& Pav.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,
BIO, ARA, LRI, LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Matico, pañil, palquil, palguín.

Buddleja suaveolens Kunth & Bouché

Sinónimos: *Buddleja gayana* Benth.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 500-2900 m.

Nombre vulgar: Acerillo.

Myoporum

Myoporum laetum G. Forst.

Arbusto o árbol pequeño. Introducido.

Distribución: COQ, VAL, MAU.

Scrophularia

Scrophularia auriculata L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: RME, MAU, ARA.

Verbascum

Verbascum densiflorum Bertol.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: ARA.

Verbascum thapsus L.

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

Verbascum virgatum Stokes

Hierba. Bienal. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.

SIMAROUBACEAE

Ailanthus

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Árbol. Introducido.

Distribución: RME, BIO, JFE.

SOLANACEAE

Benthamiella

Benthamiella azurella (Skotts.) A. Soriano

Sinónimos: *Saccardophyton azurella* Skotts.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Benthamiella lanata A. Soriano

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Benthamiella nordenskioldii Dusén ex N.E. Br.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-1000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Benthamiella patagonica Speg.

Sinónimos: *Benthamiella aurea* Skotts., *Benthamiella intermedia* Skotts., *Benthamiella abietina* Skotts.

Subarbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 500-1500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Calibrachoa

Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy

Sinónimos: *Nicotiana parviflora* (Juss.) Lehm., *Petunia parviflora* Juss.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: VAL.

Rango altitudinal: 0-300 m.

Países limítrofes: Argentina.

Cestrum

Cestrum parqui L'Hér.

Sinónimos: *Cestrum campestre* Griseb., *Cestrum parqui* L'Hér. var. *glabriusculum* Kuntze, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *longiflorum* Francey, *Cestrum parqui* L'Hér. var. *poepigii* Dunal, *Cestrum virgatum* Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Palqui, parqui, hediondilla.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Combera

Combera minima (Phil.) Sandwith

Sinónimos: *Nicotiana minima* Phil., *Petunia minima* (Phil.) Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 1800 m.

Combera paradoxa Sandwith

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: NUB, AIS.

Rango altitudinal: 1800-3200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Datura

Datura ferox L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA.

Datura inoxia Mill.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: ANT, ATA.

Datura stramonium L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE.

Dunalia

Dunalia spinosa (Meyen) Dammer
Sinónimos: *Dunalia lycioides* Miers, *Atropa spinosa* Meyen, *Dierbachia lycioides* (Miers) Kuntze
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Chañar silvestre, chilka.

Exodeconus

Exodeconus flavus (I.M. Johnst.) Axelius & D'Arcy
Sinónimos: *Cacabus flavus* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Perú.

Exodeconus integrifolius (Phil.) Axelius
Sinónimos: *Cacabus integrifolius* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2300-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Oreja de ratón.

Exodeconus pusillus (Bitter) Axelius
Sinónimos: *Cacabus pusillus* Bitter
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2500-3000 m.
Países limítrofes: Perú.

Fabiana

Fabiana bryoides Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2900-4900 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Pata de perdiz, pata de pizaca.

Fabiana densa J. Remy
Sinónimos: *Fabiana clarenii* Dammer
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 2700-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Khachukipa.

Fabiana denudata Miers
Sinónimos: *Fabiana hieronymi* Niederl.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 300-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tolilla, alma tola.

Fabiana imbricata Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Fabiana araucana* Phil., *Fabiana biflora* J. Remy, *Fabiana imbricata* Ruiz & Pav. var. *biflora* (J. Remy) Reiche, *Fabiana lutescens* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 2600-3200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pichi, peta, romero.

Fabiana ramulosa (Wedd.) Hunz. & Barboza
Sinónimos: *Fabiana densa* J. Remy var. *ramulosa* Wedd., *Fabiana deserticola* Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4000 m.
Nombre vulgar: Kipa, tara macho.

Fabiana squamata Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3000-4400 m.
Países limítrofes: Bolivia.
Nombre vulgar: Koba.

Fabiana stephanii Hunz. & Barboza
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3000-3900 m.
Países limítrofes: Perú.

Fabiana viscosa Hook. & Arn.
Sinónimos: *Fabiana coridifolia* Dunal, *Fabiana ericoides* Dunal, *Fabiana barriosis* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-2200 m.
Nombre vulgar: Pichinilla, copatola, husillo, pichanilla.

Jaborosa

Jaborosa caulescens Gillies & Hook. var. ***bipinnatifida*** (Dunal) Reiche

Sinónimos: *Lonchestigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal var. *bipinnatifidum* Dunal, *Jaborosa bipinnatifida* (Dunal) Meigen, *Lonchestigma bipinnatifidum* (Dunal) Phil., *Trechonaetes bipinnatifida* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 3000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa caulescens Gillies & Hook. var. ***caulescens***
Sinónimos: *Dorystigma caulescens* (Gillies & Hook.) Miers, *Lonchestigma caulescens* (Gillies & Hook.) Dunal
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Teqerere.

Jaborosa laciniata (Miers) Hunz. & Barboza
Sinónimos: *Trechonaetes laciniata* Miers, *Trechonaetes bridgesii* Dunal
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa magellanica (Griseb.) Dusén
Sinónimos: *Himeranthus magellanicus* Griseb., *Jaborosa magellanica* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa parviflora (Phil.) Hunz. & Barboza
Sinónimos: *Trechonaetes parviflora* Phil., *Lonchestigma parviflorum* (Phil.) Cabrera, *Jaborosa crispa* auct. non Benth. & Hook., *Trechonaetes machucana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3700-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Psike.

Jaborosa pinnata Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.

Jaborosa reflexa Phil.
Sinónimos: *Jaborosa araucana* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 200-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa riojana Hunz. & Barboza
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3000-4300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Jaborosa squarrosa (Miers) Hunz. & Barboza
Sinónimos: *Dorystigma squarrosus* Miers, *Lonchestigma squarrosus* (Miers) Dunal
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ATA.
Rango altitudinal: 3000-4700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Jaborosa volkmannii (Phil.) Reiche
Sinónimos: *Dolichosiphon volkmanni* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Latua

Latua pubiflora (Griseb.) Baill.
Sinónimos: *Lycioplesium pubiflorum* Griseb., *Latua venenosa* Phil.
Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 300-900 m.
Nombre vulgar: Latúe, palo de los brujos, latué, palo mato.

Lycium

Lycium boerhaviaefolium L.f.
Sinónimos: *Grabowskia boerhaviifolia* (L.f.) Schldl., *Grabowskia glauca* (Phil.) I.M. Johnst., *Lycium glaucum* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 300-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Lycium bridgesii (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello
Sinónimos: *Phrodus bridgesii* Miers, *Phrodus microphyllus* (Miers) Miers, *Phrodus pendulus* (Phil.) Phil., *Alona microphylla* Miers, *Phrodus nodosus* Miers, *Phrodus*

breviflorus Phil., *Phrodus thymifolius* (Phil.) Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 500-2900 m.

Lycium carolinianum Walter var. *sandwicense* (A. Gray)
C.L. Hitchc.
Arbusto. Nativo.
Distribución: IPA.
Nombre vulgar: Pua nako nako (Rapa Nui).

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *chilense*
Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *petiolatum* Phil., *Lycium scoparium* Miers, *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *normale* Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *tomentosulum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *chilense* (Bertero) Kuntze, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *ovatum* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Coralillo.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *confertifolium* (Miers) F.A. Barkley
Sinónimos: *Lycium scoparium* Miers var. *confertifolium* Miers
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *filifolium* (Gillies ex Miers) Bernardello
Sinónimos: *Lycium filifolium* Gillies ex Miers, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *capillare* (Miers) A. Terracc.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *glaberrimum* Phil.
Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *gracile* (Meyen) Reiche, *Lycium sessiliflorum* Phil., *Lycium rhadinum* Phil., *Lycium gracile* Meyen, *Lycium venosum* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero fma. *glaberrimum* (Phil.) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *gracile* (Meyen) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *glabriusculum* Phil., *Lycium salsum* Ruiz & Pav. var. *gracile* (Meyen) Kuntze, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *venosum* (Phil.) Reiche, *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rhadinum* (Phil.) Reiche
Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *minutifolium* (Miers) F.A. Barkley
Sinónimos: *Lycium filifolium* Gillies ex Miers var. *minutifolium* Miers, *Lycium minutifolium* Phil., *Lycium chilense* Miers ex Bertero fma. *minutifolium* (Miers) A. Terracc.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lycium chilense Miers ex Bertero var. *vergarae* (Phil.) Bernardello
Sinónimos: *Lycium vergarae* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Lycium deserti Phil.
Sinónimos: *Lycium breanum* Phil., *Lycium pachyclados* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 500-3200 m.

Lycium distichum Meyen
Sinónimos: *Grabowskia disticha* (Meyen) Nees ex Dunal
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 2000 m.
Países limítrofes: Perú.

Lycium humile Phil.
Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA, RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Jume, june, wicha.

Lycium leiostemum Wedd.
Sinónimos: *Lycium biesei* F.A. Barkley
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1000 m.
Países limítrofes: Perú.

Lycium minutifolium J. Remy

Sinónimos: *Lycium implexum* Miers, *Lycium horridum* Phil., *Lycium rhudolphi* Speg., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *deserticum* A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *implexum* (Miers) A. Terracc.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Nombre vulgar: Calpiche, coralillo.

Lycium rachidocladum Dunal

Sinónimos: *Lycium chilense* Miers ex Bertero var. *rachidocladum* (Dunal) A. Terracc., *Lycium chilense* Miers ex Bertero subsp. *rachidocladum* (Dunal) Reiche

Arbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Lycium stenophyllum J. Remy

Sinónimos: *Lycium fragosum* Miers

Arbusto. Nativo.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Perú.

Lycium tenuispinosum Miers var. *calycinum* (Griseb.) Bernardello

Sinónimos: *Lycium scoparium* Miers var. *calycinum* Griseb., *Lycium ovalilobum* C.L. Hitchc.

Arbusto. Nativo.

Distribución: LLA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nicandra

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

Sinónimos: *Atropa physalodes* L.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nicotiana

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. *acuminata*

Sinónimos: *Petunia acuminata* Graham, *Nicotiana longiflora* Cav. var. *oligantha* (Phil.) Millán, *Nicotiana uspallatensis* Phil., *Nicotiana oligantha* Phil., *Nicotiana copiapina* Phil., *Nicotiana modesta* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.

Rango altitudinal: 100-3400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Tabaco del campo, tabaco cimarrón.

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. *compacta* Goodsp.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 2700-3500 m.

Nicotiana acuminata (Graham) Hook. var. *multiflora* (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Nicotiana angustifolia* Ruiz & Pav., *Nicotiana heterophylla* Phil., *Nicotiana multiflora* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 100-3100 m.

Nicotiana cordifolia Phil. subsp. *cordifolia*

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nicotiana cordifolia Phil. subsp. *sanctaclarae* Danton

Arbusto. Endémico.

Distribución: JFE.

Nicotiana corymbosa J. Remy

Sinónimos: *Nicotiana monticola* Dunal, *Nicotiana scapigera* Phil., *Nicotiana oulophylla* Dunal

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG.

Rango altitudinal: 700-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nicotiana glauca Graham

Arbusto o subarbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.

Rango altitudinal: 0-3000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Palqui inglés, palqui extranjero, belén-belén.

Nicotiana linearis Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: COQ, MAU.

Rango altitudinal: 200-2100 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nicotiana longibracteata Phil.

Sinónimos: *Nicotiana frigida* Phil.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA.

Rango altitudinal: 3400-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Palpapalpa.

Nicotiana miersii J. Remy var. ***lychnoides*** (J. Remy) Goodsp.
Sinónimos: *Nicotiana floribunda* (Phil.) Reiche, *Nicotiana lychnoides* J. Remy, *Waddingtonia floribunda* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nicotiana miersii J. Remy var. ***miersii***
Sinónimos: *Nicotiana collae* Phil., *Nicotiana coquimbana* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nicotiana paa Mart. Crov.
Sinónimos: *Nicotiana noctiflora* Hook. var. *albiflora* Comes, *Nicotiana cavanillesii* Dunal var. *albiflora* (Comes) Millán
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 100-1600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicotiana pauciflora J. Remy
Sinónimos: *Nicotiana longiflora* Cav. var. *pauciflora* (J. Remy) Comes, *Nicotiana caudigera* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 500-2500 m.

Nicotiana petunioides (Griseb.) Millán
Sinónimos: *Fabiana petunioides* Griseb., *Nicotiana pampasana* Kuntze, *Nicotiana philippii* Millán
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3700-4600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Nicotiana solanifolia Walp.
Sinónimos: *Nicotiana breviloba* Phil., *Nicotiana cardiophylla* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nicotiana tabacum L.
Hierba. Anual o perenne. Introducida.
Distribución: JFE, IPA.
Nombre vulgar: Tabaco, aba aba (Rapa Nui).

Nicotiana undulata Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Nicotiana chilensis* Millán nom. illeg., *Nicotiana brachysolen* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2700-4200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Lipelipe.

Nierembergia

Nierembergia repens Ruiz & Pav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nota: Presente también en Ecuador.

Nolana

Nolana acuminata (Miers) Miers ex Dunal
Sinónimos: *Sorema lanceolata* Miers, *Sorema acuminata* Miers, *Sorema longifolia* auct. non (Lindl.) Miers, *Nolana lanceolata* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana angustifolia* Phil., *Nolana navarri* Phil., *Nolana rupestris* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-900 m.

Nolana adansonii (Roem. & Schult.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Tula adansonii* Roem. & Schult.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana albescens (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Dolia albescens* Phil. ex Wettst., *Bargemontia albescens* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia albescens* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nolana aplocaryoides (Gaudich.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. var. *aplocaryoides* (Gaudich.) Mesa, *Leloutrea aplocaryoides* Gaudich., *Bargemontia aplocaryoides* (Gaudich.) I.M. Johnst., *Alona pusilla* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana arenicola I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 200-700 m.

Países limítrofes: Perú.

Nolana baccata (Lindl.) Dunal

Sinónimos: *Alona baccata* Lindl., *Sorema linearis* Miers, *Gubleria baccata* Gaudich., *Nolana linearis* (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana stans* Phil., *Nolana carrera* Phil., *Nolana leucantha* Phil., *Nolana carrera* Phil. var. *leucantha* (Phil.) Reiche, *Periloba stans* (Phil.) I.M. Johnst., *Nolana alba* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana balsamiflua (Gaudich.) Mesa

Sinónimos: *Alona balsamiflua* Gaudich.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 500 m.

Nolana carnosa (Lindl.) Miers ex Dunal

Sinónimos: *Alona carnosa* Lindl., *Nolana rostrata* (Lindl.)

Miers ex Dunal var. *carnosa* (Lindl.) Mesa, *Alona vernicosa* Phil., *Alona sedifolia* Phil., *Osteocarpus lepidophyllus* Phil., *Alona lepidophylla* (Phil.) Reiche

Subarbusto. Endémico.

Distribución: TAR, ATA.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Nolana clivicola (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia clivicola* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana coelestis (Lindl.) Miers ex Dunal

Sinónimos: *Alona coelestis* Lindl., *Alona ericifolia* Miers, *Nolana ericifolia* (Miers) Miers ex Dunal, *Alona floribunda* Phil., *Alona coelestis* Lindl. var. *ericifolia* (Miers) F.H. Brandt

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 100-800 m.

Nolana crassulifolia Poepp.

Sinónimos: *Alona tomentosa* Lindl., *Alibrexia rupicola* Miers, *Nolana grossulifolia* Kunze ex Gay, *Dolia clavata* auct. non Miers, *Alona micrantha* Phil., *Dolia tomentosa* (Lindl.) Benth., *Dolia rupicola* (Miers) Benth. & Hook. ex Wettst., *Dolia canescens* Phil., *Dolia eremobia* Phil., *Dolia*

grandiflora Phil., *Dolia crassifolia* Kuntze, *Bargemontia crassulifolia* (Poepp.) I.M. Johnst., *Bargemontia micrantha* (Phil.) I.M. Johnst., *Bargemontia eremobia* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia philippi* (Braun) F.H. Brandt, *Dolia atacamensis* F.H. Brandt, *Alibrexia philippii* A. Braun

Arbusto o subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Nolana deflexa (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia deflexa* I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA.

Nolana diana M.O. Dillon

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 300-600 m.

Nolana diffusa I.M. Johnst.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Nolana divaricata (Lindl.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. subsp. *divaricata* (Lindl.) Mesa, *Aplocarya divaricata* Lindl., *Dolia clavata* Miers, *Alona xerophila* Phil., *Dolia divaricata* (Lindl.) Hook. & Arn. ex W. Brandt, *Alona rigida* Phil., *Dolia puberula* Phil., *Dolia hirsutula* Phil., *Dolia clavata* Miers var. *puberula* (Phil.) Reiche, *Bargemontia divaricata* (Lindl.) I.M. Johnst., *Bargemontia clavata* (Miers) I.M. Johnst., *Osteocarpus clavatus* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-4100 m.

Nolana elegans (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Sorema elegans* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ANT, ATA, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Nolana filifolia (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Alona filifolia* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst., *Convolvulus filifolius* Hook. & Arn., *Nolana chastenayana* Gaudich., *Alona glandulosa* Lindl., *Ipomoea cruckshanskii* Choisy, *Fabiana grandiflora* Dunal, *Nolana glandulosa* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Osteocarpus foliolosus* Phil., *Alona chastenayana* (Gaudich.) Gaudich. ex Wettst.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1300 m.

Nolana foliosa (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Dolia foliosa* Phil., *Bargemontia foliosa* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR.

Nolana glauca (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia glauca* I.M. Johnst., *Nolana peruviana* (Gaudich.) I.M. Johnst. var. *glauca* (I.M. Johnst.) Mesa
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nolana gracillima (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. subsp. *confinis* (I.M. Johnst.) Mesa, *Bargemontia gracillima* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-2400 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana incana (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Alibrexia incana* Phil., *Dolia incana* (Phil.) Wettst., *Dolia incana* (Phil.) Benth. & Hook. ex F.H. Brandt
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana inconspicua (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia inconspicua* I.M. Johnst.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nolana intonsa I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 200-800 m.

Nolana jaffuelii I.M. Johnst.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana lachimbensis M.O. Dillon & Luebert

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 500 m.

Nolana leptophylla (Miers) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Dolia leptophylla* Miers, *Velpeaulia alibrexioides* Gaudich., *Alona deserticola* Phil., *Alona*

dubia Phil., *Bargemontia leptophylla* (Miers) I.M. Johnst., *Bargemontia deserticola* (Phil.) I.M. Johnst., *Dolia deserticola* (Phil.) W. Brandt
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-4200 m.

Nolana linearifolia Phil.

Sinónimos: *Nolana decemloba* Herzog, *Bargemontia linearifolia* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nolana lycioides I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana sedifolia* Poepp. subsp. *confinis* (I.M. Johnst.) Mesa
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 200-2100 m.
Países limítrofes: Perú.

Nolana mollis (Phil.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Nolana leptophylla* (Miers) I.M. Johnst. subsp. *mollis* (Phil.) Mesa, *Alona mollis* Phil., *Dolia macrocalyx* Phil., *Bargemontia mollis* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Nolana onoana M.O. Dillon & M. Nakaz.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 100-600 m.

Nolana paradoxa Lindl.

Sinónimos: *Nolana paradoxa* Lindl. subsp. *atriplicifolia* (D. Don) Mesa, *Periloba paradoxa* (Lindl.) Raf., *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl., *Sorema litoralis* Miers, *Nolana litoralis* (Miers) Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *glaberrima* Dunal, *Nolana atriplicifolia* D. Don var. *cuneifolia* Dunal, *Nolana paradoxa* Lindl. var. *violacea* Van Houtte, *Sorema petiolata* Phil., *Nolana ochrocarpa* Phil. ex Wettst., *Nolana geminiflora* Phil., *Nolana petiolata* (Phil.) Reiche, *Nolana atriplicifolia* D. Don, *Nolana grandiflora* Lehm. ex G. Don, *Sorema atriplicifolia* (D. Don) Lindl., *Sorema paradoxa* (Lindl.) Lindl. var. *atriplicifolia* (D. Don) Miers, *Nolana napiformis* Phil., *Nolana grandiflora* Herzog
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Nombre vulgar: Suspiro del campo.

Nolana parviflora (Phil.) Phil.

Sinónimos: *Sorema parviflora* Phil., *Periloba parviflora* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana patula (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon

Sinónimos: *Alona patula* Phil., *Nolana patula* (Phil.) Mesa, comb. illeg.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA.

Nolana peruviana (Gaudich.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Bargemontia peruviana* Gaudich., *Dolia macrocalyx* Phil. ex Herzog
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Suspiro.

Nolana philippiana M.O. Dillon & Luebert

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 700-1600 m.

Nolana pterocarpa Phil. ex Wettst.

Sinónimos: *Nolana pterosperma* Phil., *Nolana debilis* Phil., *Nolana pulchella* Phil. ex Reiche, *Periloba pterosperma* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana ramosissima I.M. Johnst.

Sinónimos: *Dolia salsoloides* auct. non Lindl.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Nolana reichei M.O. Dillon & Arancio

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-100 m.

Nolana rhombifolia Martic. & Quezada

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 1800-1900 m.

Nolana rostrata (Lindl.) Miers ex Dunal

Sinónimos: *Alona rostrata* Lindl., *Alona obtusa* Lindl., *Nolana obtusa* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Alona miersii* Phil., *Alona phyllicifolia* Phil., *Alona fonckii* Phil., *Rayera*

teretifolia Gaudich., *Osteocarpus brevifolius* Phil., *Nolana lepidophylla* (Phil.) I.M. Johnst., *Osteocarpus rostratus* (Lindl.) Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 500-4100 m.

Nolana rupicola Gaudich.

Sinónimos: *Alona longifolia* Lindl., *Sorema longifolia* (Lindl.) Miers, *Nolana longifolia* (Lindl.) Miers ex Dunal, *Nolana triquetra* Koch & Bouché, *Sorema glutinosa* Phil., *Sorema bracteosa* Phil., *Nolana lanceolata* auct. non (Miers) Miers ex Dunal, *Nolana glutinosa* (Phil.) Reiche, *Nolana bracteosa* (Phil.) Reiche, *Periloba longifolia* (Lindl.) I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-900 m.
Nombre vulgar: Suspiro.

Nolana salsoloides (Lindl.) I.M. Johnst.

Sinónimos: *Dolia salsoloides* Lindl., *Osteocarpus spathulatus* Phil., *Dolia micrantha* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-900 m.

Nolana sedifolia Poepp.

Sinónimos: *Fabiana lanuginosa* Hook. & Arn., *Salsola glomerulata* Meyen, *Dolia vermiculata* Lindl., *Alibrexia brevifolia* Phil., *Dolia brevifolia* (Phil.) Phil. ex Wettst., *Bargemontia sedifolia* (Poepp.) I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Nolana sessiliflora Phil.

Sinónimos: *Nolana sessilifolia* Phil. ex I.M. Johnst., *Periloba sessiliflora* (Phil.) I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2000-2100 m.

Nolana sphaerophylla (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon

Sinónimos: *Nolana flaccida* (Phil.) I.M. Johnst., *Alona sphaerophylla* Phil., *Bargemontia sphaerophylla* (Phil.) I.M. Johnst., *Alona flaccida* Phil., *Bargemontia flaccida* (Phil.) I.M. Johnst.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-800 m.

Nolana stenophylla I.M. Johnst.
Sinónimos: *Alona stenophylla* (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Nolana tarapacana (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Dolia tarapacana* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Nombre vulgar: Deditos.

Nolana tocopillensis (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Bargemontia tocopillensis* I.M. Johnst.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Nolana villosa (Phil.) I.M. Johnst.
Sinónimos: *Alibrexia villosa* Phil., *Dolia villosa* (Phil.)
Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-1700 m.

Nolana werdermannii I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 800 m.

Physalis

Physalis peruviana L.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, COQ, VAL, RME, LBO, JFE.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Capulí, amor en bolsa, bolsa de amor.
Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Physalis viscosa L.
Sinónimos: *Physalis mendocina* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA,
IPA.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nota: Introducida en la Isla de Pascua. Probablemente
introducida en regiones del centro y sur.

Reyesia

Reyesia cactorum (I.M. Johnst.) D'Arcy
Sinónimos: *Salpiglossis cactorum* I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 2900-3500 m.

Reyesia chilensis Gay
Sinónimos: *Pteroglossis laxa* Miers, *Salpiglossis chilensis*
(Gay) Wettst., *Salpiglossis brachysiphon* I.M. Johnst.,
Reyesia laxa (Miers) D'Arcy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Reyesia juniperoides (Werderm.) D'Arcy
Sinónimos: *Salpiglossis juniperoides* Werderm.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2500 m.
Nombre vulgar: Canchanlahua.

Reyesia parviflora (Phil.) Hunz.
Sinónimos: *Salpiglossis parviflora* Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Rango altitudinal: 2900-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Salpichroa

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, BIO.
Rango altitudinal: 900-1000 m.

Salpichroa scandens Dammer
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2000-3600 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Salpichroa tristis Miers var. *lehmanni* (Dammer) Keel
Arbusto o árbol pequeño. Nativo.
Distribución: TAR.
Rango altitudinal: 3500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Salpiglossis

Salpiglossis sinuata Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Salpiglossis purpurea* Miers, *Salpiglossis fulva*
Courtois, *Salpiglossis picta* Sweet, *Salpiglossis purpurea*
Miers var. *atropurpurea* (Graham) Miers, *Salpiglossis*
straminea Hook., *Salpiglossis straminea* Hook. var. *picta*
(Sweet) Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 500-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Panza de burro.

Salpiglossis spinescens Clos
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 700-2800 m.
Nombre vulgar: Panza de burro.

Schizanthus

Schizanthus alpestris Poepp.
Sinónimos: *Schizanthus angustifolius* Phil., *Schizanthus glanduliferus* Phil., *Schizanthus alpestris* Poepp. var. *glandulifera* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 900-2900 m.

Schizanthus candidus Lindl.
Sinónimos: *Schizanthus albiflorus* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Nombre vulgar: Mariposa blanca, cacaatúa.

Schizanthus coccineus (Phil.) J.M. Watson
Sinónimos: *Schizanthus grahamii* Gill. var. *coccinea* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2600-2800 m.
Nombre vulgar: Mariposita roja.

Schizanthus grahamii Gillies ex Hook.
Sinónimos: *Schizanthus retusus* Hook., *Schizanthus incanus* Hort. ex C. Morr., *Schizanthus gilliesii* Phil., *Schizanthus araucanus* Phil., *Schizanthus diazii* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 1200-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Schizanthus hookeri Gillies ex Graham
Sinónimos: *Schizanthus calycosus* Phil.
Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1300-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Schizanthus integrifolius Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 700-1500 m.
Nombre vulgar: Palito.

Schizanthus lacteus Phil.
Sinónimos: *Schizanthus sanromanii* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Schizanthus laetus Phil.
Sinónimos: *Schizanthus fallax* I.M. Johnst.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Schizanthus litoralis Phil.
Sinónimos: *Schizanthus splendens* Sudzuki
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 100-800 m.

Schizanthus parvulus Sudzuki
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 300-600 m.

Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Schizanthus gayanus* Phil., *Schizanthus gracilis* Clos, *Schizanthus humilis* Phil., *Schizanthus lacinosus* Phil., *Schizanthus latifolius* Phil., *Schizanthus lilacinus* Kunze, *Schizanthus heterophyllus* Phil., *Schizanthus tenuifolius* Phil., *Schizanthus tenuis* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 100-1500 m.
Nombre vulgar: Pajarito.

Schizanthus porrigens Graham
Sinónimos: *Schizanthus floribundus* Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Schizanthus tricolor Grau & Gronbach
Sinónimos: *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav. var. *humilis* Lindl.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Solanum

Solanum alphonsei Dunal

Sinónimos: *Solanum alphonsei* Dunal var. *taguatagua* Dunal, *Solanum germainii* Phil., *Solanum tenuicaule* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-3000 m.

Solanum americanum Mill.

Sinónimos: *Solanum nigrum* L. var. *americanum* (Mill.) O.E. Schulz
Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Hierba mora.

Solanum argenteum Dunal

Arbusto. Introducido.
Distribución: JFE.

Solanum brachyantherum Phil.

Sinónimos: *Solanum geissei* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, IDE.
Rango altitudinal: 100-700 m.

Solanum bridgesii Phil. var. *bridgesii*

Subarbusto. Endémico.
Distribución: RME, LBO, ARA.

Solanum bridgesii Phil. var. *ocellatum* (Phil.) Witasek ex

Reiche
Sinónimos: *Solanum ocellatum* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: RME.

Solanum chilense (Dunal) Reiche

Sinónimos: *Lycopersicon chilense* Dunal, *Lycopersicon atacamense* Phil., *Lycopersicon bipinnatifidum* Phil., *Lycopersicon puberulum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Tomatillo, tomate silvestre.

Solanum coxii Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: LLA.

Solanum crispum Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Solanum ligustrinum* Lodd., *Solanum congestiflorum* Dunal, *Solanum gayanum* (J. Remy) F. Phil.,

Solanum pannosum Phil., *Solanum pyrrocarpum* Phil., *Witheringia crispa* (Ruiz & Pav.) J. Remy, *Witheringia tomatillo* J. Remy, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *ligustrinum* (Lodd.) Dunal, *Solanum tomatillo* (J. Remy) F. Phil., *Solanum concavum* Lindl., *Solanum syringaeifolium* Kunth & Bouché, *Witheringia berteriana* J. Remy, *Witheringia gayana* J. Remy, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *longifolium* Dunal, *Solanum crispum* Ruiz & Pav. var. *elaeagnifolium* Dunal, *Solanum sadae* Phil., *Solanum landbeckii* Phil., *Solanum angustifolium* Lam. var. *brevifolium* Dunal, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *pannosum* (Phil.) Reiche, *Solanum congestiflorum* Dunal var. *syringaeifolium* (Kunth & Bouché) Reiche, *Solanum izquierdii* Phil., *Solanum pugae* Phil., *Solanum tagua* Kuntze

Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba del chabalongo, huevil, natri.

Solanum echegarayi Hieron.

Sinónimos: *Solanum juncalense* Reiche, *Solanum juncalense* Reiche subsp. *aconcaguae* Bitter
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Solanum elaeagnifolium Cav.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 200-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tomatillo.

Solanum etuberosum Lindl.

Sinónimos: *Solanum bustillosii* Phil., *Solanum subandinum* F. Meigen, *Solanum looseri* Juz., *Solanum tuberosum* L. var. *polemoniiifolium* Hook.f., *Solanum kunzei* Phil., *Solanum etuberosum* Lindl. var. *antucense* Bitter, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *bustillosii* (Phil.) Witasek, *Solanum etuberosum* Lindl. var. *chillanense* Bitter
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 400-3000 m.

Solanum fernandezianum Phil.

Sinónimos: *Solanum brevistylum* Wittm., nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *fernandezianum* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-1700 m.

Solanum forsteri Seem.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.

Distribución: IPA.

Nombre vulgar: Poporo (Rapa Nui).

Solanum fragile Wedd.

Sinónimos: *Solanum grandidentatum* Phil., *Solanum tarapacanam* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 3500-4000 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Ñuñumaya.

Solanum furcatum Dunal

Sinónimos: *Solanum tredecimgranum* Bitter, *Solanum andinum* Reiche, *Solanum crenato-dentatum* Dunal, *Solanum furcatum* Dunal var. *acutedentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *obtusdentatum* Nees, *Solanum furcatum* Dunal var. *subintegerrimum* Nees, *Solanum rancaguense* Dunal, *Solanum robinsonianum* Bitter, *Witheringia furcata* (Dunal) J. Rémy

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, JFE.

Rango altitudinal: 200-1900 m.

Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Hierba mora.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández.

Solanum gaudichaudii Dunal

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-600 m.

Solanum herba-bona Reiche

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA.

Nombre vulgar: Hierba mora.

Solanum heterantherum Witasek ex Reiche

Sinónimos: *Solanum tomentosum* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia tomentosa* J. Remy

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 0-100 m.

Solanum infundibuliforme Phil.

Sinónimos: *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *angustepinnatum* Bitter, *Solanum infundibuliforme* Phil. var. *albiflorum* Ochoa

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: TAR.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Nombre vulgar: Aparuma.

Solanum lycopersicoides Dunal

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 1500-3600 m.

Países limítrofes: Perú.

Solanum maglia Schltld.

Sinónimos: *Solanum collinum* Dunal, *Solanum maglia* Schltld. var. *collinum* (Dunal) Bitter, *Solanum maglia* Schltld. var. *witasekianum* Bitter, *Solanum maglia* Molina, nom. nud., *Solanum tuberosum* L. var. *maglia* (Schltld.) A. DC., *Solanum maglia* Schltld. var. *brevifrons* Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Papa cimarrona, papa de zorro.

Solanum marginatum L.f.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, MAU, BIO, JFE.

Rango altitudinal: 5-450 m.

Solanum medians Bitter

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 3100-3600 m.

Países limítrofes: Perú.

Solanum montanum L.

Sinónimos: *Solanum phyllanthum* Cav. var. *crassipes* (Phil.) Witasek ex Reiche, *Solanum crassipes* Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Países limítrofes: Perú.

Solanum nigrum L.

Hierba. Anual. Introducida.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.

Solanum nitidibaccatum Bitter

Sinónimos: *Solanum physalifolium* Rusby var. *nitidibaccatum* (Bitter) Edmonds

Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 0-2500 m.

Países limítrofes: Argentina.

Solanum nitidum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3000-3500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Ñuñumaya.

Solanum palustre Schltld.

Sinónimos: *Solanum brevidens* Phil., *Solanum palustre* Schltld. var. *glabrescens* Walp., *Solanum brevidens* Phil. var. *glabrescens* (Dunal) Hawkes, *Solanum tuberosum* L. var. *brevidens* (Phil.) Reiche, *Solanum tuberosum* L. var. *pearcei* (Phil.) Reiche
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-1200 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Papa de monte.

Solanum paposanum Phil.

Sinónimos: *Solanum aberrans* Phil., *Solanum crassipes* Phil. var. *aberrans* (Phil.) Bitter, *Solanum phyllanthum* Cav. var. *aberrans* (Phil.) Witasek ex Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT, COQ.

Solanum pennellii Correll var. *elachistus* Martic. & Quezada

Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 1500 m.

Solanum pentlandii Dunal subsp. *interandinum* (Bitter) Edmonds

Sinónimos: *Solanum masafueranum* Bitter & Scottsb., *Solanum interandinum* Bitter
Subarbusto. Nativo.
Distribución: JFE.
Nota: Presente también en Ecuador.

Solanum pentlandii Dunal subsp. *pentlandii*

Subarbusto. Nativo.
Distribución: TAR.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Solanum peruvianum L.

Sinónimos: *Lycopersicon peruvianum* (L.) Mill.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 0-400 m.
Países limítrofes: Perú.

Solanum pimpinellifolium L.

Sinónimos: *Lycopersicon pimpinellifolium* (L.) Mill.,

Lycopersicon pissisi Phil., *Solanum pissisi* (Phil.) Reiche

Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Perú.

Solanum pinnatum Cav.

Sinónimos: *Solanum maritimum* Meyen ex Nees, *Solanum albiflorum* Phil., *Solanum feuillei* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal, *Solanum novemlobum* Dunal var. *pauciflorum* Dunal, *Solanum pinnatum* Cav. var. *subintegrifolium* (Dunal) Reiche, nom. illeg., *Solanum pinnatum* Cav. var. *tomentosum* Reiche, *Solanum runcinatum* Ruiz & Pav., *Solanum cavanillesii* Dunal var. *subintegrifolium* Dunal, *Solanum gaudichaudiana* (J. Remy) Phil., *Witheringia gaudichaudiana* J. Remy, *Solanum gaudichaudii* Dunal var. *viride* Dunal, *Witheringia pinnata* (Cav.) J. Remy
Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.
Rango altitudinal: 100-800 m.
Nombre vulgar: Hierba del chabalongo, serilla.

Solanum polyphyllum Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR.

Solanum pseudocapsicum L.

Subarbusto. Nativo.
Distribución: ANT, COQ, VAL, RME, BIO, JFE.
Rango altitudinal: 0-2600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Solanum radicans L.f.

Sinónimos: *Solanum ruderales* (J. Remy) F. Phil., *Witheringia ruderales* J. Remy
Subarbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ATA, COQ, LBO.
Rango altitudinal: 500-2800 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Solanum remyanum Phil.

Sinónimos: *Solanum flexuosum* (J. Remy) Phil., *Witheringia flexuosa* J. Remy
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Solanum sanfurgoi Phil.

Arbusto. Endémico.
Distribución: MAU.

Solanum sarrachoides Sendtn.
Sinónimos: *Solanum styleanum* Dunal
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: VAL, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 200-2300 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.
Nombre vulgar: Mora.

Solanum sinuatirecurvum Bitter
Sinónimos: *Solanum metarsium* C.V. Morton
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 3000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Solanum sisymbriifolium Lam.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, NUB.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Solanum sitiens I.M. Johnst.
Sinónimos: *Solanum rickii* Correll
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 2500-3400 m.

Solanum tuberosum L.
Sinónimos: *Solanum chiloense* (A. DC.) Berthault, *Solanum molinae* Juz., *Solanum oceanicum* Brücher, *Solanum tuberosum* L. var. *chiloense* A.DC., *Solanum tuberosum* L. var. *cultum* A. DC., *Solanum tuberosum* L. var. *vulgare* Hook.f., *Solanum fonckii* Phil. ex Reiche, nom. nud., nom. nud., *Solanum chilotanum* Hawkes, nom. nud., *Solanum zykinii* Lechn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 500-3000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Papa, poñi.

Solanum tweedianum Hook.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Solanum valdiviense Dunal
Sinónimos: *Solanum cyrtopodium* Dunal, *Solanum krauseanum* Phil., *Solanum puberulum* Phil., *Solanum poeppigianum* Dunal, nom. nud., *Solanum sembarto* Kuntze, *Solanum sembarto* Kuntze var. *pubescens* Kuntze,

Solanum sembarto Kuntze var. *varians* Kuntze, *Solanum spiraeoides* Dunal, *Solanum subenervium* Dunal
Arbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 100-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Huevil, llaguecillo.

Solanum weddellii Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 4000-4200 m.

Vestia

Vestia foetida Hoffmanns.
Sinónimos: *Vestia lycioides* Willd.
Arbusto. Endémico.
Distribución: VAL, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 200 m.
Nombre vulgar: Chuplín, echuelcúb, huevil.

STYLIDIACEAE

Donatia

Donatia fascicularis J.R. Forst. & G. Forst.
Sinónimos: *Donatia magellanica* Lam., *Polycarpon magellanicum* L.f.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba de Donati, donacia.

Phyllachne

Phyllachne uliginosa J.R. Forst. & G. Forst.
Sinónimos: *Forstera muscifolia* Willd., *Forstera uliginosa* (J.R. Forst. & G. Forst.) Hombr. & Jacquinot
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Musguillo.

TETRACHONDRACEAE

Tetrachondra

Tetrachondra patagonica Skottsbo.

Sinónimos: *Tetrachondra patagonica* Skottsbo. subsp. *fuegiana* D.M. Moore
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Tetracondra.

THYMELAEACEAE

Drapetes

Drapetes muscosus Lam.

Sinónimos: *Drapetes muscooides* Lam.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Ovidia

Ovidia andina (Poepp. & Endl.) Meisn.

Sinónimos: *Daphne andina* Poepp. & Endl., *Daphne tenera* Phil., *Ovidia tenera* (Phil.) Macloskie
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 700-2300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Traro-voqui.

Ovidia pillo-pillo (Gay) Meisn.

Sinónimos: *Daphne pillo-pillo* Gay, *Ovidia parviflora* Meisn.
Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Nombre vulgar: Lloime, palo hediondo, pillopillo.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum

Tropaeolum austropurpureum (J.M. Watson & A.R.

Flores) J.M. Watson & A.R. Flores
Sinónimos: *Tropaeolum hookerianum* Barnéoud subsp. *austropurpureum* J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-200 m.

Tropaeolum azureum Bertero ex Colla

Sinónimos: *Rixea azurea* (Colla) Morren, *Tropaeolum aureum* C.A. Muell., *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *oblongilobum* Buchenau, *Tropaeolum violaeflorum* A. Dietr., *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *angustilobum* Buchenau, *Tropaeolum azureum* Bertero ex Colla var. *grandiflorum* Van Houtte, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau, *Tropaeolum lepidum* Phil. ex Buchenau var. *luteum* Reiche, *Tropaeolum reicheanum* Buchenau ex Reiche, *Tropaeolum luteum* (Reiche) Buchenau
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Nombre vulgar: Pajarito azul.

Tropaeolum beuthii Klotzsch

Sinónimos: *Tropaeolum leptoceras* I.M. Johnst., *Tropaeolum benthamii* Van Houtte
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 300-1000 m.

Tropaeolum brachyceras Hook. & Arn.

Sinónimos: *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla, *Chymocarpus brachyceras* (Hook. & Arn.) Heynh., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *genuinum* Buchenau, *Tropaeolum minimum* Miers, *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *sulphureum* Walp., *Tropaeolum tenellum* G. Don
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Nombre vulgar: Malla, pajarito.

Tropaeolum ciliatum Ruiz & Pav. subsp. *ciliatum*

Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 400-1000 m.

Tropaeolum ciliatum Ruiz & Pav. subsp. *septentrionale* Sparre

Sinónimos: *Tropaeolum venosum* Phil. ex Buchenau
Hierba trepadora. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 400-2000 m.

Tropaeolum hookerianum Barnéoud subsp. *hookerianum*

Sinónimos: *Tropaeolum brachyceras* Hook. & Arn. var. *hookerianum* (Barnéoud) Buchenau
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Mastuerzo.

Tropaeolum hookerianum Barnéoud subsp. ***pilosum*** J.M. Watson & A.R. Flores
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Tropaeolum incisum (Speg.) Sparre
Sinónimos: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *incisum* Speg., *Tropaeolum polyphyllum* Cav. fma. *schizophyllum* H. Ross ex Neger, nom. nud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 1000-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tropaeolum jilesii Sparre
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Tropaeolum kingii Phil.
Sinónimos: *Tropaeolum buchenauii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 900-1500 m.

Tropaeolum leptophyllum G. Don subsp. ***gracile*** (Hook. & Arn.) Sparre
Sinónimos: *Tropaeolum gracile* (Hook. & Arn.) Sparre, *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *gracile* Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-1900 m.

Tropaeolum leptophyllum G. Don subsp. ***leptophyllum***
Sinónimos: *Tropaeolum chilense* Bertero ex Colla var. *eximium* Steud., *Tropaeolum edule* Bridges, *Tropaeolum bridgesii* Field & Gardner, *Tropaeolum linearifolium* Steud.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 1000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Púa.

Tropaeolum looseri Sparre
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 800-2400 m.

Tropaeolum majus L.
Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: VAL, RME, BIO, JFE.

Tropaeolum myriophyllum (Poepp. & Endl.) Sparre
Sinónimos: *Tropaeolum polyphyllum* Cav. var. *myriophyllum* Poepp. & Endl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, BIO.
Rango altitudinal: 400-3500 m.

Tropaeolum nubigenum Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 3000-4000 m.

Tropaeolum nuptae-jucundae Sparre
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Tropaeolum polyphyllum Cav.
Sinónimos: *Chymocarpus polyphyllus* (Cav.) Heynh., *Tropaeolum prostratum* Miers, *Tropaeolum paniculatum* Meyen, *Tropaeolum floribundum* Turcz.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2000-3700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tropaeolum porifolium (Cav.) L. Andersson & S. Andersson
Sinónimos: *Magallana porrifolia* Pers., *Magallana cavanillesii* Scala, *Magallana porifolia* Cav.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Tropaeolum rhomboideum Lem.
Sinónimos: *Tropaeolum tenuirostre* Steud. var. *majus* Buchenau
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1000-2000 m.

Tropaeolum sessilifolium Poepp. & Endl.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 1500-3400 m.

Tropaeolum speciosum Poepp. & Endl.
Sinónimos: *Chymocarpus speciosus* (Poepp. & Endl.) Walp., *Tropaeolum lechleri* Steud., *Anisocentra cardiopetala* Turcz.
Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Nombre vulgar: Martillo del carpintero, pajarito, voqui, quintralito.

Tropaeolum tricolor Sweet

Sinónimos: *Chymocarpus tricolor* (Sweet) Heynh., *Tropaeolum coccineum* Miers, *Tropaeolum elegans* G. Don, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *majus* Marnock, *Tropaeolum jarrattii* Youell ex Paxton, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *jarrattii* (Paxton) Lem., *Tropaeolum subincrassatum* Steud., *Tropaeolum incrassatum* Steud., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *grandiflorum* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *splendens* Reinecke ex Walp., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *pallescens* Barnéoud, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *aurantiacum* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *grandiflorum* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *versicolor* Morren, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *venustum* Paxton ex Otto, *Tropaeolum violaceum* Steud., *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *regelianum* Möhring ex Regel, *Tropaeolum tricolor* Sweet var. *schultzii* Regel
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-2800 m.
Nombre vulgar: Relicario, soldadillo, chupa-chupa, gargantilla, arguenita.

ULMACEAE

Ulmus

Ulmus minor Mill.
Árbol. Introducido.
Distribución: RME.

URTICACEAE

Boehmeria

Boehmeria excelsa (Bertero ex Steud.) Wedd.
Sinónimos: *Splitgerbera denudata* Gay, *Procris excelsa* Bertero ex Steud.
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-400 m.
Nombre vulgar: Manzano.

Parietaria

Parietaria debilis G. Forst.
Hierba. Anual. Nativa.

Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, JFE.

Parietaria feliciana Phil.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: IDE.

Parietaria judaica L.
Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: VAL, RME.

Pilea

Pilea elegans Gay
Sinónimos: *Pilea elliptica* Hook.f. var. *gayana* Wedd.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Coyanlahuén, mellahuvilu.

Pilea elliptica Hook.f.
Sinónimos: *Pilea chilensis* Wedd., *Pilea pedunculata* Blume, *Pilea uliginosa* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1100 m.

Pilea hyalina Fenzl
Sinónimos: *Pilea hyalina* Fenzl var. *longipes* Miq.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: LBO.
Rango altitudinal: 0-1500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Soleirolia

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy
Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI.

Urtica

Urtica berteriana Phil.
Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *berteroana* (Phil.) Wedd.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-600 m.

Urtica dioica L.
Arbusto. Introducido.
Distribución: BIO, ARA, LLA.

Urtica echinata Benth.

Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *punctulata* Hauman, *Urtica andicola* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3600-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Urtica flabellata Kunth

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Urtica glomeruliflora Steud.

Sinónimos: *Urtica fernandeziana* (Gay) H. Ross ex Skottsb., comb. illeg., *Boehmeria fernandeziana* Gay
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 200-1300 m.

Urtica gracilis Aiton subsp. *mollis* (Steud.) Weigend

Sinónimos: *Urtica buchtienii* R. Ross, *Urtica mollis* Steud., *Urtica dioica* L. var. *mollis* (Steud.) Wedd., *Urtica diplotricha* Phil., *Urtica dioica* L. var. *diplotricha* (Phil.) Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Urtica magellanica Poir.

Sinónimos: *Urtica darwinii* Hook.f., *Urtica magellanica* Poir. subsp. *bracteata* (Steud.) Geltman, *Urtica pseudodioica* Steud., *Urtica bracteata* Steud., *Urtica magellanica* Poir. var. *bracteata* (Steud.) Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1300 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Ortiga caballuna.

Urtica masafuerae Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Urtica trichantha (Wedd.) Acevedo & L.E. Navas

Sinónimos: *Urtica echinata* Benth. var. *trichantha* Wedd.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3400-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Itapilla.

Urtica urens L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.

VERBENACEAE

Aloysia

Aloysia deserticola (Phil.) Lu-Irving & O'Leary

Sinónimos: *Acantholippia deserticola* (Phil.) Moldenke, *Acantholippia punensis* Botta, nom. illeg., *Lippia deserticola* Phil., *Lippia microphylla* Phil., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 2300-3500 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Kore.

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc.

Sinónimos: *Verbena gratissima* Gillies & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: VAL.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nota: Moroni et al. 2016 sólo cita un ejemplar para Chile en Valparaíso, Limache recolectado por Garaventa 7092 (SI). No existen otros materiales.

Aloysia salviifolia (Hook. & Arn.) Moldenke

Sinónimos: *Aloysia chilensis* (Schauer) Moldenke, *Verbena salviifolia* Hook. & Arn., *Lippia chilensis* Schauer
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-1600 m.
Nombre vulgar: Salvia blanca, salvia.

Aloysia tarapacana (Botta) Lu-Irving & O'Leary

Sinónimos: *Acantholippia tarapacana* Botta
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 2800-3300 m.

Aloysia trifida (Gay) Lu-Irving & O'Leary

Sinónimos: *Aloysia fonckii* (Phil.) Moldenke, *Aloysia reichei* Moldenke var. *reichei*, *Aloysia reichei* Moldenke var. *trilobata* Moldenke, *Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke, *Lippia trifida* Gay, *Aloysia gracilis* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Lippia trifida* Gay var. *gracilis* (Phil.) Reiche, *Lippia fonckii* Phil., *Acantholippia trifida* (Gay) Moldenke var. *reichei* Moldenke

Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Diostea

Diostea juncea (Gillies & Hook.) Miers
Sinónimos: *Verbena juncea* Gillies & Hook., *Lippia juncea* (Gillies & Hook.) Schauer, *Baillonia juncea* Benth. & Hook.f., *Dipyrena spartioides* Ravenna, *Dipyrena juncea* (Gillies & Hook.) Ravenna, *Dipyrena valdiviana* Phil., *Diostea valdiviana* (Phil.) Miers, *Dipyrena dentata* Phil., *Diostea infusca* Miers, *Dipyrena infusca* (Miers) Ravenna, *Citharexylum germaini* Briq., *Diostea chamaedryfolia* Hort ex Hook.f., nom. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Retama.

Glandularia

Glandularia araucana (Phil.) Botta
Sinónimos: *Verbena araucana* Phil., *Verbena chilensis* Moldenke, *Verbena glabrata* Phil., nom. illeg.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: RME, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Glandularia atacamensis (Reiche) J.M. Watson & A. Hoffm.
Sinónimos: *Verbena atacamensis* Reiche, *Verbena trifida* Kunth var. *deserticola* Moldenke
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-700 m.

Glandularia berteroi (Schauer) Muñoz-Schick
Sinónimos: *Glandularia reichei* (Acevedo) L.E. Navas, *Verbena berteroi* Schauer fma. *albiflora* Moldenke, *Verbena reichei* Acevedo, *Shuttleworthia berteroi* Meisn., *Verbena berteroi* Schauer
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-3400 m.

Glandularia corymbosa (Ruiz & Pav.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena corymbosa* Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Nombre vulgar: Corre-caballito, verbena.
Nota: Se encuentra también en Brasil y Uruguay.

Glandularia gynobasis (Wedd.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena bella* Phil., *Verbena gynobasis* Wedd. var. *strigosa* Phil., *Verbena gynobasis* Wedd.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 1900-4000 m.

Glandularia laciniata (L.) Schnack & Covas
Sinónimos: *Verbena laciniata* (L.) Briq., *Verbena trachea* Phil., *Erinus laciniatus* L., *Verbena odorata* Meyen
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Glandularia landbeckii (Phil.) P. Peralta
Sinónimos: *Verbena landbeckii* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 300-1500 m.

Glandularia lipozygioides (Walp.) L.E. Navas
Sinónimos: *Verbena lipozygioides* Walp., *Verbena lipozygioides* Walp. var. *minima* Walp.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 1200-1400 m.

Glandularia macrosperma (Speg.) Tronc.
Sinónimos: *Glandularia sulphurea* (D. Don) Schnack & Covas var. *intermedia* (Kuntze) L.E. Navas, *Verbena sulphurea* D. Don var. *intermedia* Kuntze, *Verbena macrosperma* Speg.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL.
Rango altitudinal: 2800-3100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Glandularia multiglandulosa (Moldenke) P. Peralta
Sinónimos: *Verbena multiglandulosa* Moldenke
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 1300 m.

Glandularia porrigens (Phil.) J.M. Watson & A. Hoffm.
Sinónimos: *Verbena cumingii* Moldenke, *Verbena paulsenii* Phil., *Verbena porrigens* Phil.

Subarbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Glandularia ribifolia (Walp.) P. Peralta
Sinónimos: *Verbena ribifolia* Walp., *Verbena ribifolia* Walp. var. *foetida* (Phil.) Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. fma. *alba* Acevedo, *Verbena ribifolia* Walp. fma. *longavina* (Phil.) Acevedo, *Verbena foetida* Phil., *Verbena longavina* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 500-2500 m.

Glandularia sulphurea (D. Don) Schnack & Covas var. ***pedunculata*** (Clos) L.E. Navas
Sinónimos: *Verbena sulphurea* D. Don var. *fuscobruba* Skotts., *Verbena sulphurea* D. Don var. *pedunculata* Clos, *Verbena sulphurea* D. Don fma. *alba* Moldenke ex Skotts.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-1000 m.

Glandularia sulphurea (D. Don) Schnack & Covas var. ***sulphurea***
Sinónimos: *Verbena sulphurea* D. Don var. *taltalensis* Moldenke, *Verbena sulphurea* D. Don, *Verbena sulphurea* D. Don var. *longituba* Kuntze, *Verbena sulphurea* D. Don var. *scabra* Acevedo, *Shuttleworthia sulphurea* (D. Don) Meisn., *Uwarowia sulphurea* (D. Don) Meisn.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, ARA.
Rango altitudinal: 2600-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba del incordio.

Junellia

Junellia aretioides (R.E. Fr.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena aretioides* R.E. Fr.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2700-4400 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Junellia bryoides (Phil.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena bryoides* Phil.
Arbusto. Endémico.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 3100-3900 m.
Nombre vulgar: Culesoro, pata de perdiz.

Junellia caespitosa (Gillies & Hook.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena caespitosa* Gillies & Hook.

Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 1400-3600 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia crithmifolia (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena crithmifolia* Gillies & Hook., *Glandularia crithmifolia* (Gillies & Hook.) Schnack & Covas
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia digitata (Phil.) Moldenke var. ***digitata***
Sinónimos: *Verbena triternata* Phil., *Junellia tridactyla* (Phil.) Moldenke, *Junellia punctulata* Hieron. ex Moldenke, *Verbena digitata* Phil., *Verbena tridactyla* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3500-4700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Altea.

Junellia digitata (Phil.) Moldenke var. ***integerrima*** (Botta) Botta
Sinónimos: *Verbena digitata* Phil. var. *integerrima* Botta
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 3200-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia juniperina (Lag.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena juniperina* Lag.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, RME.
Rango altitudinal: 1900-3600 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Tola.

Junellia lavandulaefolia (Phil.) Moldenke
Sinónimos: *Junellia lavandulaefolia* (Phil.) Moldenke var. *colchaguensis* (Phil.) Moldenke, *Verbena lavandulaefolia* Phil., *Verbena colchaguensis* Phil., *Verbena lavandulaefolia* Phil. var. *colchaguensis* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1000-3200 m.

Junellia micrantha (Phil.) Múlgura
Sinónimos: *Junellia micrantha* (Phil.) Moldenke, nom. illeg., *Verbena ramulosa* Phil., *Verbena micrantha* Phil.
Arbusto. Nativo.

Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia minima (Meyen) Moldenke
Sinónimos: *Junellia minima* (Meyen) Moldenke var. *strigosa* Moldenke, *Junellia stragulosoides* Moldenke, *Verbena minima* Meyen, *Verbena stragulooides* (Moldenke) Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Junellia odonellii Moldenke
Sinónimos: *Verbena o'donelli* (Moldenke) Tronc., comb. illeg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia origenes (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Verbena origenes* Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *glabriflora* Moldenke, *Verbena deserticola* Phil., *Verbena origenes* Phil. var. *semperi* Moldenke, *Verbena palmata* Reiche, *Glandularia origenes* (Phil.) Schnack & Covas
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Rica-rica, core, costilla.

Junellia pappigera (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta
Sinónimos: *Urbania egañoides* Phil., *Urbania pappigera* Phil.
Arbusto. Nativo.
Distribución: TAR, ANT, ATA.
Rango altitudinal: 3100-4800 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Junellia pseudojuncea (Gay) Moldenke
Sinónimos: *Verbena pseudojuncea* Gay, *Verbena spathulata* Gillies & Hook. var. *pseudojuncea* (Gay) Reiche, *Thryothamnus junciformis* Phil., *Verbena junciformis* (Phil.) Reiche
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Junellia selaginoides (Kunth ex Walp.) Moldenke var. ***illapelina*** (Phil.) Botta
Sinónimos: *Junellia illapelina* (Phil.) Moldenke, *Verbena illapelina* Phil., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp. var. *illapelina* (Phil.) Reiche

Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 600-1500 m.

Junellia selaginoides (Kunth ex Walp.) Moldenke var. ***selaginoides***
Sinónimos: *Verbena polycephala* Turcz., *Verbena selaginoides* Kunth ex Walp., *Verbena alternifolia* Hort ex Schauer
Arbusto. Endémico.
Distribución: ANT, COQ.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Junellia seriphioides (Gillies & Hook.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena echinata* Phil., *Verbena seriphioides* Gillies & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: AYP, TAR, ANT.
Rango altitudinal: 1300-4200 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Rosa de la cordillera, kaylla.

Junellia silvestrii (Speg.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena silvestrii* Speg.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia spathulata (Gillies & Hook.) Moldenke var. ***glauca*** (Gillies & Hook.) Botta
Sinónimos: *Junellia glauca* (Gillies & Hook.) Moldenke, *Verbena glauca* Gillies & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, MAU.
Rango altitudinal: 500-2700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia spathulata (Gillies & Hook.) Moldenke var. ***spathulata***
Sinónimos: *Verbena spathulata* Gillies & Hook.
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 1900-2200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia thymifolia (Lag.) Moldenke
Sinónimos: *Verbena thymifolia* Lag.
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Junellia tridactylites (Lag.) Moldenke

Sinónimos: *Junellia minutifolia* (Phil.) Moldenke, *Verbena minutifolia* Phil., *Verbena philippiana* Kuntze, nom. illeg., *Verbena tridactylites* Lag.

Arbusto. Nativo.

Distribución: MAG.

Rango altitudinal: 2300-2400 m.

Países limítrofes: Argentina.

Junellia trifurcata (Phil.) Moldenke

Sinónimos: *Verbena trifurcata* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2300-3400 m.

Junellia ulicina (Phil.) Moldenke

Sinónimos: *Verbena ulicina* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.

Rango altitudinal: 0-1800 m.

Países limítrofes: Argentina.

Junellia uniflora (Phil.) Moldenke

Sinónimos: *Verbena uniflora* Phil., *Lycium nanum* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, MAU.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Lampayo

Lampayo hieronymi K. Schum. ex Moldenke

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Lampaya macho.

Nota: El nombre de género *Lampaya* es considerado inválido.

Lampayo medicinalis Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR, ANT.

Rango altitudinal: 2000-4500 m.

Países limítrofes: Bolivia.

Nombre vulgar: Lampaya hembra.

Nota: El nombre de género *Lampaya* es considerado inválido.

Lantana

Lantana camara L.

Arbusto. Introducido.

Distribución: VAL, IPA.

Lippia

Lippia fragrans Turcz.

Sinónimos: *Lippia geisseana* (Phil.) Soler., *Buddleja geisseana* Phil.

Arbusto. Endémico.

Distribución: ANT, ATA, COQ.

Rango altitudinal: 0-1400 m.

Nombre vulgar: Orégano.

Lippia turbinata Griseb.

Sinónimos: *Lippia aprica* Phil., *Lippia disepala* Phil.

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA.

Rango altitudinal: 0-1500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Mulguraea

Mulguraea arequipensis (Botta) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena arequipense* Botta, *Junellia arequipense* (Botta) Botta, *Dipyrena arequipensis* (Botta) Ravenna

Arbusto. Nativo.

Distribución: AYP, TAR.

Rango altitudinal: 2200-4300 m.

Países limítrofes: Perú.

Mulguraea asparagoides (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena asparagoides* Gillies & Hook., *Junellia asparagoides* (Gillies & Hook.) Moldenke

Arbusto. Nativo.

Distribución: ATA, COQ, VAL.

Rango altitudinal: 2000-2800 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Mulguraea cinerascens (Schauer) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Diostea cinerascens* (Schauer) Moldenke, *Verbena cinerascens* Schauer, *Junellia cinerascens* (Schauer) Botta, *Dipyrena cinerascens* (Schauer) Ravenna

Arbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL.

Rango altitudinal: 1000-1500 m.

Mulguraea hystrix (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena hystrix* Phil., *Junellia hystrix* (Phil.) Moldenke

Arbusto. Nativo.

Distribución: ANT, ATA.

Rango altitudinal: 2600-3700 m.

Países limítrofes: Argentina.

Mulguraea scoparia (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena scoparia* Gillies & Hook., *Diostea scoparia* (Gillies & Hook.) Miers, *Diostea scirpea* (Phil.) Miers, *Lippia aphylla* Phil., *Lippia scirpea* Phil., *Verbena scoparia* Gillies & Hook. var. *aphylla* (Phil.) Acevedo, comb. illeg., *Junellia scoparia* (Gillies & Hook.) Botta, *Dipyrena scoparia* (Hook.) Ravenna
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1800-3000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Mulguraea tridens (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Verbena tridens* Lag., *Junellia tridens* (Lag.) Moldenke
Arbusto. Nativo.
Distribución: MAG.
Rango altitudinal: 0-800 m.
Países limítrofes: Argentina.

Phyla

Phyla nodiflora (L.) Greene var. *minor* (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta

Sinónimos: *Phyla canescens* (Kunth) Greene, *Lippia canescens* Kunth, *Lippia nodiflora* (L.) Michx. var. *minor* Gillies & Hook., *Lippia litoralis* Phil., *Phyla nodiflora* (L.) Greene fma. *copiapina* Acevedo
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Phyla nodiflora (L.) Greene var. *nodiflora*

Sinónimos: *Lippia nodiflora* (L.) Michx., *Verbena nodiflora* L.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: TAR, ATA.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Hierba de la virgen María, tiqui-tiqui, tiquil-tiquil.

Pitraea

Pitraea cuneato-ovata (Cav.) Caro

Sinónimos: *Castelia cuneato-ovata* Cav., *Pitraea chilensis* Turcz., *Priva cuneato-ovata* (Cav.) Rusby, *Bouchea copiapensis* Gay
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina y Perú.

Nombre vulgar: Chámen.

Rhaphithamnus

Rhaphithamnus spinosus (Juss.) Moldenke

Sinónimos: *Volkameria spinosa* Juss., *Duranta umbilicata* Miers, *Duranta umbellata* Miers, *Citharexylum cyanocarpum* Hook. & Arn., *Citharexylum ovatum* Turcz., *Rhaphithamnus cyanocarpum* (Hook. & Arn.) Miers, *Rhaphithamnus amoenus* Miers, *Rhaphithamnus buxifolius* Miers, *Rhaphithamnus parvifolius* Miers, *Rhaphithamnus macranthus* Gand., *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke fma. *albiflorus* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke var. *inermis* G. Kunkel, *Rhaphithamnus spinosus* (Juss.) Moldenke fma. *microphyllus* G. Kunkel
Arbusto. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Arrayán macho, espino negro, arrayán de espino, huayún, espino blanco, hayún, repu, arrayancillo.

Rhaphithamnus venustus (Phil.) B.L. Rob.

Sinónimos: *Citharexylum venustum* Phil., *Rhaphithamnus longiflorus* Miers, *Rhaphithamnus serratifolius* Miers, *Rhaphithamnus venustus* (Phil.) Skotts., comb. illeg.
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Nombre vulgar: Juan bueno.

Verbena

Verbena bonariensis L.

Hierba. Anual o bienal. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-2100 m.
Países limítrofes: Argentina y Bolivia.
Nombre vulgar: Verbena.

Verbena cuneifolia Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.
Países limítrofes: Perú.

Verbena hispida Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP, TAR, VAL, RME, LBO, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-3500 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Verbena litoralis Kunth

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

Rango altitudinal: 0-2000 m.

Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.

Nombre vulgar: Verbena.

Nota: Introducida en el Archipiélago Juan Fernández y en la Isla de Pascua.

Verbena officinalis L.

Hierba. Perenne. Introducida.

Distribución: COQ, MAU, BIO, ARA, LRI.

VIOLACEAE

Pombalia

Pombalia parviflora (Mutis ex L.f.) Paula-Souza

Sinónimos: *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill., *Viola parviflora* Mutis ex L.f., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *latifolius* (Eichler) Hassl., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *argentiniensis* Sparre, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *glutinosus* (Vent.) Hassl., *Ionidium parviflorum* (Mutis ex L.f.) Vent., *Ionidium glutinosum* Vent., *Hybanthus glutinosus* (Vent.) Taub., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *typicus* Hassl., nom. illeg., *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. fma. *membranaceus* Schulze-Menz, *Calceolaria bangii* Rusby, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *chamaedrifolius* (C. Presl) Sparre, *Ionidium chamaedryfolium* Poepp. ex Walp., *Solea parviflora* (Mutis ex L.f.) Spreng., *Ionidium glutinosum* Vent. var. *latifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *angustifolium* Eichler, *Ionidium glutinosum* Vent. var. *paraguayense* Chodat, *Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill. var. *bangii* (Rusby) Sparre, *Hybanthus maytencillo* Baill., *Hybanthus microphyllus* (Willd. ex Schult.) Baill., *Ionidium microphyllum* (Willd. ex Schult.) Kunth, *Solea glutinosa* (Vent.) Spreng., *Viola glutinosa* (Vent.) Poir., *Viola microphylla* Willd. ex Schult., nom. illeg., *Viola parvifolia* Schult., *Viola venezuelensis* Steyererm.

Hierba. Anual o perenne. Nativa.

Distribución: LBO, BIO.

Rango altitudinal: 0-3500 m.

Países limítrofes: Argentina y Bolivia.

Viola

Viola acanthophylla Leyb. ex Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Viola aizoon Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: NUB, ARA.

Viola angustifolia Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME, LBO.

Viola araucaniae W. Becker

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: ARA.

Viola arvensis Murray

Hierba. Anual o bienal. Introducida.

Distribución: NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.

Viola atropurpurea Leyb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.

Rango altitudinal: 2500-4000 m.

Países limítrofes: Argentina.

Nombre vulgar: Escarapela, carabello.

Viola aurantiaca Leyb.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2600-3000 m.

Viola aurata Phil.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: COQ.

Rango altitudinal: 900-1100 m.

Nombre vulgar: Estrellita.

Viola auricolor Skottsb.

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AIS.

Rango altitudinal: 780-1200 m.

Países limítrofes: Argentina.

Viola auricula Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: RME.

Rango altitudinal: 2200-2500 m.

Viola brachypetala Gay

Hierba. Anual. Endémica.

Distribución: VAL.

Viola bustillosia Gay

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LBO.

Rango altitudinal: 2100-2400 m.

Viola calderensis W. Becker

Sinónimos: *Viola pseudasterias* Reiche, *Viola pseudasterias* Reiche var. *psammophila* (Phil.) Reiche, *Viola psammophila* Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Viola cano-barbata Leyb.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola capillaris Pers. var. ***araucana*** (Phil.) Reiche

Subarbusto. Endémico.
Distribución: NUB, BIO, ARA.

Viola capillaris Pers. var. ***capillaris***

Sinónimos: *Viola stipularis* Cav.
Subarbusto. Nativo.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-300 m.
Países limítrofes: Perú.

Viola capillaris Pers. var. ***dumetorum*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Viola dumetorum* Phil., *Viola dumetorum* Phil. var. *araucana* Phil.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: BIO.

Viola chamaedrys Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: VAL, RME.
Rango altitudinal: 1500-1900 m.

Viola columnaris Skottsbo.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 800-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola commersonii DC. ex Ging.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola congesta Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, MAU.

Viola corralensis Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.

Distribución: LRI.

Rango altitudinal: 0-500 m.

Viola cotyledon Ging.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Rango altitudinal: 900-3300 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Hierba del corazón.

Viola curicoensis W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.

Viola cyathiformis W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB.
Rango altitudinal: 600-700 m.

Viola decipiens Reiche

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, RME, NUB.
Rango altitudinal: 2700-3500 m.

Viola domeykoana Gay

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 3000-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola escarapela J.M. Watson & A.R. Flores

Sinónimos: *Viola pulchella* Leyb. ex Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ, VAL, MAU.
Rango altitudinal: 0-2000 m.

Viola farkasiana J.M. Watson & A.R. Flores

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO.
Rango altitudinal: 1400-1500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola flühmannii Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LRI.
Rango altitudinal: 1500-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola friderici W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Viola frigida Phil.

Sinónimos: *Viola frigida* Phil. var. *borchersii* (Phil.) Reiche,
Viola borchersi Phil.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL.
Rango altitudinal: 3000-4100 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola germainii Sparre

Sinónimos: *Viola nivalis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 3000 m.

Viola glacialis Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2500 m.

Viola glechomoides Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2200-2800 m.

Viola godoyae Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.

Viola granulosa Wedd.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AYP.
Rango altitudinal: 4000-4500 m.
Países limítrofes: Bolivia y Perú.

Viola huesoensis Martic.

Sinónimos: *Viola litoralis* Phil., nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Viola huidobrii Gay

Sinónimos: *Viola lechlerii* Griseb.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: BIO, ARA, LLA.
Rango altitudinal: 100-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola johnstonii W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: ANT.

Viola karlreicheana Sanso, Seo & Xifreda

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.

Viola lanifera W. Becker

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 3000-3200 m.

Viola leyboldiana Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: VAL, MAU.

Viola llullaillacoensis W. Becker

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA.
Rango altitudinal: 4000-4200 m.

Viola maculata Cav. var. *maculata*

Sinónimos: *Viola maculata* Cav. var. *pubescens* Reiche,
Viola valdiviana Kalela, *Viola buchtienii* Gand., *Viola maculata* Cav. fma. *chilensis* Weibel, *Viola maculata* Cav. fma. *chillanensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. fma. *constitucionensis* Sparre, *Viola maculata* Cav. fma. *munozii* Sparre, *Viola maculata* Cav. fma. *valdiviana* (Kalela) Weibel, *Viola maculata* Cav. var. *buchtienii* (Gand.) Weibel
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pilludén, violeta del monte.

Viola maculata Cav. var. *microphyllus* (Poir.) DC. ex Ging.

Sinónimos: *Viola microphyllus* Poir., *Viola maculata* Cav. subsp. *microphyllus* (Poir.) Weibel
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola maculata Cav. var. *popetae* Sparre

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO.

Viola magellanica G. Forst.

Sinónimos: *Viola magniflora* Molina
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, MAG.
Rango altitudinal: 0-700 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola minutiflora Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: BIO, ARA.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Viola montagnei Gay var. ***glandulosa*** Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: COQ, RME.
Rango altitudinal: 2600-4100 m.

Viola montagnei Gay var. ***montagnei***

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2900-4200 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola muscoides Phil.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 700 m.

Viola nassauvioides Phil.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME.

Viola nubigena Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2500-3000 m.

Viola odorata L.

Hierba. Perenne. Introducida.
Distribución: VAL, LBO, BIO.

Viola ovalleana Phil.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.
Rango altitudinal: 2600-2800 m.

Viola philippii Leyb. var. ***arbuscula*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Viola arbuscula* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 2000-4000 m.

Viola philippii Leyb. var. ***philippii***

Sinónimos: *Viola microphylla* Phil.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 2500-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola polypoda Turcz.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-3500 m.

Viola portalesia Gay var. ***integerrima*** (Phil.) Reiche

Sinónimos: *Viola integerrima* Phil.

Subarbusto. Endémico.

Distribución: COQ, VAL, LBO, MAU.
Rango altitudinal: 0-3000 m.

Viola portalesia Gay var. ***portalesia***

Sinónimos: *Viola rubella* auct. non Cav.
Subarbusto. Endémico.
Distribución: VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-1800 m.

Viola portulacea Leyb.

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 2500-4500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola pulvinata Reiche

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: RME.
Rango altitudinal: 1900 m.

Viola pusilla Poepp.

Sinónimos: *Viola asterias* Hook. & Arn., *Viola miersii* Bertero ex Steud., *Viola stellata* Miers, *Viola asterias* Hook. & Arn. var. *genuina* Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 0-2700 m.

Viola reichei Skottsbo.

Sinónimos: *Viola maculata* Cav. subsp. *reichei* (Skottsbo.) Weibel, *Viola reichei* Skottsbo. fma. *gunckelii* Sparre
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola rhombifolia Leyb.

Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 1500-2000 m.

Viola rosulata Poepp. & Endl.

Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 2000-2200 m.

Viola rubella Cav.

Sinónimos: *Viola rubella* Cav. var. *angustifolia* Ging., *Viola rubella* Cav. var. *latifolia* Ging.
Subarbusto. Endémico.

Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 0-300 m.

Viola rudolphii Sparre
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LRI, LLA.
Rango altitudinal: 1100 m.

Viola rugosa Phil. ex W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: MAU.

Viola sacculus Skottsbo.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: AIS.
Rango altitudinal: 1000-1300 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola santiagoensis W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Viola sempervivum Gay
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 2000-3500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola skottsbergiana W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: LBO, MAU, BIO.
Rango altitudinal: 2000-3000 m.

Viola subandina J.M. Watson
Sinónimos: *Viola pusilla* Hook. & Arn. ex Hook.
Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: RME, LBO, MAU, NUB.
Rango altitudinal: 2000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola taltalensis W. Becker var. ***glaberrima*** W. Becker
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Viola taltalensis W. Becker var. ***taltalensis***
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

Viola toroensis Martic.
Sinónimos: *Viola chrysantha* Phil., nom. illeg.
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: COQ.

Viola tricolor L.
Hierba. Anual o bienal. Introducida.
Distribución: VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,
LRI, LLA.

Viola tridentata Menzies ex Ging.
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1000 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola truncata Meyen var. ***glaberrima*** W. Becker
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Viola truncata Meyen var. ***glandulifera*** W. Becker
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: MAU.
Rango altitudinal: 2000-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.

Viola truncata Meyen var. ***truncata***
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME, LBO.
Rango altitudinal: 300-2300 m.

Viola vallenarensis W. Becker
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 4000 m.

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn. var. ***chillanensis***
(Phil.) Reiche
Sinónimos: *Viola chillanensis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: NUB.
Rango altitudinal: 1300-1400 m.

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn. var. ***exilis*** (Phil.)
Reiche
Sinónimos: *Viola exilis* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: RME.

Viola volcanica Gillies ex Hook. & Arn. var. ***volcanica***
Sinónimos: *Viola congesta* auct. non Gillies
Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO.
Rango altitudinal: 1200-4000 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Marmo.

Viola werdermannii W. Becker var. *glaberrima* W. Becker
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: TAR, ANT.
Rango altitudinal: 700 m.

Viola werdermannii W. Becker var. *werdermannii*
Hierba. Anual. Endémica.
Distribución: ANT.
Rango altitudinal: 0-500 m.

VITACEAE

Cissus

Cissus striata Ruiz & Pav.
Sinónimos: *Cissus deficiens* Hook. & Arn., *Adenopetalum palmatum* Turcz., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *chilensis* Suess., *Cissus striata* Ruiz & Pav. var. *deficiens* (Hook. & Arn.) Reiche, *Cissus striata* Bertero ex Steud., *Cissus stricta* Bertero ex Steud., *Cissus violacea* Meyen, *Vitis straita* E.G. Baker, *Cissus bonariensis* Hook & Arn.
Arbusto trepador. Nativo.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Pilpilvoqui, voqui colorado.

Vitis

Vitis vinifera L.
Arbusto trepador. Introducido.
Distribución: LBO, MAU, NUB, BIO, JFE.
Nombre vulgar: Vid, parra.

WINTERACEAE

Drimys

Drimys andina (Reiche) R. A. Rodr. & Quezada
Sinónimos: *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *andina* Reiche, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *chilensis* (DC.) A. Gray fma. *andina* (Reiche) Hauman, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *quinoensis* Kuntze
Arbusto. Endémico.
Distribución: BIO, ARA, LRI, LLA.
Rango altitudinal: 800-1500 m.
Nombre vulgar: Canelo enano.

Drimys confertifolia Phil.

Sinónimos: *Drimys fernandeziana* Steud., *Drimys fernandezianus* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *fernandeziana* (Steud.) Reiche, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *confertifolia* (Phil.) Johow
Árbol. Endémico.
Distribución: JFE.
Rango altitudinal: 100-1200 m.
Nombre vulgar: Canelo de Juan Fernández.

Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. var. *chilensis* (DC.) A. Gray

Sinónimos: *Drimys paniculata* Steud., *Drimys chilensis* DC. var. *latifolia* Miers, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. fma. *chilensis* Eichler, *Drimys chilensis* DC.
Árbol. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-1700 m.
Nombre vulgar: Canelo.

Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. var. *winteri*

Sinónimos: *Wintera aromatica* Sol. ex Foth., *Drimys punctata* Lam., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *punctata* (Lam.) DC., *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. fma. *magellanica* Eichler, *Drimys winteri* J.R. Forst. & G. Forst. var. *morenonis* Kuntze, *Drimys wintera* Thell., *Drimys aromatique* Descourt. ex Baill.
Árbol. Nativo.
Distribución: COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
Rango altitudinal: 0-2500 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Canelo, foye.

ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesia

Bulnesia chilensis Gay

Sinónimos: *Gonoptera chilensis* Turcz.
Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA, COQ.
Rango altitudinal: 100-4000 m.
Nombre vulgar: Retama, retama del cerro.

Fagonia

Fagonia chilensis Hook. & Arn.

Sinónimos: *Fagonia chilensis* Hook. & Arn. var. *aspera* (Gay) I.M. Johnst., *Fagonia subaphylla* Phil., *Fagonia aspera* Gay
Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Rango altitudinal: 0-4000 m.
Países limítrofes: Perú.
Nombre vulgar: Hualputilla, rosita.

Larrea

Larrea divaricata Cav.

Sinónimos: *Covillea divaricata* (Cav.) Vail, *Neoschroetera divaricata* (Cav.) Briq., *Schroeterella divaricata* (Cav.) Briq.
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, VAL, RME, BIO.
Rango altitudinal: 0-3000 m.
Países limítrofes: Argentina, Bolivia y Perú.
Nombre vulgar: Jarrilla.

Larrea nitida Cav.

Sinónimos: *Larrea balsamica* I.M. Johnst., *Covillea nitida* (Cav.) Vail
Arbusto. Nativo.
Distribución: ATA, COQ, VAL, RME.
Rango altitudinal: 0-3400 m.
Países limítrofes: Argentina.
Nombre vulgar: Jarrilla.

Metharme

Metharme lanata Phil. ex Engl.

Sinónimos: *Metharme lanata* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Distribución: AYP, TAR.
Rango altitudinal: 2100-2200 m.

Pintoa

Pintoa chilensis Gay

Arbusto. Endémico.
Distribución: ATA.
Rango altitudinal: 200-1500 m.

Porlieria

Porlieria chilensis I.M. Johnst.

Arbusto o árbol pequeño. Endémico.
Distribución: COQ, VAL, RME, LBO.
Rango altitudinal: 0-1400 m.
Nombre vulgar: Guayacán, palo santo.

Tribulus

Tribulus terrestris L.

Hierba. Anual. Introducida.
Distribución: TAR, ANT, ATA, RME.

ANEXO 1. Lista alfabética de géneros con su respectiva familia y clase. Los acrónimos de las clases son: LYCOP (Lycopodiopsida), POLYP (Polypodiopsida), GNETO (Gnetopsida), PINOP (Pinopsida), LILIO (Liliopsida) y MAGNO (Magnoliopsida). / Alphabetic list of genera with family and class. Each class acronym: LYCOP (Lycopodiopsida), POLYP (Polypodiopsida), GNETO (Gnetopsida), PINOP (Pinopsida), LILIO (Liliopsida) y MAGNO (Magnoliopsida).

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Abrotanella</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Ammophila</i>	Poaceae	LILIO
<i>Abutilon</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Amomyrtus</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Acacia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Amphibromus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Acaena</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Amphiscirpus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Achillea</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Amsinckia</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Achyrocline</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anagallis</i>	Primulaceae	MAGNO
<i>Acmella</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anaphalis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Acrisione</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anarthrophyllum</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Adenocaulon</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anatherostipa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Adenopeltis</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Andeimalva</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Adesmia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Androsace</i>	Primulaceae	MAGNO
<i>Adiantum</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Anemone</i>	Ranunculaceae	MAGNO
<i>Aextoxicon</i>	Aextoxicaceae	MAGNO	<i>Anethum</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Agalinis</i>	Orobanchaceae	MAGNO	<i>Anisomeria</i>	Phytolaccaceae	MAGNO
<i>Ageratum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anoda</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Agoseris</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Anredera</i>	Basellaceae	MAGNO
<i>Agropyron</i>	Poaceae	LILIO	<i>Antennaria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Agrostemma</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Anthemis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Agrostis</i>	Poaceae	LILIO	<i>Anthoxanthum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Ailanthus</i>	Simaroubaceae	MAGNO	<i>Anthriscus</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Aira</i>	Poaceae	LILIO	<i>Antidaphne</i>	Santalaceae	MAGNO
<i>Albizia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Apera</i>	Poaceae	LILIO
<i>Aldama</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Aphanes</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Alisma</i>	Alismataceae	LILIO	<i>Aphyllocladus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Allionia</i>	Nyctaginaceae	MAGNO	<i>Apium</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Allium</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Apodasmia</i>	Restionaceae	LILIO
<i>Alnus</i>	Betulaceae	MAGNO	<i>Aponogeton</i>	Aponogetonaceae	LILIO
<i>Alonsoa</i>	Scrophulariaceae	MAGNO	<i>Aquilegia</i>	Ranunculaceae	MAGNO
<i>Alopecurus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Arabidopsis</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Aloysia</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Arachnitis</i>	Corsiaceae	LILIO
<i>Alshehbazia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Araeoandra</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Alstroemeria</i>	Alstroemeriaceae	LILIO	<i>Araucaria</i>	Araucariaceae	PINOP
<i>Alternanthera</i>	Amaranthaceae	MAGNO	<i>Arctium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Alyssum</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Arctotheca</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Amaranthus</i>	Amaranthaceae	MAGNO	<i>Arenaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Amaryllis</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Argemone</i>	Papaveraceae	MAGNO
<i>Amblyopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Argyria</i>	Bignoniaceae	MAGNO
<i>Ambrosia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Argyranthemum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Amelichloa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Argyrochosma</i>	Pteridaceae	POLYP
<i>Ammannia</i>	Lythraceae	MAGNO	<i>Aristida</i>	Poaceae	LILIO
<i>Ammi</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Aristolochia</i>	Aristolochiaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Aristolelia</i>	Elaeocarpaceae	MAGNO	<i>Benthamiella</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Arjona</i>	Schoepfiaceae	MAGNO	<i>Berberidopsis</i>	Berberidopsidaceae	MAGNO
<i>Armeria</i>	Plumbaginaceae	MAGNO	<i>Berberis</i>	Berberidaceae	MAGNO
<i>Arnica</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Beta</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Arrhenatherum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Bidens</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Artemisia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Bipinnula</i>	Orchidaceae	LILIO
<i>Arthropteris</i>	Oleandraceae	POLYP	<i>Blechnum</i>	Blechnaceae	POLYP
<i>Arundo</i>	Poaceae	LILIO	<i>Blennosperma</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Asclepias</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Blepharocalyx</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Asperugo</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Blumenbachia</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Asphodelus</i>	Asphodelaceae	LILIO	<i>Boehmeria</i>	Urticaceae	MAGNO
<i>Asplenium</i>	Aspleniaceae	POLYP	<i>Boerhavia</i>	Nyctaginaceae	MAGNO
<i>Astelia</i>	Asteliaceae	LILIO	<i>Bolax</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Asteranthera</i>	Gesneriaceae	MAGNO	<i>Bolboschoenus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Asteriscium</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Bomarea</i>	Alstroemeriaceae	LILIO
<i>Astragalus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Boopis</i>	Calyceraceae	MAGNO
<i>Astrolepis</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Boquila</i>	Lardizabalaceae	MAGNO
<i>Atacama</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Borago</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Atriplex</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Bothriochloa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Augustea</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Botrychium</i>	Ophioglossaceae	POLYP
<i>Austrocactus</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Bouteloua</i>	Poaceae	LILIO
<i>Austrocedrus</i>	Cupressaceae	PINOP	<i>Bowlesia</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Austrolycopodium</i>	Lycopodiaceae	LYCOP	<i>Brachyclados</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Austrostipa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Brachypodium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Avellanita</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Brachystele</i>	Orchidaceae	LILIO
<i>Avena</i>	Poaceae	LILIO	<i>Brassica</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Avenella</i>	Poaceae	LILIO	<i>Bridgesia</i>	Sapindaceae	MAGNO
<i>Axonopus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Briza</i>	Poaceae	LILIO
<i>Azara</i>	Salicaceae	MAGNO	<i>Bromelia</i>	Poaceae	LILIO
<i>Azolla</i>	Salviniaceae	POLYP	<i>Bromidium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Azorella</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Bromus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Baccharis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Broussonetia</i>	Moraceae	MAGNO
<i>Bacopa</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Browningia</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Bahia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Bryantiella</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Bakerolimon</i>	Plumbaginaceae	MAGNO	<i>Buddleja</i>	Scrophulariaceae	MAGNO
<i>Balbisia</i>	Francoaceae	MAGNO	<i>Buglossoides</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Balsamocarpon</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Bulnesia</i>	Zygophyllaceae	MAGNO
<i>Barbarea</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Caesalpinia</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Barneoudia</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Caiophora</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Bassia</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Calandrinia</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Beilschmiedia</i>	Lauraceae	MAGNO	<i>Calceolaria</i>	Calceolariaceae	MAGNO
<i>Bellardia</i>	Orobanchaceae	MAGNO	<i>Caldcluvia</i>	Cunoniaceae	MAGNO
<i>Bellis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Calendula</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Belloa</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Calibrachoa</i>	Solanaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Calliandra</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Chersodoma</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Callianthemoides</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Chevreulia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Callitriche</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Chiliotrichum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Calopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Chiropetalum</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Calothea</i>	Poaceae	LILIO	<i>Chloraea</i>	Orchidaceae	LILIO
<i>Caltha</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Chloris</i>	Poaceae	LILIO
<i>Calycera</i>	Calyceraceae	MAGNO	<i>Chorispora</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Calydorea</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Chorizanthe</i>	Polygonaceae	MAGNO
<i>Calyptocarpus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Chrysanthemoides</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Calystegia</i>	Convolvulaceae	MAGNO	<i>Chrysanthemum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Camelina</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Chrysosplenium</i>	Saxifragaceae	MAGNO
<i>Camissonia</i>	Onagraceae	MAGNO	<i>Chuquiraga</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Campanula</i>	Campanulaceae	MAGNO	<i>Chusquea</i>	Poaceae	LILIO
<i>Campsidium</i>	Bignoniaceae	MAGNO	<i>Cicendia</i>	Gentianaceae	MAGNO
<i>Capsella</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Cichorium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Cardamine</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Cirsium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Cardionema</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Cissarobryon</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Carduus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Cissus</i>	Vitaceae	MAGNO
<i>Carex</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Cistanthe</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Carica</i>	Caricaceae	MAGNO	<i>Citronella</i>	Cardiopteridaceae	MAGNO
<i>Carpha</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Cladanthus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Carpobrotus</i>	Aizoaceae	MAGNO	<i>Clarkia</i>	Onagraceae	MAGNO
<i>Carthamus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Clematis</i>	Ranunculaceae	MAGNO
<i>Castilleja</i>	Orobanchaceae	MAGNO	<i>Cleome</i>	Cleomaceae	MAGNO
<i>Catabrosa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Clinanthus</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Catapodium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Cliococca</i>	Linaceae	MAGNO
<i>Catharanthus</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Codonorchis</i>	Orchidaceae	LILIO
<i>Cenchrus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Coix</i>	Poaceae	LILIO
<i>Centaurea</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Coleostephus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Centaurium</i>	Gentianaceae	MAGNO	<i>Colletia</i>	Rhamnaceae	MAGNO
<i>Centaurodendron</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Colliguaja</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Centella</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Collomia</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Centipeda</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Colobanthus</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Centranthus</i>	Caprifoliaceae	MAGNO	<i>Colocasia</i>	Araceae	LILIO
<i>Centunculus</i>	Primulaceae	MAGNO	<i>Combera</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Cerastium</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Commelina</i>	Commelinaceae	LILIO
<i>Ceratophyllum</i>	Ceratophyllaceae	MAGNO	<i>Conanthera</i>	Tecophilaeaceae	LILIO
<i>Cestrum</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Conium</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Chaetanthera</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Convolvulus</i>	Convolvulaceae	MAGNO
<i>Chaptalia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Conyza</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Chascolytrum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Copiapoa</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Cheilanthes</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Coprosma</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Chenopodiastrum</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Cordia</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Chenopodium</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Cordyline</i>	Asparagaceae	LILIO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Coreopsis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Datura</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Coriandrum</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Daucus</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Coriaria</i>	Coriariaceae	MAGNO	<i>Davallia</i>	Davalliaceae	POLYP
<i>Correorchis</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Delairea</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Corrigiola</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Dendroseris</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Corryocactus</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Dennstaedtia</i>	Dennstaedtiaceae	POLYP
<i>Cortaderia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Deschampsia</i>	Poaceae	LILIO
<i>Corynabutilon</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Descurainia</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Corynephorus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Desfontainia</i>	Columelliaceae	MAGNO
<i>Cotoneaster</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Desmanthus</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Cotula</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Desmaria</i>	Loranthaceae	MAGNO
<i>Crassula</i>	Crassulaceae	MAGNO	<i>Deuterocohnia</i>	Bromeliaceae	LILIO
<i>Cremolobus</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Deyeuxia</i>	Poaceae	LILIO
<i>Crepis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Dianthus</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Cressa</i>	Convolvulaceae	MAGNO	<i>Dichantheium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Crinodendron</i>	Elaeocarpaceae	MAGNO	<i>Dichelachne</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cristaria</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Dichondra</i>	Convolvulaceae	MAGNO
<i>Crocasmia</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Dicksonia</i>	Dicksoniaceae	POLYP
<i>Crotalaria</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Dicliptera</i>	Acanthaceae	MAGNO
<i>Croton</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Dielsiochloa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cruckshanksia</i>	Rubiaceae	MAGNO	<i>Digitalis</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Cryptantha</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Digitaria</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cryptocarya</i>	Lauraceae	MAGNO	<i>Dinemagonum</i>	Malpighiaceae	MAGNO
<i>Cryptogramma</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Dinemandra</i>	Malpighiaceae	MAGNO
<i>Cuatrecasasiella</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Dioscorea</i>	Dioscoreaceae	LILIO
<i>Cuminia</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Diostea</i>	Verbenaceae	MAGNO
<i>Cumulopuntia</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Diphasium</i>	Lycopodiaceae	LYCOP
<i>Cuscuta</i>	Convolvulaceae	MAGNO	<i>Diplachne</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cyclospermum</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Diplazium</i>	Athyriaceae	POLYP
<i>Cylindropuntia</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Diplolepis</i>	Apocynaceae	MAGNO
<i>Cymbalaria</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Diplostephium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Cymbopogon</i>	Poaceae	LILIO	<i>Diptotaxis</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Cynara</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Dipogon</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Cynodon</i>	Poaceae	LILIO	<i>Diposis</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Cynoglossum</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Dipsacus</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Cynosurus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Discaria</i>	Rhamnaceae	MAGNO
<i>Cyperus</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Distichia</i>	Juncaceae	LILIO
<i>Cyphocarpus</i>	Campanulaceae	MAGNO	<i>Distichlis</i>	Poaceae	LILIO
<i>Cystopteris</i>	Cystopteridaceae	POLYP	<i>Dittrichia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Cytisus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Dodonaea</i>	Sapindaceae	MAGNO
<i>Dactylis</i>	Poaceae	LILIO	<i>Domeykoa</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Dalea</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Donatia</i>	Stylidiaceae	MAGNO
<i>Danthonia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Doniophyton</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Dasyphyllum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Downingia</i>	Campanulaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Draba</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Errazurizia</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Drapetes</i>	Thymelaeaceae	MAGNO	<i>Eruca</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Drimys</i>	Winteraceae	MAGNO	<i>Eryngium</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Drosera</i>	Droseraceae	MAGNO	<i>Erythranthe</i>	Phrymaceae	MAGNO
<i>Drymaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Escallonia</i>	Escalloniaceae	MAGNO
<i>Dryopteris</i>	Dryopteridaceae	POLYP	<i>Eschscholzia</i>	Papaveraceae	MAGNO
<i>Duchesnea</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Eucalyptus</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Dunalia</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Eucryphia</i>	Cunoniaceae	MAGNO
<i>Dysopsis</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Eulychnia</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Dysphania</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Eupatorium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Eccremocarpus</i>	Bignoniaceae	MAGNO	<i>Euphorbia</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Echinochloa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Euphrasia</i>	Orobanchaceae	MAGNO
<i>Echinopsis</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Evolvulus</i>	Convolvulaceae	MAGNO
<i>Echium</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Exodeconus</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Eclipta</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Fabiana</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Egeria</i>	Hydrocharitaceae	LILIO	<i>Facelis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Ehrharta</i>	Poaceae	LILIO	<i>Fagara</i>	Rutaceae	MAGNO
<i>Eichhornia</i>	Pontederiaceae	LILIO	<i>Fagonia</i>	Zygophyllaceae	MAGNO
<i>Elaphoglossum</i>	Dryopteridaceae	POLYP	<i>Fallopia</i>	Polygonaceae	MAGNO
<i>Elatine</i>	Elatinaceae	MAGNO	<i>Famatina</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Eleocharis</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Fascicularia</i>	Bromeliaceae	LILIO
<i>Eleusine</i>	Poaceae	LILIO	<i>Festuca</i>	Poaceae	LILIO
<i>Elodea</i>	Hydrocharitaceae	LILIO	<i>Ficinia</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Elymus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Ficus</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Elytrigia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Fitzroya</i>	Cupressaceae	PINOP
<i>Elytropus</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Flaveria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Embothrium</i>	Proteaceae	MAGNO	<i>Flourensia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Emex</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Foeniculum</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Empetrum</i>	Ericaceae	MAGNO	<i>Fonkia</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Encelia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Fragaria</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Enneapogon</i>	Poaceae	LILIO	<i>Francoa</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Ephedra</i>	Ephedraceae	GNETO	<i>Frankenia</i>	Frankeniaceae	MAGNO
<i>Epilobium</i>	Onagraceae	MAGNO	<i>Fraxinus</i>	Oleaceae	MAGNO
<i>Equisetum</i>	Equisetaceae	POLYP	<i>Fuchsia</i>	Onagraceae	MAGNO
<i>Eragrostis</i>	Poaceae	LILIO	<i>Fumaria</i>	Papaveraceae	MAGNO
<i>Ercilla</i>	Phytolaccaceae	MAGNO	<i>Gaillardia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Erechtites</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Gaimardia</i>	Restionaceae	LILIO
<i>Eremium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Galega</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Eremocharis</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Galenia</i>	Aizoaceae	MAGNO
<i>Eriachaenium</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Galeopsis</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Erigeron</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Galinsoga</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Eriochloa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Galium</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Eriosyce</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Gamocarpha</i>	Calyceraceae	MAGNO
<i>Erodium</i>	Geraniaceae	MAGNO	<i>Gamochaeta</i>	Asteraceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Gardoquia</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Hebe</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Gastridium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Hedera</i>	Araliaceae	MAGNO
<i>Gaultheria</i>	Ericaceae	MAGNO	<i>Hedypnois</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gavilea</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Helenium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gayophytum</i>	Onagraceae	MAGNO	<i>Helianthus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gentiana</i>	Gentianaceae	MAGNO	<i>Helictotrichon</i>	Poaceae	LILIO
<i>Gentianella</i>	Gentianaceae	MAGNO	<i>Heliotropium</i>	Heliotropiaceae	MAGNO
<i>Geoffroea</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Helminthotheca</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Geranium</i>	Geraniaceae	MAGNO	<i>Helogyne</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gethyum</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Herbertia</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Geum</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Herniaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Gevuina</i>	Proteaceae	MAGNO	<i>Herreria</i>	Asparagaceae	LILIO
<i>Gilia</i>	Polemoniaceae	MAGNO	<i>Hesperis</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Gilliesia</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Heterosperma</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Glandularia</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Hibiscus</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Glechoma</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Hieracium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Glinus</i>	Molluginaceae	MAGNO	<i>Hippuris</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Glyceria</i>	Poaceae	LILIO	<i>Hirschfeldia</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Glycyrrhiza</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Histiopteris</i>	Dennstaedtiaceae	POLYP
<i>Gochnatia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Hoffmannseggia</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Gomortega</i>	Gomortegaceae	MAGNO	<i>Holcus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Gomphrena</i>	Amaranthaceae	MAGNO	<i>Hollermayera</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Gossypium</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Homalocarpus</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Grammitis</i>	Polypodiaceae	POLYP	<i>Hordeum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Gratiola</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Hornungia</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Grausa</i>	Loasaceae	MAGNO	<i>Huidobria</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Greigia</i>	Bromeliaceae	LILIO	<i>Huperzia</i>	Lycopodiaceae	LYCOP
<i>Grindelia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Hydrangea</i>	Hydrangeaceae	MAGNO
<i>Griselinia</i>	Griselinaceae	MAGNO	<i>Hydrocleys</i>	Butomaceae	LILIO
<i>Guindilia</i>	Sapindaceae	MAGNO	<i>Hydrocotyle</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Gunnera</i>	Gunneraceae	MAGNO	<i>Hymenoglossum</i>	Hymenophyllaceae	POLYP
<i>Gutierrezia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Hymenophyllum</i>	Hymenophyllaceae	POLYP
<i>Guynesomia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Hypericum</i>	Hypericaceae	MAGNO
<i>Gymnophyton</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Hypochaeris</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Gynerium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Hypolepis</i>	Dennstaedtiaceae	POLYP
<i>Gypothamnium</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Imperata</i>	Poaceae	LILIO
<i>Haageocereus</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Indigofera</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Habenaria</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Ipheion</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Hainardia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Ipomoea</i>	Convolvulaceae	MAGNO
<i>Halerpestes</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Ipomopsis</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Haloragis</i>	Haloragaceae	MAGNO	<i>Iris</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Hamadryas</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Isatis</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Haplopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Isoetes</i>	Isoetaceae	LYCOP
<i>Haplorhus</i>	Anacardiaceae	MAGNO	<i>Isolepis</i>	Cyperaceae	LILIO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Ivania</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Lecanophora</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Jaborosa</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Legenere</i>	Campanulaceae	MAGNO
<i>Jarava</i>	Poaceae	LILIO	<i>Legrandia</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Johnstonella</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Lemna</i>	Araceae	LILIO
<i>Jovellana</i>	Calceolariaceae	MAGNO	<i>Lenzia</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Juania</i>	Arecaceae	LILIO	<i>Leontochir</i>	Alstroemeriaceae	LILIO
<i>Jubaea</i>	Arecaceae	LILIO	<i>Leontodon</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Juncus</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Lepechinia</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Junellia</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Lepidium</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Jungia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Lepidoceras</i>	Santalaceae	MAGNO
<i>Kageneckia</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Lepidophyllum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Kickxia</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Lepidothamnus</i>	Podocarpaceae	PINOP
<i>Kieslingia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Leptinella</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Knautia</i>	Caprifoliaceae	MAGNO	<i>Leptocarpha</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Koeleria</i>	Poaceae	LILIO	<i>Leptophyllochloa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Koenigia</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Leptosiphon</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Krameria</i>	Krameriaceae	MAGNO	<i>Leptostigma</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Kurzamra</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Lepturus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lablab</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Lepuropetalon</i>	Celastraceae	MAGNO
<i>Lachemilla</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Leucaena</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Lachnagrostis</i>	Poaceae	LILIO	<i>Leucanthemum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Lactoris</i>	Aristolochiaceae	MAGNO	<i>Leucheria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Lactuca</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Leucocoryne</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Laennecia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Leucojum</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Lagenophora</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Leunisia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Lagurus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Levisticum</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Lamarckia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Leymus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lamium</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Libertia</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Lampayo</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Ligaria</i>	Loranthaceae	MAGNO
<i>Landoltia</i>	Araceae	LILIO	<i>Ligustrum</i>	Oleaceae	MAGNO
<i>Lantana</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Lilaea</i>	Juncaginaceae	LILIO
<i>Lapageria</i>	Philesiaceae	LILIO	<i>Lilaeopsis</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Lappula</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Limnobium</i>	Hydrocharitaceae	LILIO
<i>Lapsana</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Limonium</i>	Plumbaginaceae	MAGNO
<i>Lardizabala</i>	Lardizabalaceae	MAGNO	<i>Limosella</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Larrea</i>	Zygophyllaceae	MAGNO	<i>Linaria</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Lastarriaea</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Lindernia</i>	Linderniaceae	MAGNO
<i>Lasthenia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Linum</i>	Linaceae	MAGNO
<i>Latace</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Lippia</i>	Verbenaceae	MAGNO
<i>Lathyrus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Lithrea</i>	Anacardiaceae	MAGNO
<i>Latua</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Littorella</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Laurelia</i>	Monimiaceae	MAGNO	<i>Llagunoa</i>	Sapindaceae	MAGNO
<i>Laureliopsis</i>	Monimiaceae	MAGNO	<i>Loasa</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Lebetanthus</i>	Ericaceae	MAGNO	<i>Lobelia</i>	Campanulaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Lobularia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Medicago</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Logfia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Megalachne</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lolium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Megalastrum</i>	Dryopteridaceae	POLYP
<i>Lomatia</i>	Proteaceae	MAGNO	<i>Megathyrsus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lophopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Melia</i>	Meliaceae	MAGNO
<i>Lophosoria</i>	Dicksoniaceae	POLYP	<i>Melica</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lotus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Melilotus</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Lucilia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Melinis</i>	Poaceae	LILIO
<i>Ludwigia</i>	Onagraceae	MAGNO	<i>Melissa</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Luma</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Melosperma</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Lupinus</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Menodora</i>	Oleaceae	MAGNO
<i>Luzula</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Menonvillea</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Luzuriaga</i>	Luzuriagaceae	LILIO	<i>Mentha</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Lycapsus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Mentzelia</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Lychnis</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Mercurialis</i>	Euphorbiaceae	MAGNO
<i>Lycium</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Mesembryanthemum</i>	Aizoaceae	MAGNO
<i>Lycopus</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Metharme</i>	Zygophyllaceae	MAGNO
<i>Lysimachia</i>	Primulaceae	MAGNO	<i>Microchloa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Lythrum</i>	Lythraceae	MAGNO	<i>Microlepis</i>	Dennstaedtiaceae	POLYP
<i>Machaerina</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Micromeria</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Macrachaenium</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Microphyes</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Macroptilium</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Microopsis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Madia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Microseris</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Maihueunia</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Microsorium</i>	Polypodiaceae	POLYP
<i>Maihueuniopsis</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Microsteris</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Maireana</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Miersia</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Malacothrix</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Mikania</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Malesherbia</i>	Passifloraceae	MAGNO	<i>Miqueliopuntia</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Malva</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Mirabilis</i>	Nyctaginaceae	MAGNO
<i>Malvastrum</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Miscanthus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Malvella</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Misodendrum</i>	Misodendraceae	MAGNO
<i>Mancoa</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Mitraria</i>	Gesneriaceae	MAGNO
<i>Margyracaena</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Mniodes</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Margyricarpus</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Modiola</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Marrubium</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Molucella</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Marsilea</i>	Marsileaceae	POLYP	<i>Monnina</i>	Polygalaceae	MAGNO
<i>Marsippospermum</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Montia</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Martcorenia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Montiopsis</i>	Montiaceae	MAGNO
<i>Mastigostyla</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Monttea</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Mathewsia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Morella</i>	Myricaceae	MAGNO
<i>Matricaria</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Moscharia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Matthiola</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Moschopsis</i>	Calyceraceae	MAGNO
<i>Maytenus</i>	Celastraceae	MAGNO	<i>Mostacillastrum</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Mecardonia</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Muehlenbeckia</i>	Polygonaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Muhlenbergia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Nymphaea</i>	Nymphaeaceae	MAGNO
<i>Mulguraea</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Ochagavia</i>	Bromeliaceae	LILIO
<i>Munroa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Ocyroe</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Mutisia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Oenothera</i>	Onagraceae	MAGNO
<i>Myoporum</i>	Scrophulariaceae	MAGNO	<i>Oldenlandia</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Myoschilos</i>	Santalaceae	MAGNO	<i>Olsynium</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Myosotis</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Ombrophytum</i>	Balanophoraceae	MAGNO
<i>Myostemma</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Omphalodes</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Myosurus</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Onopordum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Myrceugenia</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Onuris</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Myrcianthes</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Ophioglossum</i>	Ophioglossaceae	POLYP
<i>Myriophyllum</i>	Haloragaceae	MAGNO	<i>Ophryosporus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Myriopteris</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Oreobolus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Myrosmodes</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Oreocereus</i>	Cactaceae	MAGNO
<i>Myrteola</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Oreomyrrhis</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Nama</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Oreopolus</i>	Rubiaceae	MAGNO
<i>Nanodea</i>	Santalaceae	MAGNO	<i>Oriastrum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nardophyllum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Orites</i>	Proteaceae	MAGNO
<i>Nasa</i>	Loasaceae	MAGNO	<i>Ornithopus</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Nassauvia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Orobanche</i>	Orobanchaceae	MAGNO
<i>Nassella</i>	Poaceae	LILIO	<i>Ortachne</i>	Poaceae	LILIO
<i>Nastanthus</i>	Calyceraceae	MAGNO	<i>Oryza</i>	Poaceae	LILIO
<i>Nasturtium</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Osmorhiza</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Navarretia</i>	Polemoniaceae	MAGNO	<i>Otholobium</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Neobartsia</i>	Orobanchaceae	MAGNO	<i>Ourisia</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Neowerdermannia</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Ovidia</i>	Thymelaeaceae	MAGNO
<i>Nertera</i>	Rubiaceae	MAGNO	<i>Oxalis</i>	Oxalidaceae	MAGNO
<i>Nesocaryum</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Oxybasis</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Neuontobotrys</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Oxychloë</i>	Juncaceae	LILIO
<i>Nicandra</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Oxyphyllum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nicoraepoa</i>	Poaceae	LILIO	<i>Oxytheca</i>	Polygonaceae	MAGNO
<i>Nicotiana</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Oziroë</i>	Asparagaceae	LILIO
<i>Nierembergia</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Pachylaena</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nitrophila</i>	Chenopodiaceae	MAGNO	<i>Palaua</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Noccaea</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Panicum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Nolana</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Papaver</i>	Papaveraceae	MAGNO
<i>Notanthera</i>	Loranthaceae	MAGNO	<i>Pappostipa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Nothofagus</i>	Nothofagaceae	MAGNO	<i>Parapholis</i>	Poaceae	LILIO
<i>Notholaena</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Parastrephia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nothomyrcia</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Parentucellia</i>	Orobanchaceae	MAGNO
<i>Nothoscordum</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Parietaria</i>	Urticaceae	MAGNO
<i>Noticastrum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Paronychia</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Notopappus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Pascalía</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Nototriche</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Pasithea</i>	Asphodelaceae	LILIO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Paspalum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Pitavia</i>	Rutaceae	MAGNO
<i>Passiflora</i>	Passifloraceae	MAGNO	<i>Pitraea</i>	Verbenaceae	MAGNO
<i>Pastinaca</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Pittosporum</i>	Pittosporaceae	MAGNO
<i>Patosia</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Placea</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Pectocarya</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Plagiobothrys</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Pellaea</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Plantago</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Pelletiera</i>	Primulaceae	MAGNO	<i>Plazia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Pennellia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Pleocarphus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Peperomia</i>	Piperaceae	MAGNO	<i>Pleopeltis</i>	Polypodiaceae	POLYP
<i>Perezia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Pleurophora</i>	Lythraceae	MAGNO
<i>Perityle</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Pleurosorus</i>	Aspleniaceae	POLYP
<i>Persea</i>	Lauraceae	MAGNO	<i>Pluchea</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Persicaria</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Plumbago</i>	Plumbaginaceae	MAGNO
<i>Petroravenia</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Poa</i>	Poaceae	LILIO
<i>Petrorhagia</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Podagrostis</i>	Poaceae	LILIO
<i>Petroselinum</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Podanthus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Peumus</i>	Monimiaceae	MAGNO	<i>Podocarpus</i>	Podocarpaceae	PINOP
<i>Phacelia</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Podophorus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Phalaris</i>	Poaceae	LILIO	<i>Polemonium</i>	Polemoniaceae	MAGNO
<i>Philesia</i>	Philesiaceae	LILIO	<i>Polyachyrus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Philibertia</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Polycarpon</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Philippiella</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Polygala</i>	Polygalaceae	MAGNO
<i>Phleum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Polygonum</i>	Polygonaceae	MAGNO
<i>Phragmites</i>	Poaceae	LILIO	<i>Polylepis</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Phycella</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Polypodium</i>	Polypodiaceae	POLYP
<i>Phyla</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Polypogon</i>	Poaceae	LILIO
<i>Phyllachne</i>	Stylidiaceae	MAGNO	<i>Polypsecadium</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Phylloscirpus</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Polystichum</i>	Dryopteridaceae	POLYP
<i>Physalis</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Pombalia</i>	Violaceae	MAGNO
<i>Phytolacca</i>	Phytolaccaceae	MAGNO	<i>Populus</i>	Salicaceae	MAGNO
<i>Picradeniopsis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Porlieria</i>	Zygophyllaceae	MAGNO
<i>Picris</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Porophyllum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Picrosia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Portulaca</i>	Portulacaceae	MAGNO
<i>Pilea</i>	Urticaceae	MAGNO	<i>Potamogeton</i>	Potamogetonaceae	LILIO
<i>Pilgerodendron</i>	Cupressaceae	PINOP	<i>Potentilla</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Pilostyles</i>	Rafflesiaceae	MAGNO	<i>Pouteria</i>	Sapotaceae	MAGNO
<i>Pilularia</i>	Marsileaceae	POLYP	<i>Pozoa</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Pinguicula</i>	Lentibulariaceae	MAGNO	<i>Presliophytum</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Pinnasa</i>	Loasaceae	MAGNO	<i>Primula</i>	Primulaceae	MAGNO
<i>Pintoa</i>	Zygophyllaceae	MAGNO	<i>Prosopis</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Pinus</i>	Pinaceae	PINOP	<i>Proustia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Piptatherum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Prumnopitys</i>	Podocarpaceae	PINOP
<i>Piptochaetium</i>	Poaceae	LILIO	<i>Prunella</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Pistia</i>	Araceae	LILIO	<i>Prunus</i>	Rosaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Pseudognaphalium</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Rytidosperma</i>	Poaceae	LILIO
<i>Psidium</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Sabulina</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Psilocarphus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Saccharum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Psilotum</i>	Psilotaceae	POLYP	<i>Sagina</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Pteris</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Sagittaria</i>	Alismataceae	LILIO
<i>Pterocactus</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Salix</i>	Salicaceae	MAGNO
<i>Puccinellia</i>	Poaceae	LILIO	<i>Salpichroa</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Puya</i>	Bromeliaceae	LILIO	<i>Salpiglossis</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Pycnophyllopsis</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Salsola</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Pycnophyllum</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Salvia</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Pyrolirion</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Salvinia</i>	Salviniaceae	POLYP
<i>Quercus</i>	Fagaceae	MAGNO	<i>Sambucus</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Quillaja</i>	Quillajaceae	MAGNO	<i>Samolus</i>	Primulaceae	MAGNO
<i>Quinchamalium</i>	Schoepfiaceae	MAGNO	<i>Sanguisorba</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Ranunculus</i>	Ranunculaceae	MAGNO	<i>Sanicula</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Raphanus</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Santalum</i>	Santalaceae	MAGNO
<i>Rapistrum</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Sapindus</i>	Sapindaceae	MAGNO
<i>Raukaua</i>	Araliaceae	MAGNO	<i>Saponaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Reicheella</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Sarcocornia</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Relchela</i>	Poaceae	LILIO	<i>Sarcodraba</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Reseda</i>	Resedaceae	MAGNO	<i>Sarmienta</i>	Gesneriaceae	MAGNO
<i>Retanilla</i>	Rhamnaceae	MAGNO	<i>Saxegothaea</i>	Podocarpaceae	PINOP
<i>Reyesia</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Saxifraga</i>	Saxifragaceae	MAGNO
<i>Rhamnus</i>	Rhamnaceae	MAGNO	<i>Saxifragella</i>	Saxifragaceae	MAGNO
<i>Rhaphithamnus</i>	Verbenaceae	MAGNO	<i>Saxifragodes</i>	Saxifragaceae	MAGNO
<i>Rhodolirium</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Scabiosa</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Rhodophiala</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Scandix</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Rhodoscirpus</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Schinus</i>	Anacardiaceae	MAGNO
<i>Rhynchosia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Schismus</i>	Poaceae	LILIO
<i>Rhynchospora</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Schizachyrium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Ribes</i>	Grossulariaceae	MAGNO	<i>Schizaea</i>	Schizaeaceae	POLYP
<i>Ricinus</i>	Euphorbiaceae	MAGNO	<i>Schizanthus</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Robinia</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Schizopetalon</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Romulea</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Schkuhria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Rorippa</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Schoenoplectus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Rosa</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Schoenus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Rostkovia</i>	Juncaceae	LILIO	<i>Schyzachyrium</i>	Poaceae	LILIO
<i>Rostraria</i>	Poaceae	LILIO	<i>Scirpus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Rubia</i>	Rubiaceae	MAGNO	<i>Scleranthus</i>	Caryophyllaceae	MAGNO
<i>Rubus</i>	Rosaceae	MAGNO	<i>Scolymus</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Rumex</i>	Polygonaceae	MAGNO	<i>Scrophularia</i>	Scrophulariaceae	MAGNO
<i>Rumohra</i>	Dryopteridaceae	POLYP	<i>Scutellaria</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Ruppia</i>	Ruppiceae	LILIO	<i>Scyphanthus</i>	Loasaceae	MAGNO
<i>Ruta</i>	Rutaceae	MAGNO	<i>Sedum</i>	Crassulaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Selaginella</i>	Selaginellaceae	LYCOP	<i>Stenandrium</i>	Acanthaceae	MAGNO
<i>Selkirkia</i>	Boraginaceae	MAGNO	<i>Stenotaphrum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Selliera</i>	Goodeniaceae	MAGNO	<i>Stevia</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Senecio</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Sticherus</i>	Gleicheniaceae	POLYP
<i>Senna</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Stuckenia</i>	Potamogetonaceae	LILIO
<i>Serpyllopsis</i>	Hymenophyllaceae	POLYP	<i>Suaeda</i>	Chenopodiaceae	MAGNO
<i>Seseli</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Symphytotrichum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Sesuvium</i>	Aizoaceae	MAGNO	<i>Synammia</i>	Polypodiaceae	POLYP
<i>Setaria</i>	Poaceae	LILIO	<i>Syzygium</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Sherardia</i>	Rubiaceae	MAGNO	<i>Taeniatherum</i>	Poaceae	LILIO
<i>Sibara</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Tagetes</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Sicyos</i>	Cucurbitaceae	MAGNO	<i>Tanacetum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Sida</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Tapeinia</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Sigesbeckia</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Tarasa</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Silene</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Taraxacum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Silybum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Tecoma</i>	Bignoniaceae	MAGNO
<i>Sinapis</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Tecophilaea</i>	Tecophilaeaceae	LILIO
<i>Sisymbrium</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Teesdalia</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Sisyrinchium</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Teline</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Sium</i>	Apiaceae	MAGNO	<i>Tepualia</i>	Myrtaceae	MAGNO
<i>Skytanthus</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Tessaria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Smallanthus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Tetilla</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Solanum</i>	Solanaceae	MAGNO	<i>Tetrachondra</i>	Tetrachondraceae	MAGNO
<i>Solaria</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Tetraglochin</i>	Rosaceae	MAGNO
<i>Soleirolia</i>	Urticaceae	MAGNO	<i>Tetragonia</i>	Aizoaceae	MAGNO
<i>Solenomelus</i>	Iridaceae	LILIO	<i>Tetroncium</i>	Juncaginaceae	LILIO
<i>Solidago</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Teucrium</i>	Lamiaceae	MAGNO
<i>Soliva</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Thamnoseria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Sonchus</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Thelypteris</i>	Thelypteridaceae	POLYP
<i>Sophora</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Thespesia</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Sorghum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Thlaspi</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Spartium</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Thyrsopteris</i>	Dicksoniaceae	POLYP
<i>Speea</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Tigridia</i>	Iridaceae	LILIO
<i>Spergula</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Tillandsia</i>	Bromeliaceae	LILIO
<i>Spergularia</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Tiquilia</i>	Boraginaceae	MAGNO
<i>Sphaeralcea</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Tolpis</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Spilanthes</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Tomostima</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Spinoliva</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Torilis</i>	Apiaceae	MAGNO
<i>Spirodela</i>	Araceae	LILIO	<i>Tradescantia</i>	Commelinaceae	LILIO
<i>Sporobolus</i>	Poaceae	LILIO	<i>Tragopogon</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Stachys</i>	Lamiaceae	MAGNO	<i>Traubia</i>	Amaryllidaceae	LILIO
<i>Stangea</i>	Caprifoliaceae	MAGNO	<i>Trevoa</i>	Rhamnaceae	MAGNO
<i>Stellaria</i>	Caryophyllaceae	MAGNO	<i>Trianthesa</i>	Aizoaceae	MAGNO
<i>Stemodia</i>	Plantaginaceae	MAGNO	<i>Tribeles</i>	Escalloniaceae	MAGNO

GENERO	FAMILIA	CLASE	GENERO	FAMILIA	CLASE
<i>Tribulus</i>	Zygophyllaceae	MAGNO	<i>Valeriana</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Trichocline</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Valerianella</i>	Caprifoliaceae	MAGNO
<i>Trichomanes</i>	Hymenophyllaceae	POLYP	<i>Verbascum</i>	Scrophulariaceae	MAGNO
<i>Trichoneura</i>	Poaceae	LILIO	<i>Verbena</i>	Verbenaceae	MAGNO
<i>Trichopetalum</i>	Asparagaceae	LILIO	<i>Verbesina</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Trifolium</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Veronica</i>	Plantaginaceae	MAGNO
<i>Triglochin</i>	Juncaginaceae	LILIO	<i>Vestia</i>	Solanaceae	MAGNO
<i>Trigonella</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Vicia</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Triodanis</i>	Campanulaceae	MAGNO	<i>Villanova</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Tripleurospermum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Vinca</i>	Apocynaceae	MAGNO
<i>Tripogon</i>	Poaceae	LILIO	<i>Viola</i>	Violaceae	MAGNO
<i>Triptilion</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Vitis</i>	Vitaceae	MAGNO
<i>Trisetum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Vittaria</i>	Pteridaceae	POLYP
<i>Trismeria</i>	Pteridaceae	POLYP	<i>Viviania</i>	Francoaceae	MAGNO
<i>Tristagma</i>	Amaryllidaceae	LILIO	<i>Volutaria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Tristerix</i>	Loranthaceae	MAGNO	<i>Vulpia</i>	Poaceae	LILIO
<i>Triticum</i>	Poaceae	LILIO	<i>Wahlenbergia</i>	Campanulaceae	MAGNO
<i>Triumfetta</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Waltheria</i>	Malvaceae	MAGNO
<i>Trixis</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Weberbaueria</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Tropaeolum</i>	Tropaeolaceae	MAGNO	<i>Weberbauerella</i>	Fabaceae	MAGNO
<i>Tropidocarpum</i>	Brassicaceae	MAGNO	<i>Weinmannia</i>	Cunoniaceae	MAGNO
<i>Tunilla</i>	Cactaceae	MAGNO	<i>Werneria</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Tweedia</i>	Apocynaceae	MAGNO	<i>Wolffia</i>	Araceae	LILIO
<i>Typha</i>	Typhaceae	LILIO	<i>Wolffiella</i>	Araceae	LILIO
<i>Ugni</i>	Myrtaceae	MAGNO	<i>Woodsia</i>	Woodsiaceae	POLYP
<i>Ulantha</i>	Orchidaceae	LILIO	<i>Xanthium</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Ulex</i>	Fabaceae	MAGNO	<i>Xenophyllum</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Ulmus</i>	Ulmaceae	MAGNO	<i>Xerodraba</i>	Brassicaceae	MAGNO
<i>Uncinia</i>	Cyperaceae	LILIO	<i>Yunquea</i>	Asteraceae	MAGNO
<i>Urmenetea</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Zameioscirpus</i>	Cyperaceae	LILIO
<i>Urocarpidium</i>	Malvaceae	MAGNO	<i>Zannichellia</i>	Potamogetonaceae	LILIO
<i>Urospermum</i>	Asteraceae	MAGNO	<i>Zantedeschia</i>	Araceae	LILIO
<i>Urtica</i>	Urticaceae	MAGNO	<i>Zea</i>	Poaceae	LILIO
<i>Utricularia</i>	Lentibulariaceae	MAGNO	<i>Zephyra</i>	Tecophilaeaceae	LILIO
<i>Vahlodea</i>	Poaceae	LILIO	<i>Zostera</i>	Zosteraceae	LILIO
<i>Valdivia</i>	Escalloniaceae	MAGNO			

Recibido: 02.03.2018
 Aceptado: 07.05.2018